



الرياضيات

كتاب الطالب



الصف الثاني عشر علمي
الفصل الدراسي الأول

الرياضيات

الصف الثاني عشر علمي
الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. حسين علي عبدالله (رئيساً)

أ. فتحية محمود أبو زور

أ. حصة يونس محمد علي

الطبعة الثانية

١٤٤٦هـ

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج
إدارة تطوير المناهج

الطبعة الأولى م ٢٠١٥ - ٢٠١٤
الطبعة الثانية م ٢٠١٧ - ٢٠١٦
م ٢٠١٩ - ٢٠١٨
م ٢٠٢١ - ٢٠٢٠
م ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
م ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢
م ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣
م ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف الثاني عشر علمي

أ. حسن نوح علي المها (رئيساً)

أ. صديقة أحمد صالح الانصارى

أ. مجدى محمد يس دراز

أ. وضاحى ابراهيم مزعل الدوسري

دار التّّربيّون House of Education ش.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٤ م



القناة التربوية



شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً

طبع في: شركة المطبعة الألمانية للطباعة والتغليف ذ.م.م

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٣١٩) بتاريخ ١٢/٣١/٢٠١٥ م



جَلَّ ذِي الْجَلَالِ مُشَاعِلُ الْأَحَمَادِ الْجَابِرِ الصَّابِحِ
أَمِيرُ دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait



سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
في مهندسية الكويت

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين.

عندما شرعت وزارة التربية في عملية تطوير المناهج، استندت في ذلك إلى جملة من الأسس والمتطلبات العلمية والفنية والمهنية، حيث راعت متطلبات الدولة وارتباط ذلك بسوق العمل، وحاجات المتعلمين والتطور المعرفي والعلمي، بالإضافة إلى جملة من التحديات التي تمثلت بالتحدي القيمي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي وغيرها، وإن كان ندرك أن هذه الجوانب لها صلة وثيقة بالنظام التعليمي بشكل عام وليس المناهج بشكل خاص.

وما يجب التأكيد عليه، أن المنهج عبارة عن كم الخبرات التربوية والتعليمية التي تُقدم للمتعلم، وهذا يرتبط أيضاً بعمليات التخطيط والتنفيذ، والتي في مجملها النهائية تأتي لتحقيق الأهداف التربوية. وعليه أصبحت عملية بناء المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التعليمي، لأنها تأتي في جانبين مهمين لقياس كفاءة النظام التعليمي، فهي من جهة تمثل أحد المدخلات الأساسية ومقاييساً أو معياراً من معايير كفائه من جهة أخرى، عدا أن المناهج تدخل في عملية إيماء شخصية المتعلم في جميع جوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية والروحية والاجتماعية.

من جانب آخر، فنحن في قطاع البحوث التربوية والمناهج، عندما نبدأ في عملية تطوير المناهج الدراسية، ننطلق من كل الأسس والمتطلبات التي سبق ذكرها، بل إننا نراها محفزات واقعية تدفعنا لبذل قصارى جهدنا والمضي قدماً في البحث في المستجدات التربوية سواء في شكل المناهج أم في مضامينها، وهذا ما قام به القطاع خلال السنوات الماضية، حيث البحث عن أفضل ما توصلت إليه عملية صناعة المناهج الدراسية، ومن ثم إعدادها وتأليفها وفق معايير عالمية استعداداً لتطبيقها في البيئة التعليمية.

ولقد كانت مناهج العلوم والرياضيات من أول المناهج التي بدأنا بها عملية التطوير، إيماناً بأهميتها وانطلاقاً من أنها ذات صفة عالمية، مع الأخذ بالحسبان خصوصية المجتمع الكويتي وببيئته المحلية. وعندما أدركنا أنها تتضمن جوانب عملية التعلم ونعني بذلك المعرفة والقيم والمهارات، قمنا بدراستها وجعلها تتوافق مع نظام التعليم في دولة الكويت، مركزين ليس فقط على الكتاب المقرر ولكن شمل ذلك طرائق وأساليب التدريس والبيئة التعليمية دور المتعلم. مؤكدين على أهمية التكامل بين الجوانب العلمية والتطبيقية حتى تكون ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بحياة المتعلم.

وفي ضوء ما سبق من معطيات وغيرها من الجوانب ذات الصفة التعليمية والتربوية تم اختيار سلسلة مناهج العلوم والرياضيات التي أكملناها بشكل ووقة مناسبين، ولنحقق نقلة نوعية في مناهج تلك المواد، وهذا كله تزامن مع عملية التقويم والقياس للأثر الذي تركته تلك المناهج. ومن ثم عمليات التعديل التي طرأت أثناء وبعد تنفيذها، مع التأكيد على الاستمرار في القياس المستمر والمتابعة الدائمة حتى تكون مناهجنا أكثر تفاعلية.

د. سعود هلال الحري

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

المحتويات

الوحدة الأولى: النهايات والاتصال	
10	1 - النهايات
12	2 - نهایات تشتمل على $-\infty$ ، ∞
27	3 - صيغ غير معينة
36	4 - نهایات بعض الدوال المثلثية
42	5 - الاتصال
48	6 - نظريات الاتصال
54	7 - الاتصال على فترة
61	
الوحدة الثانية: الاشتراق	
72	1 - معدلات التغير وخطوط المماس
74	2 - المشتقة
79	3 - قواعد الاشتراق
90	4 - مشتقات الدوال المثلثية
100	5 - قاعدة السلسلة
103	6 - المشتقات ذات الرتب العليا والاشتقاق الضمني
108	
الوحدة الثالثة: تطبيقات على الاشتراق	
120	1 - 3 القيم القصوى (العظمى / الصغرى) للدوال
122	2 - تزايد وتناقص الدوال
131	3 - ربط المشتقة الأولى ' f' والمشتقة الثانية " f'' بمنحنى الدالة
138	4 - رسم بيان دوال كثیرات الحدود
147	5 - تطبيقات على القيم القصوى
155	
الوحدة الرابعة: الإحصاء	
166	1 - 4 التقدير
168	2 - 4 اختبارات الفروض الإحصائية
177	3 - 4 الارتباط والانحدار
182	

الوحدة الأولى

النهايات والاتصال

Limits and Continuity

مشروع الوحدة: السرعة اللحظية

1 مقدمة المشروع: تسقط صخرة من مرتفع. يمكن ضبط زمن السقوط وحساب السرعة المتوسطة لسقوط الصخرة بسهولة، ولكن في لحظة ما أثناء السقوط ما هي سرعة الصخرة؟

2 الهدف: معرفة سرعة الصخرة عند اللحظة $t = 2\text{ s}$.

3 اللوازم: أوراق رسم، آلة حاسبة علمية، حاسوب، جهاز عرض.

4 أسئلة حول التطبيق:

تسقط الصخرة وفق العلاقة (قانون جاليليو للسقوط الحر): $d(t) = 4.9t^2$ ، حيث:

$d(t)$ المسافة التي تقطعها الصخرة بالأمتار (m) ، t الزمن بالثواني

a احسب السرعة المتوسطة $\frac{\Delta d}{\Delta t}$ خلال أول ثانيتين من السقوط.

b أكمل الجدول التالي الذي يمثل السرعة المتوسطة للصخرة في الفترة الزمنية من اللحظة $t = 2$ إلى اللحظة $t = 2 + h$ ، حيث $\Delta t = h$ هو الفارق في الزمن.

مدة الفترة الزمنية h بالثانية	السرعة المتوسطة $\frac{\Delta d}{\Delta t}$
0.4	
0.1	
0.05	
0.01	
0.001	
0.0001	

c ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى معدل السرعة عندما تقترب h كثيراً من الصفر؟

d ما تقريرياً سرعة الصخرة عند $t = 2$ ؟

e التقرير: ضع تقريراً مفصلاً يبيّن النتائج التي حصلت عليها مشيراً إلى المعطيات من دروس الوحدة التي استفادت منها.

دعم تقريرك بملخص أو عرض على جهاز العرض.

دروس الوحدة

الاتصال على فترة	نظريات الاتصال	الاتصال	نهايات بعض الدوال المثلثية	صيغ غير معينة	نهايات تشتمل على $+\infty$ ، $-\infty$	النهايات
1-7	1-6	1-5	1-4	1-3	1-2	1-1

الوحدة الأولى

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

أضف إلى معلوماتك

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كان الباحثون في الرياضيات قد أدركوا أنه بدون أساس منطقية، سيكون حساب التكامل والتفاضل محدوداً. طور أوغسطين لويس كوشي (Augustin-Louis Cauchy) نظرية في النهايات، فألغى معظم الشكوك حول صحة منطق حساب التكامل والتفاضل.

وصف المؤرخ هوارد إيف (Howard Eves) كوشي بأنه إضافة إلى كونه عالماً رياضياً من الطراز الأول قدم الكثير لعالم الرياضيات فقد كان أيضاً محامياً (مارس المهنة لمدة أربعة عشر عاماً)، ومتسلق جبال، ورسام (استخدم الألوان المائية). ومن صفات كوشي التي ميزته عن معاصريه احترامه للبيئة ودفاعه عنها.



أوغسطين لويس كوشي
(Augustin-Louis Cauchy)

- رسمت بيان الدالة التربيعية.
- رسمت بيانات دوال القوى.
- وصفت منحنيات كثيرات الحدود.
- أوجدت أصفار دالة كثيرة الحدود.
- تعلمت الكثير من المتطابقات المثلثية.
- رسمت بيانات بعض الدوال.

ماذا سوف تتعلم؟

- تعرف مفهوم نهاية دالة عند نقطة.
- حساب نهايات بعض الدوال.
- استخدام نظريات النهايات.
- إلغاء العامل الصفرى (صيغة غير معينة $\frac{0}{0}$).
- نهايات تشمل على $-\infty$ ، ∞ .
- صيغ غير معينة.
- نهايات بعض الدوال المثلثية.
- نظرية الإحاطة.
- استخدام نظرية الإحاطة لإيجاد بعض النهايات.
- تعرف اتصال دالة عند نقطة ودراسة الاتصال.
- تعرف بعض نظريات الاتصال الأساسية.
- بحث اتصال دالة ناتجة من تركيب دالتين.
- فهم معنى دالة متصلة على فترة.
- تعرف اتصال دالة على فترة.

المصطلحات الأساسية

نهاية دالة عند نقطة – النهاية من الجهتين – النهاية من جهة واحدة – العامل الصفرى – صيغ غير معينة – نظرية الإحاطة – خط مقارب (محاذى) رأسى – خط مقارب (محاذى) أفقي – اللانهاية – اتصال دالة عند نقطة – نقاط الاتصال ونقاط الانفصال – التخلص من الانفصال – دالة مركبة – اتصال دالة على فترة .

النهايات

Limits

عمل تعاوني

أولاً: أكمل الجدول التالي كما في ① :

بعد العدد عن طرفي الفترة	صورة أخرى للفترة المفتوحة	الممثل على خط الأعداد	العدد في منتصف الفترة	الفترة المفتوحة	
1	$(4 - 1, 4 + 1)$		4	$(3, 5)$	①
				$\left(\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}\right)$	②
				$\left(1\frac{3}{4}, 2\frac{1}{4}\right)$	③
				$(0, 1)$	④
				$(2.9, 3.1)$	⑤
				$(6.8, 7.2)$	⑥

ثانياً: اكتب الفترة المفتوحة التي يبعد طرفاها بمقدار $\frac{1}{5}$ عن العدد الحقيقي 3.

ثالثاً: اكتب فترة مفتوحة يبعد طرفاها بمقدار a عن العدد الحقيقي c .

من «العمل التعاوني» السابق، الفترة المفتوحة $(c - a, c + a)$ تسمى جواراً للعدد c وفقاً للمعيار a حيث $a > 0$.

فمثلاً: الفترة المفتوحة (3, 5) هي جوار للعدد 4 وفقاً للمعيار 1.

والفترة $\left(1\frac{3}{4}, 2\frac{1}{4}\right)$ هي جوار للعدد 2 وفقاً للمعيار $\frac{1}{4}$.

وكذلك الفترة $\left(1\frac{99}{100}, 2\frac{1}{100}\right)$ هي جوار للعدد 2 وفقاً للمعيار $\frac{1}{100}$.

وعليه يمكننا تحديد جوار لأي عدد باختيارنا معياراً مناسباً.

إذا كانت لدينا دالة معروفة على فترة مفتوحة I من الأعداد الحقيقة وتحوي العدد c فإننا نقول إن هذه الدالة معروفة في جوار للعدد c (أي I تحوي جواراً للعدد c).

أما إذا كانت الدالة معروفة عند جميع عناصر الفترة I ولكنها غير معروفة عند العدد c نفسه فإن الدالة تكون معروفة في جوار ناقص للعدد c .

تعريف (1)

لتكن x كمية متغيرة، c عدداً حقيقياً.

نقول إن x تقترب من c باطراد إذا كان بالإمكان جعل الكمية $|x - c|$ أصغر من أي عدد حقيقي موجب.

سوف تعلم

- النهاية عند النقطة.
- حساب النهايات من التمثيلات البيانية.
- حساب النهايات باستخدام النظريات.
- النهاية من جهة واحدة فقط أو من الجهتين.
- صيغة غير معينة $\frac{0}{0}$.

المفردات والمصطلحات:

- جوار Neighbourhood
- المعيار Norm
- جوار ناقص Punctured Neighbourhood
- النهاية من جهة واحدة One-Sided Limit
- النهاية من الجهتين Two-Sided Limits
- صيغة غير معينة $\frac{0}{0}$
- Indeterminate Form $\frac{0}{0}$

Limit of a Function at a Point

نهاية دالة عند نقطة



نشاط


أولاً: لتكن الدالة f :

a) أوجد مجال الدالة f .

b) هل يمكن إيجاد $f(2)$ ؟

c) أكمل الجدول التالي:

x	...	1.9	1.99	1.999	1.9999	→	2	←	2.0001	2.001	2.01	2.1	...
$f(x)$							غير معروف						



d) ماذا تلاحظ على قيم x ؟

(هل تقترب من عدد محدد؟)

e) ماذا تلاحظ على قيم $f(x)$ ؟

(هل تقترب من عدد محدد؟)

الشكل المقابل يمثل بيان f

ثانياً:

a) هل يمكن تبسيط الدالة السابقة f ؟ كيف؟

b) ارسم بيان الدالة g حيث $g(x) = x + 2$.

ثالثاً: قارن بين الدالتين f و g .

من النشاط السابق وجدت أن قيم $f(x)$ تقترب من العدد 4 كلما كانت x قريبة جدًا من العدد 2 سواء من اليمين أو اليسار. يسمى العدد 4 نهاية الدالة f عندما x تؤول إلى العدد 2. (تقرب باطراد من العدد 2 ، $x \neq 2$) ويعبر عن ذلك بالصورة التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

وتفرأ كالتالي: نهاية $f(x)$ عندما x تؤول إلى 2 تساوي 4.

The limit of $f(x)$ as x approaches 2 equals 4

تعطينا النهايات لغة لوصف سلوك الدالة عندما تقترب مدخلات الدالة من قيمة معينة.

تعريف (2)


ليكن L ، c عددين حقيقيين، f دالة حقيقة معروفة في جوار أو جوار ناقص للعدد c

نكتب:


$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

وتعني أنه عندما تقترب x من c باطراد، $f(x)$ فإن قيم $f(x)$ تقترب باطراد من L .


تبين الأشكال أدناه حقيقة وجود نهاية عندما $x \rightarrow c$ حيث لا تعتمد على كون الدالة معروفة أو غير معروفة عند c .




فعلى سبيل المثال في الدوال التالية:



a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$



b) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & : x \neq 1 \\ 1 & : x = 1 \end{cases}$



c) $q(x) = x + 1$

الدالة f لها نهاية تساوي 2 عندما $x \rightarrow 1$ على الرغم من أن f ليست معروفة عند $x = 1$.


الدالة g لها نهاية تساوي 2 عندما $x \rightarrow 1$ على الرغم من أن $2 \neq 1$.

الدالة q لها نهاية تساوي 2 عندما $x \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} q(x) = 2$$

One-Sided Limit and Two-Sided Limits

النهاية من جهة واحدة أو من جهتين



شكل (1)

أحياناً تؤول قيم الدالة f لقيم مختلفتين عندما تقترب x من العدد c من الجهةين.

إذا كانت $f(x)$ تؤول إلى العدد L_1 عندما x تؤول إلى العدد c من جهة اليسار

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L_1$$

فإننا نعبر عن ذلك بالصورة التالية:

وتشتهر **النهاية من جهة اليسار**.

وإذا كانت $f(x)$ تؤول إلى العدد L_2 عندما x تؤول إلى العدد c من جهة اليمين فإننا نعبر

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L_2$$

عن ذلك بالصورة التالية:

وتشتهر **النهاية من جهة اليمين**.

$$L_1 \neq L_2$$

نلاحظ في الشكل (1):

أي أن:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

ولذا نقول أن:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ غير موجودة}$$


(1) نظرية

يفرض أن c, L عدادين حقيقيين

يكون للدالة f نهاية عندما تقترب x من c إذا وفقط إذا كانت النهاية من جهة اليمين تساوي النهاية من جهة اليسار

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

ويعبر عن ذلك:




(1) تدريب

الشكل المقابل يمثل بيان الدالة: $f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$

أكمل ما يلي:

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \dots$ | 2 | $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \dots$ | 3 | $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \dots$ |
| 4 | $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \dots$ | 5 | $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \dots$ | 6 | $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \dots$ |
| 7 | $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \dots$ | 8 | $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \dots$ | 9 | $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \dots$ |
| 10 | $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \dots$ | 11 | $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \dots$ | | |



(1) مثال

الشكل المقابل، يمثل بيان الدالة f .


أوجد إن أمكن:

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ | 2 | $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ |
| 3 | $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ | 4 | $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ |

الحل:

- 1 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- 2 $\because \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \implies \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غير موجودة
- 3 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$
- 4 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$

حاول أن تحل



١ يمثل الشكل المقابل بيان الدالة f .

أو جد إن أمكن:

a $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

c $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$


b $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

d $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Calculation of Limits

حساب النهايات

يمكّنا حساب النهايات لبعض الدوال باستخدام النظريات التالية:




شكل (2)

نظريّة (2)

إذا كانت f دالة: $f(x) = k$ و كانا c, k عدداً حقيقيان فإن:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} k = k$$



شكل (3)

نظريّة (3)

إذا كانت f دالة: $f(x) = x$ و كان c عدداً حقيقياً فإن:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c$$

نظريّة (4)

إذا كانت k, c, M, L أعداداً حقيقية، فإن: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$

$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L + M$ قاعدة الجمع: a

$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L - M$ قاعدة الطرح: b

$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L \cdot M$ قاعدة الضرب: c

$\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow c} f(x) = k \cdot L$ قاعدة الضرب في ثابت: d

$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L}{M}, M \neq 0$ قاعدة القسمة: e

(2) مثال

بفرض أن $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -2$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5$
أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x))$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)}{g(x)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + 4}{f(x) \cdot g(x)}$

الحل:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
 $= -2 - 5$
 $= -7$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5$ ، $5 \neq 0$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} g(x)} = \frac{2 \lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} g(x)} \\ &= \frac{2(-2)}{5} \\ &= \frac{-4}{5} \\ &= -0.8\end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
 $= -2 \times 5$
 $= -10$ ، $-10 \neq 0$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + 4}{f(x) \cdot g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (g(x) + 4)}{\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) \cdot g(x))} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} g(x) + \lim_{x \rightarrow 1} 4}{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} g(x)} \\ &= \frac{5 + 4}{-10} \\ &= -\frac{9}{10} \\ &= -0.9\end{aligned}$$

حاول أن تحل

بفرض أن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 7$ ، $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -3$ 2
أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) \cdot g(x))$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{8f(x) \cdot g(x)}{f(x) + g(x)} \right)$

نظريّة (5): دوال كثيّرات الـحدود ودوال الـحدوديات النسبيّة

Polynomial and Rational Functions

إذا كانت دالة كثيرة الـحدود، c عدداً حقيقياً، فإنّ: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ (a)

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$ إذا كانت $f(x), g(x)$ كثيّرتين حدود، c عدداً حقيقياً، فإنّ: (b)

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}, \quad g(c) \neq 0$$

ملاحظة: يمكن تطبيق نظرية (5) على الدوال التي على الصورة: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ومجالها مجموعه جزئية من \mathbb{R}

مثال (3)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 - 2x^3 + 5)$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2(2-x))$

الحل:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 - 2x^3 + 5) = (-1)^4 - 2(-1)^3 + 5$
 $= 1 + 2 + 5$
 $= 8$

نظرية (5)

b) $g(x) = x + 2$

$$g(2) = 2 + 2 = 4, \quad 4 \neq 0$$

تحقق من أن المقام $\neq 0$

أي أن المقام \neq صفر

نظرية (5)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = \frac{(2)^2 + 2(2) + 4}{2 + 2} \\ = \frac{4 + 4 + 4}{4} \\ = \frac{12}{4} \\ = 3$$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2(2-x)) = \lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x^3)$
 $= 2(3)^2 - (3)^3$
 $= 18 - 27$
 $= -9$

نظرية (5)

حاول أن تحل

a) هل يمكن حل c) في المثال (3) بطريقة أخرى؟
(3)
(b) أوجد:

1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + 3x^2 - 2x - 17)$

2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

نظريات حساب النهايات صحيحة عند حساب النهاية من جهة واحدة.

مثال (4)

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & : x < 1 \\ 5 & : x = 1 \\ \frac{5}{x} & : x > 1 \end{cases}$$

إذا كانت الدالة f :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x + 2) = 3(1) + 2 = 5$$

النهاية من جهة اليسار

النهاية من جهة اليمين

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{x} = \frac{5}{1} = 5$$

(يمكن التتحقق من أن نهاية المقام $\neq 0$)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$$

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & : x < 2 \\ x - 1 & : x > 2 \end{cases}$$

إذا كانت الدالة f :

4

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

مثال (5)

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & : x \leq 0 \\ 1 - 2x & : x > 0 \end{cases}$$

إذا كانت الدالة g :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - 2) = -2$$

النهاية من جهة اليسار

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x) = 1$$

النهاية من جهة اليمين

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ غير موجودة}$$

حاول أن تحل

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + x & : x > 1 \\ \frac{x}{x^2 + 1} & : x \leq 1 \end{cases}$$

إذا كانت الدالة g :

5

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

تذكرة:

$$|x - a| = \begin{cases} x - a : x \geq a \\ -x + a : x < a \end{cases}$$


تدريب (2)

$$\text{لتكن } x \neq 1 \quad f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$$

a اكتب $f(x)$ بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. (بإعادة تعريف المطلق)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \quad \text{أوجد } b$$

c هل للدالة f نهاية عندما $x \rightarrow 1$? فسر.



مثال (6)

لتكن: $f(x) = |x - 3| + 2x$ الممثلة بالشكل.

a اكتب $f(x)$ دون استخدام رمز القيمة المطلقة.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \quad \text{أوجد } b$$

c هل للدالة f نهاية عندما $x \rightarrow 3$? فسر.

الحل:

$$\begin{aligned} a \quad f(x) &= \begin{cases} x - 3 + 2x & : x \geq 3 \\ -x + 3 + 2x & : x < 3 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 3x - 3 & : x \geq 3 \\ x + 3 & : x < 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$b \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (3x - 3) = 3(3) - 3 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x + 3) = 3 + 3 = 6$$

$$c \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 6$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$$

. لـ f نهاية عندما $x \rightarrow 3$ وهذه النهاية تساوي 6.

حاول أن تحل

$$f(x) = x^2 - |x + 2| : f \quad 6$$

a اكتب $f(x)$ دون استخدام رمز القيمة المطلقة.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \quad \text{أوجد: } b$$

c هل للدالة f نهاية عندما $x \rightarrow -2$? فسر.

الربط بالحياة:

يقدر الباحثون عدد الحيوانات المهددة بالانقراض باستخدام علاقات وضعوها من خلال مراقباتهم. ويستخدمون النهايات لتوقع عدد هذه الحيوانات في الأمد البعيد.



تعلمت مما سبق أن

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 2+1=3$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)^2 &= \lim_{x \rightarrow 2} ((x+1) \cdot (x+1)) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) \cdot \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = (3)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)^3 &= \lim_{x \rightarrow 2} ((x+1)^2 \cdot (x+1)) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+1)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = (3)^2 \cdot 3 = 3^3\end{aligned}$$

وبالمثل يمكن إيجاد قيمة $(x+1)^n$ حيث n عددًا صحيحًا موجباً وهي تساوي $(3)^n$.

نظريه (6)

بفرض أن $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة وكانت n عددًا صحيحًا موجباً فإن:

a) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow c} f(x))^n$

(في حالة n عددًا زوجياً يتشرط أن يكون $0 < f(x) < \infty$)

b) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$ (في حالة n عددًا زوجياً يتشرط أن تكون $f(x) > 0$)

ملاحظة: سنكتفي بدراسة حالات الجذور التربيعية والتكعيبية للدوال فقط.

مثال (7)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 3x - 1)^5$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{x-3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x^2 - 2}}{x-2}$

الحل:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 3x - 1)^5 = (\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 3x - 1))^5 = 3^5 = 243$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{x-3} = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 2} (x-3)} = \sqrt[3]{2-3} = \sqrt[3]{-1} = -1$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x^2 - 2}}{x-2}$

$\lim_{x \rightarrow 3} (x-2) = 1 \quad , \quad 1 \neq 0$

$\lim_{x \rightarrow 3} (3x^2 - 2) = 25 \quad , \quad 25 > 0$

$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 2} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} (3x^2 - 2)} = \sqrt{25} = 5$

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x^2 - 2}}{x-2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x^2 - 2}}{\lim_{x \rightarrow 3} (x-2)}$

$= \frac{5}{1} = 5$

تحقق أن نهاية المقام $\neq 0$

تحقق أن نهاية ما تحت الجذر < 0

حاول أن تحل

أوجد: 7

a) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x^2 - 5}$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} (x + \sqrt{x})^4$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 4x + 5}}{x - 2}$

إلغاء العامل الصفرى في المقام

Eliminating Zero Factor of the Denominator

إذا كان لدينا دالة نسبية وكانت نهاية مقام هذه الدالة النسبية لا تساوى الصفر عندما $x \rightarrow c$ فإننا نطبق نظرية (4) فرع e لإيجاد نهاية هذه الدالة. أما إذا ساوت نهاية المقام الصفر، فإننا نقوم باختصار العامل الصفرى المشترك بين البسط والمقام، إن وجد، ثم نستخدم الصيغة المبسطة لإيجاد النهاية.

ملاحظات:

1) عند التعويض المباشر لقيمة x في كل من البسط والمقام وحصلنا على $\frac{0}{0}$ فإنها تسمى **صيغة غير معينة (Indeterminate Form)**.

2) يمكن استخدام التحليل أو القسمة أو الضرب بالمرافق أو غيرها لإيجاد الصيغة المبسطة.

مثال (8)

أوجد إن أمكن:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^3 - 8}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2 - 1}$

الحل:

a) عند التعويض المباشر عن $x = 1$ في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x+2)(x-1)}{x(x-1)}$$

$$= \frac{x+2}{x}, \quad x \neq 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} x = 1, \quad 1 \neq 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x} = \frac{1+2}{1} = 3$$

استخدم الصيغة المبسطة

عرض عن $x = 1$

تذكرة:

مرافق العدد الجذري هو عدد جذري بحيث يكون ناتج ضرب العدددين عدداً نسبياً.

أمثلة:

$$\sqrt{2} + 1, \sqrt{2} - 1 \bullet$$

مرافقان

$$\sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{3} + \sqrt{2} \bullet$$

مرافقان

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} \bullet$$

مرافقان

$$\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2} \bullet$$

مرافقان

$$\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2} \bullet$$

مرافقان

تذكرة:

إذا كان a صفر للدالة الحدودية $f(x)$ فإن $(x-a)$ عامل من عوامل $f(x)$.

تذكرة:

$$\begin{aligned} a^3 - b^3 &= \\ (a - b)(a^2 + ab + b^2) &= \\ a^3 + b^3 &= \\ (a + b)(a^2 - ab + b^2) &= \end{aligned}$$

b عند التعويض المباشر عن $x = 0$ في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\frac{(2+x)^3 - 8}{x} = \frac{(2+x-2)((2+x)^2 + 2(2+x) + (2)^2)}{x}$$

$$= \frac{x^1(4+4x+x^2+4+2x+4)}{x^1}$$

$$= x^2 + 6x + 12 , \quad x \neq 0$$

x عامل صفرى مشترك بين البسط والمقام

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^3 - 8}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 6x + 12) = 12$$

استخدم الصيغة المبسطة

c عند التعويض المباشر عن $x = 1$ في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\frac{|x-1|}{x^2-1} = \begin{cases} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} & : x > 1 \\ \frac{1-x}{(x-1)(x+1)} & : x < 1, x \neq -1 \end{cases}$$

اكتب البسط دون استخدام رمز القيمة
المطلقة وحلل المقام إلى عوامل
(x-1) عامل صفرى مشترك بين
البسط والمقام

$$= \begin{cases} \frac{1}{x+1} & : x > 1 \\ \frac{-1}{(x+1)} & : x < 1, x \neq -1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x^2-1}$$

لإيجاد

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2 , \quad 2 \neq 0$$

نتحقق من نهاية المقام $\neq 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

استخدم الصيغة المبسطة وعوض عن $x = 1$
(النهاية من جهة اليمين)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x+1) = -(1+1) = -2 , \quad -2 \neq 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{(x+1)} = \frac{-1}{(1+1)} = -\frac{1}{2}$$

استخدم الصيغة المبسطة وعوض عن $x = 1$
(النهاية من جهة اليسار)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x^2-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x^2-1}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1}$$

حاول أن تحل

أو جد إن أمكن: 8

a $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4}$

b $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{(x+4)^2 - 9}{x^2 + 7x}$

c $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x+2|-7}{x^2-25}$

مثال (9)

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}-1}{x-2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x-1}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-4}{\sqrt[3]{x+2}}$

أوجد:

الحل:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}-1}{x-2}$

عند التعويض المباشر عن $x = 2$ في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\frac{\sqrt{2x-3}-1}{x-2} = \frac{\sqrt{2x-3}-1}{x-2} \times \frac{\sqrt{2x-3}+1}{\sqrt{2x-3}+1}$$

اضرب البسط والمقام في مرافق البسط

$$= \frac{2x-3-1}{(x-2)(\sqrt{2x-3}+1)} \quad (\sqrt{a}-b)(\sqrt{a}+b) = a-b^2$$

$$= \frac{2(x-2)}{(x-2)(\sqrt{2x-3}+1)} \quad (x-2) \text{ عامل مشترك بين البسط والمقام}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2x-3}+1}, \quad x \neq 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x-3) = 1; \quad 1 > 0$$

تحقق أن نهاية ما تحت الجذر أكبر من 0

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x-3}+1) = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x-3} + \lim_{x \rightarrow 2} 1$$

$$= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (2x-3)} + 1 = 1 + 1 = 2, \quad 2 \neq 0 \quad \text{تحقق من أن نهاية المقام } \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{\sqrt{2x-3}+1}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} 2}{\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x-3}+1)} = \frac{2}{2} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x-1}}$

عند التعويض المباشر عن $x = 1$ في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\frac{x-1}{\sqrt[3]{x-1}} = \frac{(\sqrt[3]{x-1})^1(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{(\sqrt[3]{x-1})^3}$$

حل البسط: الفرق بين مكعبين

$$= \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1, \quad x \neq 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1) \quad \text{استخدم الصيغة المبسطة}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x^2} + \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x} + \lim_{x \rightarrow 1} 1$$

$$= \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 1} x^2} + \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 1} x} + 1$$

$$= 1 + 1 + 1 = 3$$

عوض عن $x = 1$

معلومة:

$$\begin{aligned} x-a &= (\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a}) \\ x \geq 0, \quad a \geq 0 &\quad \text{حيث} \\ x-a &= (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a})(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xa} + \sqrt[3]{a^2}) \\ x+a &= (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{a})(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xa} + \sqrt[3]{a^2}) \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt[3]{x+2}}$

عند التعويض عن $x = -2$ – في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 4}{\sqrt[3]{x+2}} &= \frac{(x^2 - 4)}{\sqrt[3]{x+2}} \times \frac{\sqrt[3]{(x+2)^2}}{\sqrt[3]{(x+2)^2}} \\ &= \frac{(x^2 - 4) \times \sqrt[3]{(x+2)^2}}{x+2} \\ &= \frac{\cancel{(x+2)}(x-2)\sqrt[3]{(x+2)^2}}{\cancel{(x+2)}}\end{aligned}$$

$\sqrt[3]{a^2}$ هو $\sqrt[3]{a}$

$$\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a} = a$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$= (x-2)\sqrt[3]{(x+2)^2}, \quad x \neq -2$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt[3]{x+2}} &= \lim_{x \rightarrow -2} ((x-2)\sqrt[3]{(x+2)^2}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x-2) \cdot \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{(x+2)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x-2) \cdot \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow -2} (x+2)^2} \\ &= (-2-2) \cdot \sqrt[3]{(-2+2)^2} \\ &= (-4) \times (0) = 0\end{aligned}$$

استخدم الصيغة المبسطة

حاول أن تحل

أو جد إن أمكن: 9

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 1}}{\sqrt[3]{x+1}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{3 - \sqrt{x}}$

مثال (10)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 6x^2 + 2x - 3}{x+1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^5 + 32}{x+2}$

: الحل

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 6x^2 + 2x - 3}{x+1}$

عند التعويض عن $x = -1$ – في كل من البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$\begin{array}{r} -1 | \quad 1 \quad 6 \quad 2 \quad -3 \\ \quad \quad -1 \quad -5 \quad 3 \\ \hline \quad 1 \quad 5 \quad -3 \quad 0 \end{array}$$

أقسم البسط على المقام ونوجد الناتج باستخدام القسمة التربيعية

الناتج: $x^2 + 5x - 3$ والباقي صفر

$$\frac{x^3 + 6x^2 + 2x - 3}{x + 1} = x^2 + 5x - 3, \quad x \neq -1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 6x^2 + 2x - 3}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 5x - 3) \\ &= (-1)^2 + 5(-1) - 3 \\ &= -7 \end{aligned}$$

عوّض عن x بـ -1

b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^5 + 32}{x + 2}$

عند التعويض عن x بـ -2 – في كل البسط والمقام نحصل على صيغة غير معينة.

$$x^5 + 32 = x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 32$$

$$\begin{array}{r} -2 | \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 32 \\ \quad \quad -2 \quad 4 \quad -8 \quad 16 \quad -32 \\ \hline \quad 1 \quad -2 \quad 4 \quad -8 \quad 16 \quad 0 \end{array}$$

أقسم البسط على المقام وأوجد الناتج باستخدام القسمة التربيعية

الناتج: $x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16$ والباقي صفر

$$\frac{x^5 + 32}{x + 2} = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16, \quad x \neq -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^5 + 32}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16)$$

عوّض عن x بـ -2

$$= (-2)^4 - 2(-2)^3 + 4(-2)^2 - 8(-2) + 16$$

$$= 16 + 16 + 16 + 16 + 16$$

$$= 80$$

بسط

حاول أن تحل

أوجد إن أمكن: 10

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 3}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^5 + x^3 + x + 22}{x - 2}$

نهايات تشمل على $-\infty$ ، ∞

Limits Involving $-\infty$, ∞

دعنا نفك ونتناقش



لتكن الدوال التالية: $f(x) = \frac{1}{x}$ ، $g(x) = x^2 + 1$

a أكمل الجدول التالي:

x	$f(x) = \frac{1}{x}$	$g(x) = x^2 + 1$
-100		
-3 000		
-60 000		
100		
3 000		
60 000		

b استنتج قيم الدوال الواردة أعلاه عندما تأخذ x قيمًا موجبة كبيرة جداً وعندما تأخذ x قيمًا سالبة صغيرة جداً.

Finite Limits as $x \rightarrow \pm\infty$

أولاً: نهايات محددة عندما $x \rightarrow \pm\infty$

إذا كانت x تأخذ قيمًا كبيرة جداً أي أن قيم x تكبر بلا حدود (تحريك مبتعدة كثيراً جهة اليمين على خط الأعداد) فإننا نقول $x \rightarrow \infty$.

وإذا كانت x تأخذ قيمًا صغيرة جداً أي أن قيم x تصغر بلا حدود (تحريك مبتعدة كثيراً جهة اليسار على خط الأعداد) فإننا نقول $x \rightarrow -\infty$.

تعريف (3)

لتكن f دالة معروفة في الفترة (a, ∞) فإن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

يعني أن قيم $f(x)$ تقترب باطراد من L عندما x تؤول إلى ∞ .

سوف تعلم

- نهايات محددة عندما $x \rightarrow \pm\infty$

- نهايات غير محددة عندما $x \rightarrow a$

- الخطوط المقاربة الرأسية والأفقية.

المفردات والمصطلحات:

- نهاية محددة

Finite Limit

- خط مقارب أفقي

Horizontal Asymptote

- خط مقارب رأسي

Vertical Asymptote

معلومة:

- من الأزل إلى الأبد
- الأزل: استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية من الماضي.
- الأبد: استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في المستقبل.




تعريف (4)

لتكن f دالة معروفة في الفترة $(-\infty, a)$ فإن:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

يعني أن قيم $f(x)$ تقترب باطراد من L عندما x تؤول إلى $-\infty$.



شكل (1)

في الشكل (1) من بيان الدالة f : $f(x) = \frac{1}{x}$
نجد أن :

عندما $x \rightarrow \infty$ فإن $f(x) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{ونعبر عن ذلك رياضيًّا:}$$

وعندما $x \rightarrow -\infty$ فإن $f(x) \rightarrow 0$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{ونعبر عن ذلك رياضيًّا:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \text{أي أنه :}$$

نظرية (7)

لتكن $f(x) = \frac{1}{x}$ فإن :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$



تدريب

الشكل يمثل بيان الدالة f : $f(x) = \frac{3}{x^2}$

أكمل ما يلي :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} = \dots \dots \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2} = \dots \dots \dots$$

نظرية (8)

لتكن $f(x) = \frac{k}{x^n}$ ، $n \in \mathbb{Z}^+$ ، $k \in \mathbb{R}$: f

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^n} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{k}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{x^3} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^4} = 0 \quad , \quad \dots \quad \text{فمثلاً :}$$

تبقى النظريات (2), (4), (6 a), (6 c) صحيحة عند إيجاد $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ وكذلك عند إيجاد $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(1) مثال

أوجد النهايات التالية إن أمكن:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+4}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+5}{x^2+25}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3}{5-7x^3}$

الحل:

$$\text{a) } \frac{1}{x+4} = \frac{1}{x(1+\frac{4}{x})} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\frac{4}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\frac{4}{x}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 1 + 0 = 1 , \quad 1 \neq 0$$

تحقق من أن نهاية المقام $\neq 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{4}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} (1)}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x} \right)}$$

$$= 0 \times \frac{1}{1+0} = 0$$

b) $\frac{x+5}{x^2+25} = \frac{\cancel{x}(1+\frac{5}{x})}{\cancel{x}^2(1+\frac{25}{x^2})} = \frac{1+\frac{5}{x}}{x(1+\frac{25}{x^2})} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1+\frac{5}{x}}{1+\frac{25}{x^2}} , \quad x \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+5}{x^2+25} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1+\frac{5}{x}}{1+\frac{25}{x^2}} \right) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} = 0 , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{25}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{25}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{25}{x^2} = 1 + 0 = 1 , \quad 1 \neq 0 \quad 0 \neq \text{نهاية المقام} , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{25}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+5}{x^2+25} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{5}{x} \right)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{25}{x^2} \right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{5}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} = 1 + 0 = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+5}{x^2+25} = 0 \times \frac{1}{1} = 0$$

c) $\frac{6x^3}{5-7x^3} = \frac{6\cancel{x}^3 \cancel{1}}{\cancel{x}^3 \left(\frac{5}{x^3} - 7 \right)} = \frac{6}{\frac{5}{x^3} - 7} , \quad x \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3}{5-7x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\frac{5}{x^3} - 7}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{x^3} - 7 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^3} - \lim_{x \rightarrow \infty} 7 = 0 - 7 = -7 , \quad -7 \neq 0 \quad 0 \neq \text{نهاية المقام} , \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^3} = 0$$

نظريّة (4)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\frac{5}{x^3} - 7} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 6}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{x^3} - 7 \right)} \\ = \frac{6}{-7} = -\frac{6}{7}$$

حاول أن تحل

أوجد النهايات التالية إن أمكن: 1

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{x^2+9}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3-3x+1}{x^3+5}$


Infinite Limits as $x \rightarrow c$

ثانيًا: نهايات غير محددة ($\pm \infty$) عندما $x \rightarrow c$

نعتبر على سبيل المثال الدالتين:


$$f(x) = \frac{1}{|x|}, \quad g(x) = \frac{-1}{|x|}$$

والممثلتين بيانياً بالمنحنين المرسومين



شكل (2)

$$f(x) = \frac{1}{|x|}$$



شكل (3)

$$g(x) = \frac{-1}{|x|}$$

نلاحظ من الشكل (2) أن قيم $f(x)$ تزداد بلا حدود كلما اقتربت قيم x من الصفر سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار لذلك فإن

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ غير موجودة لأنها تزايده بلا حدود.

ونعبر عن ذلك رياضياً بالصيغة:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = \infty$$


ويجب أن ندرك أن الرمز ∞ لا يعني قيمة معينة. (لا يمثل عدداً حقيقياً).

وإنما يفيد أن الدالة $f(x) = \frac{1}{|x|}$ تزايده بلا حدود عندما $x \rightarrow 0$:

وبالمثل نرى أن الدالة $g(x) = \frac{-1}{|x|}$ الممثلة بيانياً بالشكل (3) تتناقص بلا حدود كلما اقتربت قيم x من الصفر سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار أي عندما $x \rightarrow 0$ ، أي أن $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ غير موجودة لأنها تتناقص بلا حدود.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{|x|} = -\infty$$

ونعبر عن ذلك رياضياً بالصيغة:




شكل (4)

$$f(x) = \frac{1}{|x+1|}$$

من شكل (4) قيم $f(x)$ تزايد بلا حدود عندما $x \rightarrow -1$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x+1|} = \dots \dots \dots$$



شكل (5)

$$g(x) = \frac{-1}{|x+1|}$$

من شكل (5) قيم $g(x)$ تتناقص بلا حدود عندما $x \rightarrow -1$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-1}{|x+1|} = \dots \dots \dots$$

(5) تعريف

إذا كانت قيم $f(x)$ تزايد بلا حدود عندما تؤول x إلى c فإننا نعبر عن ذلك رياضيًّا بال التالي:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$$

إذا كانت قيم $f(x)$ تتناقص بلا حدود عندما x تؤول إلى c فإننا نعبر عن ذلك رياضيًّا بال التالي:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

(9) نظرية

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \iff (\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty \iff (\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty)$$

ملاحظات

- $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + b] = \pm \infty$ إذا كان b عدد حقيقي فإن: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm \infty$ ①
- $\lim_{x \rightarrow c} [b \cdot f(x)] = \pm \infty$ إذا كان b عدد حقيقي موجب فإن: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm \infty$ ②
- $\lim_{x \rightarrow c} [b \cdot f(x)] = \mp \infty$ وإذا كان b عدد حقيقي سالب فإن:
- $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \infty$, $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \infty$: فإذا كان $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ ③
- $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \infty$: فإذا كان $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ ④
- $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = -\infty$: فإذا كان $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ ⑤

نظرية (10)

إذا كان n عدد صحيح زوجي موجب فإن:


$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{(x - c)^n} = \infty$$

إذا كان n عدد صحيح فردي موجب فإن:


1) $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{1}{(x - c)^n} = \infty$

2) $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{1}{(x - c)^n} = -\infty$

حيث $c \in \mathbb{R}$



$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x - 2)^6} = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x - 2)^7} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x - 2)^7} = -\infty$$

مثال (2)

أوجد إن أمكن: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x - 2|}$

الحل:

$$\frac{1}{|x - 2|} = \begin{cases} \frac{1}{x - 2} & : x > 2 \\ \frac{-1}{x - 2} & : x < 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{|x - 2|} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \infty \quad (1)$$

نظرية

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{|x - 2|} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-1 \cdot \frac{1}{x - 2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)} = -\infty, \quad -1 < 0 \\ & \therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-1 \cdot \frac{1}{x-2} \right) = \infty \quad (2) \end{aligned}$$

نظرية
استخدم ملاحظة (2)
من (1) ، (2)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = \infty$$

حاول أن تحل


$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{|x+1|} \quad (2)$$

Definition of Horizontal Asymptote

تعريف (6): الخط المقارب (المحاذي) الأفقي

الخط $y = b$ يسمى خط مقارب أفقي لمنحنى الدالة $f(x) = y$ إذا توفر أحد الشرطين التاليين أو كلاهما:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$



شكل (6)

بالنظر إلى بيان الدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ نلاحظ أن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

ونقول إن الخط المستقيم $y = 0$ هو خط مقارب أفقي (أو محاذي أفقي) لمنحنى الدالة f . (الشكل (6))

وكذلك بالنظر إلى بيان الدالة $g(x) = 2 + \frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x} \right) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x} \right) = 2$$

ونقول إن الخط المستقيم $y = 2$ هو خط مقارب أفقي لمنحنى الدالة g . (الشكل (7))

ونلاحظ أنه إذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ فإن الخط المقارب الأفقي وحيد وهو $y = b$.


قد يكون لمنحنى الدالة أكثر من خط مقارب أفقي.

فمثلاً:

لمنحنى الدالة h في الشكل المقابل خطان مقاربان أفقيان هما:

$$y = -1 \quad \text{و} \quad y = 1$$

لاحظ أن: $h(x) = \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$ (الشكل (8))



شكل (8)

ملاحظة:


ستقتصر دراستنا على المحاذيات الأفقية لدوال الحدوبيات النسبية.

Definition of Vertical Asymptote

تعريف (7): الخط المقارب (المحاذي) الرأسي

الخط $x = a$ يسمى خط مقارب رأسي لمنحنى الدالة $y = f(x)$ إذا توفر على الأقل أحد الشروط التالية:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \end{aligned}$$




شكل (9)

بالنظر إلى بيان الدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ نلاحظ أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

ونقول إن الخط المستقيم $x = 0$ هو خط مقارب (محاذي) رأسي لمنحنى الدالة f .
(الشكل (9))




شكل (10)
 $f(x) = \frac{1}{x-2}$

بالنظر إلى بيان الدالة $f(x) = \frac{1}{x-2}$ نلاحظ أن:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{1}{x-2} \right) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x-2} \right) = +\infty$$

ونقول إن الخط المستقيم $x = 2$ هو خط مقارب رأسي لمنحنى الدالة f .
(الشكل (10))
نلاحظ أن $x = 2$ هو صفر المقام.



شكل (11)

$$f(x) = \frac{3}{(x+2)(x-1)}$$

بالنظر إلى بيان الدالة $f(x) = \frac{3}{(x+2)(x-1)}$:

نلاحظ أن: $x = -2, x = 1$ هما مقاربان (محاذيان) رأسيان لمنحنى الدالة f .
(الشكل (11))


ونلاحظ أيضًا أن $-1, 2$ هما صفرًا للمقام.

ملاحظة:

إذا كانت الدالة $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ حيث h كثيرتي حدود وليس بينهما عوامل مشتركة، فإن لكل صفر c لدالة المقام h يكون المستقيم $x = c$ خطًا مقاربًا رأسيًا (أو محاذياً رأسيًّا).

أما في حالة وجود عوامل مشتركة بين h و g فيكون المحاذي الرأسي عند صفر (أصفار) المقام بعد التبسيط.

مثال (3)



أوجد إن أمكن معادلات الخطوط المقاربة الرأسية والخطوط المقاربة الأفقية لكل مما يلي:

a) $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$

b) $h(x) = \frac{x-1}{x^2 - 3x + 2}$

الحل:

a) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

صفر المقام هما: $x = -2, x = 2$ ، وليست أصفاراً للبسط.

. \therefore المستقيمان $x = 2$ ، $x = -2$ هما المقاربان الرأسيان لمنحنى الدالة g .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{1 - \frac{4}{x^2}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1) - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2}} \\ &= \frac{0}{1 - 0} = 0 \\ \therefore \text{المستقيم } y = 0 &\text{ هو خط مقارب أفقي لمنحنى } g. \end{aligned}$$

b) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$

$$h(x) = \frac{x-1}{x^2 - 3x + 2}$$

نضع $h(x)$ في أبسط صورة

$$= \frac{x-1}{(x-1)(x-2)}$$

$$= \frac{1}{x-2} , \quad x \neq 1$$

صفر للمقام وليس من أصفار البسط

. \therefore المستقيم $x = 2$ خط مقارب رأسى لمنحنى h .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x}} \\ &= \frac{0}{1 - 0} = 0 \end{aligned}$$

. \therefore المستقيم $y = 0$ هو خط مقارب أفقي لمنحنى h

حاول أن تحل

3) أوجد إن أمكن معادلات الخطوط المقاربة الرأسية والخطوط المقاربة الأفقية لمنحنىات الدوال التالية:

a) $f(x) = \frac{x-3}{x^2 - 9}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

c) $f(x) = \frac{2x}{x-3}$

صيغ غير معينة

Indeterminate Forms


دعنا نفك ونتناقش

إذا كانت f دالة قوى حيث: $f(x) = ax^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \neq 0$

فإن بيان هذه الدالة يمكن أن يأخذ أحد الأشكال أدناه:

أكمل ما يلي:


$a < 0$, n عددًا زوجيًّا ②



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots$$


$a > 0$, n عددًا زوجيًّا ①



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots$$


$a < 0$, n عددًا فرديًّا ④



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots$$

$a > 0$, n عددًا فرديًّا ③



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \dots$$

سوف تعلم

• صيغ غير معينة

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{-\infty}{\infty}, \frac{\infty}{-\infty}$$

$$\frac{-\infty}{-\infty}, \infty - \infty$$

المفردات والمصطلحات:

• صيغة غير معينة

Indeterminate Form

تذكرة:

إذا كانت:

$$f(x) = ax^n$$

$$n \in \mathbb{Z}^+, a \neq 0$$

فإن:

درجة الدالة هي n ومعاملها

الرئيسي a .

معلومة:

أنواع من الصيغ غير المعينة:

$$\frac{0}{0}, (0)^0$$

$$(\infty)^0, (0 \times \infty)$$

من فقرة «دعنا نفك ونتناقش» نجد أن:

لتكن: $f(x) = ax^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{R}$ *

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

إذا كان n عدد زوجي فإن:

إذا كان n عدد فردي فإن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} ax^n = \begin{cases} -\infty & : a > 0 \\ \infty & : a < 0 \end{cases}$$

فمثلاً: $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^5) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x^3 = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^7) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-4x^4) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (5x^2) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{3} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (-3x^4) = -\infty$$

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0, \quad a_n \in \mathbb{R}^* \quad \text{ملاحظة: إذا كانت}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \quad \text{فإن:}$$

أحياناً نحتاج لحساب نهاية دالة على الصورة:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \pm \infty$$

في هذه الحالة نحصل على إحدى الصور التالية:

ونسميهها صيغ غير معينة.

كذلك إذا حسبنا $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x))$ وحصلنا على الصورة $(\infty - \infty)$

فهي تسمى أيضاً صيغة غير معينة.

في الحالات السابقة نلجأ لبعض الأساليب الجبرية لحساب قيمة هذه النهايات والأمثلة والنظريات التالية ستوضح كيفية حساب مثل هذه النهايات.

مثال (1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 - 3x + 1) \quad \text{أوجد:}$$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 \quad \text{بالتعويض المباشر} \\ = \infty$$

حاول أن تحل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-3x^2 + 2x - 4) \quad (1) \quad \text{أوجد:}$$

مثال تمهيدي

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x}{4x^2 + 5}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 2x^2 - 7}{3x^4 - 2x}$

الحل:

لـ حـسـبـنـاـ نـهـيـةـ دـالـةـ الـبـسـطـ عـلـىـ نـهـيـةـ دـالـةـ الـمـقـامـ لـحـصـلـنـاـ عـلـىـ صـيـغـةـ غـيرـ مـعـيـنـةـ لـذـاـ سـنـلـجـأـ لـلـحـلـ التـالـيـ:

$$\frac{3x^2 - 2x}{4x^2 + 5} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{5}{x^2}} \quad x \neq 0$$

أـقـسـمـ كـلـاـ منـ الـبـسـطـ وـ الـمـقـامـ عـلـىـ x^2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{5}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2} = 4 + 0 = 4 \quad , \quad 4 \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 3 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 3 - 0 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x}{4x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{5}{x^2}}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2}{x} \right)}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{5}{x^2} \right)}$$

$$= \frac{3}{4}$$

لـ حـسـبـنـاـ نـهـيـةـ دـالـةـ الـبـسـطـ عـلـىـ نـهـيـةـ دـالـةـ الـمـقـامـ لـحـصـلـنـاـ عـلـىـ صـيـغـةـ غـيرـ مـعـيـنـةـ لـذـكـرـ نـقـسـمـ كـلـاـ منـ الـبـسـطـ وـ الـمـقـامـ عـلـىـ x^4 (أـكـبـرـ قـوـةـ لـ x).

$$\frac{5x^3 + 2x^2 - 7}{3x^4 - 2x} = \frac{\frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^4}}{3 - \frac{2}{x^3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2}{x^2} \right) = 3 - 0 = 3 \quad , \quad 3 \neq 0$$

التحقق من أن نهاية المقام ≠ 0

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 2x^2 - 7}{3x^4 - 2x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^4}}{3 - \frac{2}{x^3}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7}{x^4}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 3 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^3}} \\ &= \frac{0 + 0 - 0}{3 - 0} = 0 \end{aligned}$$

نلاحظ من المثال التمهيدي a) أن درجة الحدودية في البسط تساوي درجة الحدودية في المقام تساوي 2 وأن نهاية الدالة النسبية تساوي $\frac{3}{4}$

وهو ناتج قسمة معامل x بأـكـبـرـ قـوـةـ فيـ الـبـسـطـ عـلـىـ معـاـلـ x بأـكـبـرـ قـوـةـ فيـ الـمـقـامـ.

ونلاحظ في المثال التمهيدي b) أن درجة الحدودية في البسط أـصـغـرـ منـ درـجـةـ الـحـدـودـيـةـ فيـ الـمـقـامـ وأن نهاية الدالة النسبية تساوي 0

نستطيع تعميم ذلك من خلال النظرية التالية:

نظريه (11)

إذا كانت كل من f ، g دالة حدودية حيث:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0 \quad \text{فإن}$$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_m} : n = m$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 : n < m$

ملاحظة: تبقى النظرية صحيحة عندما $x \rightarrow -\infty$

مثال (2)

استخدم النظرية السابقة في حساب كل من:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3x^3}{2x^3 + 5}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^4 - x}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 1}{7 - 2x^4}$

الحل:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3x^3}{2x^3 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^3 + 4}{2x^3 + 5} = \frac{-3}{2}$

نظرية: $n = m = 3$ (درجة حدودية البسط = درجة حدودية المقام)

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^4 - x} = 0$

نظرية: $n = 2$ ، $m = 4$ ، $n < m$ (درجة حدودية البسط أصغر من درجة حدودية المقام)

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 1}{7 - 2x^4} = -\frac{1}{2}$

نظرية: $n = m = 4$ (درجة حدودية البسط = درجة حدودية المقام)

حاول أن تحل

2) استخدم النظرية السابقة في حساب كل من:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + 5x + 1}{6x^2 - x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{4x^3 - 2x + 3}$

مثال (3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx + 3}{2x + 5} = 3$$

إذا كانت a ، b فأوجد قيمة كل من الثابتين

الحل:

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx + 3}{2x + 5} = 3 , \quad 3 \neq 0$$

.. درجة الحدودية في البسط يجب أن تكون متساوية لدرجة الحدودية في المقام أي أن الحدودية في البسط يجب أن تكون من الدرجة الأولى.

$$ax^2 = 0 \implies a = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx + 3}{2x + 5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{bx + 3}{2x + 5}$$

$$= \frac{b}{2}$$

$$\therefore \frac{b}{2} = 3 \implies b = 6$$

نظريّة $m = n = 1$

حاول أن تحل

أوجد قيمة كل من الأثابتين a, b إذا كانت $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{ax^2+bx-3} = -1$ 3

(4) مثال

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{\sqrt{x^2+2x-4}} \quad \text{أوجد:}$$

الحل:

$$f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+2x-4}} = \frac{x\left(1-\frac{2}{x}\right)}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}\right)}}$$

$$= \frac{x\left(1 - \frac{2}{x}\right)}{|x|\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - \frac{4}{x^2}}$$

$$= \frac{x^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{2}{x}\right)}{\sqrt{x + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}}}$$

$$= \frac{1 - \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}}}$$

عندما $x > 0$ يكون: $|x| = x$

شرط $x \neq 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2}$$

$$= 1 + 0 - 0 = 1 \quad , \quad 1 > 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}\right)} = \sqrt{1} = 1 \quad , \quad 1 \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x}$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}}}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)}{\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}}}$$

$$= \frac{1}{1} = 1$$

حاول أن تحل

أوجد: 4

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2 - x}}{x + 1}$


b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 5}{\sqrt{x^2 - 9}}$

نهايات بعض الدوال المثلثية

Limits of Some Trigonometric Functions

دعا نفكّر ونتناقش

عند حساب: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ وتمثيلها بيانياً كما في الشكل (1)، تقترب قيمتها من الواحد عندما تقترب x من الصفر (rad). وفي هذه الحالة نقول إنّ نهاية $f(x)$ تساوي 1 عندما تقترب x بشكل كافٍ من الصفر دون أن تساويه.



شكل (1)

يبين الشكل (1) الرسم البياني للدالة f كما يعطي الجدول أعلاه قيمة الدالة موضحاً أنّ نهاية $f(x)$ تساوي 1 عندما تقترب x من الصفر.

x	y
-0.3	0.98507
-0.2	0.99335
-0.1	0.99833
-0.01	0.9998
0	ERROR
0.01	0.9998
0.1	0.99833
0.2	0.99335
0.3	0.98507
$y = \frac{\sin x}{x}$	

من فقرة «دعا نفكّر ونتناقش» نجد أن:

نظرية (12)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad , \quad \text{حيث } x \text{ بالراديان}$$

نتيجة (1)

إذا كان a, b عددين حقيقيين، $a \neq 0, b \neq 0$ فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b} , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{\sin ax} = \frac{b}{a}$$

سوف تعلم

- نهايات بعض الدوال المثلثية.
- نظرية الإحاطة.
- استخدام نظرية الإحاطة.

المفردات والمصطلحات:

Limit of a Trigonometric Function

- نظرية الإحاطة

Sandwich Theorem

معلومة:

في دراستنا للدوال المثلثية يكون قياس الزوايا بالراديان.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} = \frac{2}{5} \quad \text{فمثلاً:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 3x} = \frac{2}{3}$$

وبتطبيق تعريف النهاية على الدوال المثلثية الأساسية نجد أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0$$

ويمكننا تطبيق نظريات النهايات من البنود السابقة في إيجاد نهايات الدوال المثلثية. يمكننا استنتاج أن: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos ax = 1, \quad a \in R$

مثال (1)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{\cos x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x}$

الحل:

a)
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2} \\ &= 1 \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

نظرية (قاعدة الضرب)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{\cos x}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \cos x &= 1, \quad 1 \neq 0 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{\cos x} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x-3)}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} \\ &= \frac{-3}{1} \\ &= -3 \end{aligned}$$

نظرية

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} \times \frac{1+\cos x}{1+\cos x}$

اضرب البسط والمقام في $1 + \cos x$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{(1-\cos x)(1+\cos x)} \cdot (1+\cos x) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{1-\cos^2 x} \cdot (1+\cos x) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot (1+\cos x) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot (1+\cos x) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1+\cos x) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1) + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right) \\ &= (1)^2 \times (1+1) \\ &= 1 \times 2 = 2 \end{aligned}$$

حاول أن تحل

a) هل يمكنك حل c) في المثال (1) بطريقة أخرى؟
أوجد النهاية: b)

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x^2-x}$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x \cos x}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\cos x - 1}$

مثال (2)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \tan x - 3 \sin x}{4x}$

الحل:

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, 1 \neq 0$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$

$= 1 \times \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = 1 \times \frac{1}{1} = 1$

قاعدة الضرب، توزيع النهاية

$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \neq 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \tan x - 3 \sin x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5 \tan x}{4x} - \frac{3 \sin x}{4x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \tan x}{4x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{4x}$

$= \frac{5}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} - \frac{3}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

$= \frac{5}{4} \times 1 - \frac{3}{4} \times 1$

$= \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

بسط

حاول أن تحل

أوجد: 2

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \tan x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan x + x^2 \cos x}{5x}$

نتيجة (2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

نتيجة (3)

إذا كان $a, b \in \mathbb{R}^*$ فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$$

مثال (3)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + \sin x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \tan x - 2x \cos x}{3x}$

الحل:

$$\begin{aligned} \text{a} \quad \frac{5x + \sin x}{x} &= \frac{5x}{x} + \frac{\sin x}{x} \\ &= 5 + \frac{\sin x}{x} \end{aligned}$$

قسمة البسط على المقام

بسط: $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + \sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} 5 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= 5 + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

نظريّة (قاعدة الجمع)

$$\text{b} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{3} \cdot \frac{\tan x}{x} - \frac{2}{3} \cos x \right)$$

قسمة البسط على المقام

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \cos x \\ &= \frac{1}{3} \times 1 - \frac{2}{3} \times 1 \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

بسط

حاول أن تحل

أوجد: 3

$$\text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x - x^2}{3x^2}$$

$$\text{b} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x + 3x \cos 4x}{5x}$$

Sandwich Theorem

نظرية الإحاطة

إذا لم يكن ممكناً إيجاد قيمة النهاية بطريقة مباشرة، فيمكننا إيجادها بطريقة غير مباشرة باستخدام نظرية الإحاطة.

تتعلق هذه النظرية بدلالة f قيمتها بين قيم دالتيين آخرين g , h ، حيث إذا كان للدالتين g , h النهاية نفسها عندما $x \rightarrow c$ فإن للدلالة f حينها النهاية نفسها عندما $x \rightarrow c$


معلومة:

تسمى نظرية الإحاطة أحياناً

Squeeze Theorem

Sandwich Theorem

or Pinching Theorem



نظرية (13): نظرية الإحاطة Sandwich Theorem

ليكن c , L عددين حقيقيين

فإذا كان $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ لـ كل x في جوار c ، c

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L \quad \text{وكان}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{فإن:}$$

مثال (4)

أوجد:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(4 - x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)$

الحل:

نعلم أنَّ قيم دالة الجيب تتسمى إلى الفترة $[-1, 1]$

لذلك فإنَّ:

$$-1 \leq \sin\frac{1}{x} \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \sin\frac{1}{x} \leq x^2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin\frac{1}{x} \right) = 0$$

ومن نظرية الإحاطة

b) $-1 \leq \sin\frac{1}{x} \leq 1 \implies 1 \geq -\sin\frac{1}{x} \geq -1$

قيم دالة الجيب تتسمى إلى الفترة $[-1, 1]$

$$-1 \leq -\sin\frac{1}{x} \leq 1$$

$$-x^2 \leq -x^2 \sin\frac{1}{x} \leq x^2$$

$$4 - x^2 \leq 4 - x^2 \sin\frac{1}{x} \leq 4 + x^2$$

أضف 4

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (4 - x^2) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (4 + x^2) = 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(4 - x^2 \sin\frac{1}{x} \right) = 4$$

نظرية الإحاطة



حاول أن تحل

أوجد: 4

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \cos\frac{1}{x^2} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + x^2 \sin\frac{1}{2x} \right)$

الأشكال التالية تحقق بيانياً المثال . 4



كذلك يمكننا استخدام نظرية الإحاطة في إيجاد نهايات الدوال المثلثية عندما $x \rightarrow \pm\infty$.

مثال (5)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$$

أوجد:

الحل:

نعلم أن:

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\forall x > 0, \quad -\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$


نظرية الإحاطة

حاول أن تحل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x+1}$$

أوجد:

ويمكننا التأكد من صحة حل المثال السابق بيانياً كالتالي:



الرسم البياني للدالة $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ يتذبذب حول محور السينات، وسعة التذبذب تتناقص للصفر عندما $x \rightarrow \pm\infty$.

يبين جدول قيم الدالة f أن $f(x) \rightarrow 0$ عندما $x \rightarrow \infty$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$


ويمكن استنتاج

كذلك يمكن استنتاج

الرسم البياني للدالة $f(x) = \frac{\cos x}{x}$: $f(x) \rightarrow 0$ عندما $x \rightarrow \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$$

x (rad)	$y = \frac{\cos x}{x}$
$\frac{7\pi}{2}$	-0.091
$\frac{37\pi}{7}$	0.0224
150	-0.00477
240	0.00394
300	-0.00333
600	0.000074







الاتصال

Continuity

دعنا نفكّر ونناقش

البيانات التالية توضح منحنيات دوال مختلفة:



أي من المحننات أمكن رسمه دون رفع سين القلم؟ وأيها لزم رفع سين القلم؟

Continuity at a Point


الاتصال عند نقطة

1 المحننات في البيانات **a**, **b**

نقول عنها أن ليس بها **نقاط انفصال** «متصلة عند كل نقطة من نقاطها».

2 المحننات في البيانات **c**, **d**

نقول إن هذه المحننات لها نقاط انفصال.



شكل (2)



شكل (1)

يستخدم الأطباء مبدأ الاتصال للدراسة منحني تخطيط القلب.
يبيّن الشكل (1) تخطيطاً متصلًا بينما يبيّن الشكل (2) تخطيطاً به نقاط انفصال.

سوف تعلم

- الاتصال عند نقطة.
- الانفصال عند نقطة.
- أنواع الانفصالت.
- التخلص من الانفصالت.

المفردات والمصطلحات:

Continuity الاتصال

اتصال من الجهتين

Two-Side Continuity

اتصال من جهة اليمين

Continuity From the Right

اتصال من جهة اليسار

Continuity From the Left

الاتصال عند نقطة

Continuity at a Point

Discontinuity انفصال

انفصال يمكن التخلص منه

Removable Discontinuity

انفصال نتيجة فجوة

Jump Discontinuity


انفصال لا نهائي

Infinite Discontinuity

معلومات:

بيان تخطيط القلب يعتبر
بووضوح عن الاتصال إذا كان
القلب سليمًا ومعافي، وعن
الانفصال إذا كان يوجد انسداد
في الشرايين.






$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \dots\dots\dots$$

$$f(3) \dots\dots\dots$$


ماذا تلاحظ؟



$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \dots\dots\dots$$

$$f(3) \dots\dots\dots$$


ماذا تلاحظ؟



$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \dots\dots\dots$$

$$f(3) \dots\dots\dots$$

ماذا تلاحظ؟



$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \dots\dots\dots$$

$$f(3) \dots\dots\dots$$

ماذا تلاحظ؟

تعريف (8): الاتصال عند نقطة

تكون الدالة f متصلة عند $x = c$ في مجالها إذا كانت $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

من التعريف السابق نجد أنه لتكون f متصلة عند c يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة التالية:

1) الدالة f معرفة عند $x = c$ أي $f(c)$ موجودة.

2) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة

3) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

وإذا لم يتحقق أي شرط من الشروط السابقة فنقول إن f منفصلة (ليست متصلة) عند $x = c$.

مثال (1)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & : x \geq 1 \\ 5x - 1 & : x < 1 \end{cases}$$

لتكن f :

ابحث اتصال الدالة f عند $x = 1$

الحل:

$$f(1) = (1)^2 + 3(1) = 1 + 3 = 4 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (5x - 1) = 5(1) - 1 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 3x) = (1)^2 + 3(1) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

من (1) و (2)

$x = 1$ متصلة عند f ∴

حاول أن تحل

ابحث اتصال f عند $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x & : x \leq 0 \\ \frac{x^2}{x+1} & : x > 0 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad 1$$

مثال (2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & : x > 3 \\ 7 & : x \leq 3 \end{cases} \quad \text{لتكن } f \quad 2$$

ابحث اتصال الدالة f عند $x = 3$.

الحل:

$$f(3) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 7 = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} (x+3) = 3+3 = 6$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

ليست موجودة

∴ الدالة f ليست متصلة عند $x = 3$.

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & : x < 2 \\ 1 & : x = 2 \\ x^2 + 1 & : x > 2 \end{cases}$$

ابحث اتصال الدالة f عند $x = 2$ حيث

في المثال السابق نجد أن $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) = 7$ في هذه الحالة تكون الدالة f متصلة عند $x = 3$ من جهة اليسار وسوف نطرق لذلك لاحقاً.

مثال (3)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{|x-2|} & : x \neq 2 \\ 1 & : x = 2 \end{cases}$$

ابحث اتصال الدالة f عند $x = 2$ حيث $|x-2| = \begin{cases} x-2 & : x > 2 \\ -x+2 & : x < 2 \end{cases}$ الحل:

$$\frac{x-2}{|x-2|} = \begin{cases} \frac{x-2}{x-2} & : x > 2 \\ \frac{-x+2}{x-2} & : x < 2 \end{cases}$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 1 & : x > 2 \\ -1 & : x < 2 \\ 1 & : x = 2 \end{cases}$$

$$f(2) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

ليست موجودة

$$|x-2| = \begin{cases} x-2 & : x > 2 \\ -x+2 & : x < 2 \end{cases}$$

\therefore الدالة f ليست متصلة عند $x = 2$.




حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x+1|}{x+1} - 2x & : x \neq -1 \\ 2 & : x = -1 \end{cases}$$

ابحث اتصال الدالة f عند $x = -1$ حيث $\frac{|x+1|}{x+1} = \begin{cases} 1 & : x > -1 \\ -1 & : x < -1 \end{cases}$

ملاحظة: في المثال السابق الدالة f متصلة عند $x = 2$ من جهة اليمين. لماذا؟



يبين الشكلان **a**, **b** أدناه أمثلة توضيحية لبعض الأنواع المختلفة للانفصال:



فالدالة الموضحة في الشكل **a** متصلة عند $x = 0$ ، والدالة الموضحة في الشكل **b** ليست متصلة عند $x = 0$ ولكي تكون متصلة يقتضي أن تكون $f(0) = 0$. الدالة الموضحة في الشكل **c** ليست متصلة عند $x = 0$ ولكي تكون متصلة يقتضي أن تكون $f(0) = 1$ مساوية لـ 1 بدلاً من 2.


الانفصال في **b**, **c** هو انفصال يمكن التخلص منه من خلال إعادة تعريف الدالة عند $x = 0$ وذلك بوضع $f(0) = 0$.

والأشكال التالية أمثلة أخرى لدوال منفصلة:



وإذا نظرنا إلى الانفصال في **d** ، **e** حيث $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ غير موجودة ولا توجد طريقة لإصلاح ذلك الوضع بتغيير f عند الصفر. للدالة في **d** لها انفصال ناتجة قفزة؛ وال نهايات ذات الجانب الواحد موجودة لكن لها قيم مختلفة. (نهاية الدالة من جهة اليمين \neq نهاية الدالة من جهة اليسار).
والدالة $f(x) = \frac{1}{x^2}$ في **e** لها انفصال لا نهائي. (النهاية غير موجودة).

The Removal of Discontinuity




ومن الرسم البياني للدالة f نلاحظ أن لبيان f انفصال عند $x = 3$ يمكن التخلص منه لأن النهاية موجودة بينما الانفصال عند $x = -3$ لا يمكن التخلص منه لأن النهاية غير موجودة.

و للتخلص من الانفصال نعرف f عند $x = 3$ ب حيث يجعل $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 9)}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{9+9+9}{3+3} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}\end{aligned}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} & : x \neq 3, x \neq -3 \\ \frac{9}{2} & : x = 3 \end{cases}$$

نسمي الدالة g بعد إعادة تعريفها:



مثال (4)

لتكن الدالة: $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ الموضح بيانها بالشكل

a بين أن $f(x)$ غير متصلة عند $x = 2$ ، $x = -2$

b أعد تعريف الدالة f بحيث تصبح متصلة عند $x = 2$

الحل:

a) $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$
 $= \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2} , \quad x \neq 2$

حل المقام إلى عوامل

$D = \mathbb{R} - \{-2, 2\} : f$ مجال

غير متصلة عند $x = 2 , x = -2$ لأنها غير معروفة عند هما.

b) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$

\therefore يمكن إعادة تعريف f عند $x = 2$ لأن $x = 2$

نعيد تعريف الدالة f ونسمى الدالة بـ g .

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x^2-4} & : x \neq 2 , x \neq -2 \\ \frac{1}{4} & : x = 2 \end{cases}$$

حاول أن تحل

4) أعد تعريف الدالة f : $f(x) = \frac{x^2+3x-4}{x-1}$ لتصبح دالة متصلة عند $x = 1$.

نظريات الاتصال

Continuous Theorems

دعنا نفك ونناقش

لتكن الدالة $f : x^3 - 3x^2 + 2x$

والدالة $g : |x - 2|$

والدالة $q : x^2 - 5$

ابحث اتصال كل من f, g عند $x = 2$ ①

ابحث اتصال كل من $f + q, f \cdot q$ عند $x = 2$ ②

لتكن $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ ③

اكتب h دون استخدام رمز القيمة المطلقة. ④

هل الدالة h متصلة عند $x = 2$? ولماذا؟ ⑤

سوق تعلم

- نظريات الاتصال.
- دوال متصلة.
- الدوال المركبة.
- اتصال الدوال المركبة.

المفردات والمصطلحات:

- دالة متصلة

Continuous Function

- دالة مركبة

Composite Function

نظرية (14): خواص الدوال المتصلة

Properties of Continuous Functions

إذا كانت f, g دالتين متصلتين عند $x = c$, فإن الدوال التالية هي دوال متصلة عند $x = c$

1 $f + g$ الجمع:

2 $f - g$ الطرح:

3 $k \cdot f$, $k \in \mathbb{R}$ الضرب في ثابت:

4 $f \cdot g$ الضرب:

5 $\frac{f}{g}$, $g(c) \neq 0$ القسمة:

معلومة:

تمثل الأقواء المنحنية خطأً متصلةً
لمسار العربة.



Continuous Functions

دوال متصلة

1 الدالة $f(x) = k$ حيث k ثابت متصلة عند كل $x \in \mathbb{R}$.

2 الدالة كثيرة الحدود متصلة عند كل $x \in \mathbb{R}$.

3 الدالة الحدودية النسبية $\frac{f}{g}$ متصلة عند كل عدد حقيقي c في مجالها أي $c \in D$.

4 الدالة $f(x) = |x|$ متصلة عند كل $x \in \mathbb{R}$.

5 الدوال المثلثية الأساسية متصلة عند كل عدد حقيقي c في مجالها أي $c \in D$.

مثال (1)

ابحث اتصال الدالة f في كل مما يلي:

a) $f(x) = x^2 + |x|$, $c = -1$

b) $f(x) = \sin x - \cos x$, $c = \frac{\pi}{2}$

الحل:

a) لتكن الدالة g :

الدالة h :

الدالة g دالة كثيرة حدود متصلة عند $x = -1$

الدالة h دالة مطلق x متصلة عند $x = -1$

∴ دالة الجمع f حيث $f(x) = g(x) + h(x)$ هي دالة متصلة عند $x = -1$ (نظريه)

b) لتكن الدالة g :

الدالة h :

الدالة g دالة مثلثية متصلة عند $x = \frac{\pi}{2}$

الدالة h دالة مثلثية متصلة عند $x = \frac{\pi}{2}$

∴ دالة f حيث $f(x) = g(x) - h(x)$ متصلة عند $x = \frac{\pi}{2}$ (نظريه)

حاول أن تحل

1 ابحث اتصال الدالة f في كل مما يلي:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3 + |x|$, $c = 3$

b) $f(x) = \frac{\tan x}{x+1}$, $c = \frac{\pi}{4}$

مثال (2)

ابحث اتصال الدالة f في كل مما يلي:

الحل:

لتكن الدالة g :

الدالة h :

الدالة g دالة حدودية نسبية متصلة عند $x = 3$ (لأن المقام لا يساوي الصفر عند $x = 3$).

الدالة h دالة حدودية نسبية متصلة عند $x = 3$ (لأن المقام لا يساوي الصفر عند $x = 3$).

∴ دالة الطرح f حيث $f(x) = g(x) - h(x)$ هي دالة متصلة عند $x = 3$ (نظريه)

حاول أن تحل

2 ابحث اتصال الدالة f في كل مما يلي:

اتصال الدوال الجذرية عند نقطة

(15) نظرية

- a** الدالة الجذرية $y = \sqrt[n]{x}$ متصلة عند كل $x = c : c \in \mathbb{R}^+$ عدد صحيح زوجي موجب،
b إذا كانت g دالة متصلة عند $c = x$ وكانت $g(c) > 0$ فإن الدالة: $f(x) = \sqrt[g]{g(x)}$ متصلة عند c عدد صحيح فردي أكبر من 1.

(3) مثال

- ابحث اتصال كل من الدالتين التاليتين عند العدد المبين:
- a** $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2 + 1}$ ، $x = 1$
- b** $f(x) = \sqrt{x+3}$ ، $x = -1$
- الحل:
- a** لتكن الدالة $g(x) = \sqrt[3]{x}$: $h(x) = x^2 + 1$: الدالة g دالة جذرية حيث $n = 3$ (عدد صحيح فردي) متصلة عند $x = 1$ دالة كثيرة حدود متصلة عند $x = 1$ وحيث إن $h(1) = 2$ ، $2 \neq 0$.
 \therefore الدالة f حيث $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ متصلة عند $x = 1$ نفرض أن $g(x) = x + 3$ حيث $x \geq -3$ دالة متصلة عند $x = -1$ وحيث إن $g(-1) = 2$ ، $2 > 0$.
 \therefore الدالة f حيث $f(x) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+3}$ متصلة عند $x = -1$.
- (نظرية)**

حاول أن تحل

- 3 ابحث اتصال كل من الدالتين التاليتين عند $x = -2$
- a** $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2 + 4}$
- b** $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$

Composite Function

الدالة المركبة

إذا كانت كل من g ، f دالة حقيقية فإننا سنرى من خلال بعض الأمثلة أنها نستطيع تعريف دالة جديدة تنتج من تركيب الدالتين f ، g إذا توفرت بعض الشروط.
لنأخذ على سبيل المثال الدالتين الحقيقيتين:

$$f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x - 1 \quad \text{حيث:}$$


$$g : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = 3x + 1$$

واضح أن:

تحت تأثير الدالة الأولى f		تحت تأثير الدالة الثانية g	
1	$1 - 1 = 0$	0	$3 \times 0 + 1 = 1$
2	$2 - 1 = 1$	1	$3 \times 1 + 1 = 4$
3	$3 - 1 = 2$	2	$3 \times 2 + 1 = 7$
4	$4 - 1 = 3$	3	$3 \times 3 + 1 = 10$

وإذا فرضنا دالة ثالثة تعامل عمل الدالتين g ، f معًا ($f \circ g$) لوجدنا أنه تحت تأثير هذه الدالة الجديدة:



نرمز للدالة الجديدة بالرمز $(g \circ f)$ وتقرأ g بعد f

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(0) = 1$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(1) = 4$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(2) = 7$$

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(3) = 10$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

ويكون:

لاحظ أن: مدى الدالة الأولى f هو مجال الدالة الثانية g وإلا لما أمكن تعريف $(g \circ f)$.

وعموماً:

إذا كانت كل من g ، f دالتين حقيقيتين وكان مدى الدالة f مجموعة جزئية من مجال الدالة g فإنه يتعين دالة مركبة h :

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

ستقتصر دراستنا على الدوال القابلة للتركيب.

مثال (4)

الدالتان f , g معروفتان على \mathbb{R} كما يلي: أوجد $f(x) = 1 + x$, $g(x) = x^2 - 1$:

a) $(g \circ f)(x)$

b) $(g \circ f)(2)$

c) $(f \circ g)(x)$

d) $(f \circ g)(2)$

الحل:

a) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (f(x))^2 - 1 = (1 + x)^2 - 1 = x^2 + 2x$

حل آخر

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 + x) = (1 + x)^2 - 1 = 1 + 2x + x^2 - 1 = x^2 + 2x$$

b) $(g \circ f)(2) = (2)^2 + 2(2) = 8$

c) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 1 + g(x) = 1 + x^2 - 1 = x^2$

حل آخر

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = 1 + x^2 - 1 = x^2$$

d) $(f \circ g)(2) = (2)^2 = 4$

حاول أن تحل

إذا كانت g , f معروفتان على \mathbb{R} كما يلي: 4 أوجد $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2 + 3$:

a) $(g \circ f)(x)$

b) $(g \circ f)(-1)$

c) $(f \circ g)(x)$

d) $(f \circ g)(-1)$

نستنتج من مثال (4) أن:

$$(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$$

إلا في بعض الحالات الخاصة.

مثال (5)

لتكن: $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^4 + 2$

أوجد:

a) $(f \circ g)(x)$

b) $(f \circ g)(0)$

c) $(g \circ f)(x)$

d) $(g \circ f)(0)$

الحل:

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x^4 + 2}$

لاحظ أن مجال f هو $[0, \infty)$

b) $(f \circ g)(0) = \sqrt{(0)^4 + 2} = \sqrt{2}$

وأن مدى g هو $[2, \infty)$ وهو مجموعة جزئية من مجال f

c) $(g \circ f)(x) = (f(x))^4 + 2 = (\sqrt{x})^4 + 2 = x^2 + 2$

مجال g هو \mathbb{R}

d) $(g \circ f)(0) = (0)^2 + 2 = 2$

\therefore مدى f هو مجموعة جزئية منه

حاول أن تحل

لتكن: 5 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ ، $g(x) = \frac{3}{x^2+4}$ أوجد:

a) $(f \circ g)(x)$

b) $(g \circ f)(\sqrt{3})$

Continuity of Composite Functions at a Point


اتصال الدوال المركبة عند نقطة

نظرية (16): اتصال الدوال المركبة

إذا كانت f متصلة عند c ، و g متصلة عند $f(c)$ فإن الدالة المركبة $g \circ f$ متصلة عند c .

أي أن نهاية $g(f(x))$ عند $x \rightarrow c$ هي $g(f(c))$ بمعنى

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(f(c))$$



مثال (6)

لتكن: $x = -2$. ابحث اتصال الدالة $g \circ f$ عند $x = -2$

الحل:

(1) f دالة متصلة عند $x = -2$

$f(-2) = 9$

$x \in \mathbb{R}^+$ g دالة متصلة عند كل

$\therefore x = 9$ دالة متصلة عند g

(2) أي أن g دالة متصلة عند $x = f(-2) = 9$

من (1) ، (2) نجد أن $g \circ f$ متصلة عند $x = -2$

حاول أن تحل

ابحث اتصال الدالة $f \circ g$ عند $x = 1$.
 $f(x) = \frac{|x|}{x+2}$ ، $g(x) = 2x + 3$ لكن: 6

(7) مثال

ابحث اتصال الدالة f عند $x = 2$.
 $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$ لكن:

الحل:

نفرض أن: $g(x) = |x|$ ، $h(x) = x^2 - 5x + 6$

فنجده أن: $f(x) = (g \circ h)(x)$

$g(h(x)) = |x^2 - 5x + 6|$

(1) دالة متصلة عند $x = 2$ h

$h(2) = 4 - 10 + 6 = 0$

$x = 0$ دالة متصلة عند g

(2) أي أن g دالة متصلة عند $x = h(2)$

من (2) ، (1) نجد أن $g \circ h$ متصلة عند $x = 2$

\therefore الدالة f متصلة عند $x = 2$.

حاول أن تحل


ابحث اتصال الدالة f عند $x = 0$.
 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ لكن: 7

الاتصال على فترة

Continuity on an Interval

دعنا نفكّر ونناقش

لتكن الدالة $f : f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x}$ معرفة على الفترة $(0, 4)$



a ابحث اتصال f عند $x = 1, x = 2$

b هل f متصلة عند $x = 0$ من جهة اليمين؟

c هل f متصلة عند $x = 4$ من جهة اليسار؟

d هل توجد نقاط تنتمي إلى الفترة $(0, 4)$ لا تكون فيها الدالة f متصلة؟

سوف تتعلم

- الاتصال على فترة.
- ناتج تركيب دالتين متصلتين.

المفردات والمصطلحات:

- الاتصال على فترة

Continuity on an Interval

الاتصال على فترة

تعريف (9) الاتصال على فترة مفتوحة:

لتكن الدالة f معرفة على الفترة (a, b) فإننا نقول أن الدالة f متصلة على الفترة المفتوحة (a, b)

إذا كانت f متصلة عند كل x تنتمي إلى الفترة (a, b)

تعريف (10) الاتصال على فترة مغلقة:


لتكن الدالة f معرفة على الفترة $[a, b]$ فإننا نقول أن الدالة f متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$ إذا

تحقق الشرط الثلاثة التالية:

1 الدالة f متصلة على الفترة المفتوحة (a, b)

2 الدالة f متصلة عند $x = a$ من جهة اليمين أي أن: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

3 الدالة f متصلة عند $x = b$ من جهة اليسار أي أن: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$



الاتصال عند النقاط a, b, c للدالة $y = f(x)$ والمتصلة على الفترة $[a, b]$

مثال (1)

$$f(x) = \begin{cases} -2 & : x = 1 \\ x^2 - 3 & : 1 < x < 3 \\ 6 & : x = 3 \end{cases}$$

ادرس اتصال الدالة f على $[1, 3]$ حيث:
الحل:

$$f(x) = x^2 - 3 \quad : \quad x \in (1, 3)$$

$$\forall c \in (1, 3)$$

$$f(c) = c^2 - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (x^2 - 3) = c^2 - 3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \quad \forall c \in (1, 3)$$

(1)

. الدالة f متصلة على $(1, 3)$.

ندرس اتصال الدالة f عند $x = 1$ من جهة اليمين.

$$f(1) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 3) = -2$$

$$\therefore f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

(2)

. الدالة f متصلة عند $x = 1$ من جهة اليمين.

ندرس اتصال الدالة f عند $x = 3$ من جهة اليسار.

$$f(3) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 3) = 6$$

$$\therefore f(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$$

(3)

. الدالة f متصلة عند $x = 3$ من جهة اليسار.

من (3), (2), (1).

. الدالة f متصلة على $[1, 3]$.

حاول أن تحل

1

$$f(x) = \begin{cases} 2 & : x = 1 \\ \frac{x^2 + 1}{x} & : 1 < x < 5 \\ \frac{26}{5} & : x = 5 \end{cases}$$

ادرس اتصال الدالة f على $[1, 5]$ حيث:

ملاحظات:

أولاً: إذا تحقق الشرطان 1 و 2 من التعريف (10) نقول إن الدالة f متصلة على $[a, b]$.

ثانياً: إذا تحقق الشرطان 1 و 3 من التعريف (10) نقول إن الدالة f متصلة على $[a, b]$.

ثالثاً: تبقى النظرية (14) صحيحة إذا استبدلنا النقطة بفترة بحيث تكون هذه الفترة مجموعة جزئية من مجال الدالة.

رابعاً: إذا كانت الدالة متصلة على فترة ما فإنها متصلة على أي فترة جزئية منها.

خامساً: إذا كانت الدالة متصلة على كل من الفترتين $[a, c]$, $[c, b]$, فإن الدالة متصلة على $[a, b]$.

سادساً: يبقى التعريف (10) صحيحاً في حالة الفترات على الصورة $(-\infty, b]$, $[a, \infty)$.

مثال (2)

ادرس اتصال كل من الدوال التالية على الفترة المبينة:

a) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $[-1, 5]$

b) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$, $[0, 5]$

الحل:

• دالة حدودية نسبية ، a

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$$

• f متصلة على \mathbb{R}

$$\therefore [-1, 5] \subseteq \mathbb{R}$$

• f متصلة على $[-1, 5]$

b) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

$$x^2 - 4 = 0 \quad \forall x \in \{-2, 2\}$$

• دالة حدودية نسبية متصلة

• f ليست متصلة عند $x = 2$

$$\forall x \in [0, 5] - \{2\}$$

• الدالة f متصلة على $[0, 5] - \{2\}$.

أي أنها متصلة على كل من $[0, 2)$, $(2, 5)$.

حاول أن تحل

2 ادرس اتصال f على الفترة المبينة:

a) $f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 2}$, $[0, 3]$

b) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$, $[0, 2]$

مثال (3)

ادرس اتصال الدالة f على مجالها حيث:

الحل:

$$D_f = (-\infty, -1] \cup (-1, \infty) = \mathbb{R}$$

مجال الدالة f هو:

ندرس اتصال الدالة f على مجالها.

$$g(x) = x + 3$$

نفرض:

g دالة كثيرة حدود متصلة على \mathbb{R} .

$$\therefore f(x) = g(x) \quad \forall x \in (-\infty, -1]$$

(1) $\therefore f$ دالة متصلة على $(-\infty, -1]$.

$$h(x) = \frac{4}{x+3} \quad \text{نفرض:}$$

$x \in \mathbb{R} - \{-3\}$ دالة حدودية نسبية متصلة لكل h

$$\therefore f(x) = h(x) \quad \forall x \in (-1, \infty)$$

(2) $\therefore f$ متصلة على $(-1, \infty)$.

ندرس اتصال الدالة f عند $x = -1$ من جهة اليمين.

$$f(-1) = 2$$

حيث نهاية المقام $\neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{4}{x+3} = 2$$

$$\therefore f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$$

(3) \therefore الدالة f متصلة عند $x = -1$ من جهة اليمين.

من (1), (2), (3).

\therefore الدالة f متصلة على الفترة $(-\infty, \infty)$.

$\therefore f$ متصلة على \mathbb{R} .

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & , \quad x < 1 \\ -x+2 & , \quad 1 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases} \quad \text{لتكن } f \quad (3)$$

ادرس اتصال الدالة f على مجالها.

مثال (4)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - a & : \quad x < 0 \\ 2 & : \quad x = 0 \\ ax + b & : \quad x > 0 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad \text{أوجد قيمة الثابتين } a, b$$

الحل:

\therefore دالة متصلة على مجالها \mathbb{R} $\therefore f$ متصلة عند $x = 0$.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$f(0) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - a) = -a$$

$$\therefore -a = 2 \implies a = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b$$

$$\therefore b = 2$$

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} 5 & : x = 1 \\ ax + b & : 1 < x < 4 \\ b + 8 & : x = 4 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad 4$$

متصلة على $[1, 4]$. أوجد قيم الثابتين a, b

تعلمنا دراسة اتصال الدالة $f(x) = \sqrt{g(x)}$ عند $x = c$ وكذلك يمكننا دراسة اتصال الدالة $f(x) = \sqrt{g(x)}$ على فترة ما باستخدام التعميم التالي:

تعميم:

إذا كانت الدالة g متصلة على فترة ما، $0 \geq g(x) \geq 0$ في هذه الفترة فإن الدالة $f(x) = \sqrt{g(x)}$ متصلة على هذه الفترة.

مثال (5)

لتكن $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$:

أوجد D_f (مجال الدالة f) ثم ادرس اتصال الدالة f على $[-5, 0]$.

الحل: نفرض أن $f(x) = \sqrt{g(x)}$ ، $g(x) = x^2 - 2x$

$$\therefore D_f = \{x : g(x) \geq 0\}$$

$$x^2 - 2x \geq 0$$

$$x^2 - 2x = 0 \quad \text{المعادلة المنشورة:}$$

$$x(x - 2) = 0$$

$$x = 0 , x = 2$$



\therefore مجال الدالة f هو $(0, 2)$.

لدراسة اتصال الدالة f على $[-5, 0]$ حيث $g(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} - (0, 2)$

$\mathbb{R} - (0, 2)$ [مجموعه جزئية من $[-5, 0]$]
 \therefore

$$\therefore g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [-5, 0] \quad (1)$$

معلومات:

إشارة الحدودية $f(x)$ تكون ثابتة لا تتغير في الفترة (a, b) إذا كانت هذه الفترة لا تحتوي على صفر من أصفار الحدودية $f(x)$. ولتعين إشارة الحدودية في هذه الفترة نعوض عن x بأي قيمة $c \in (a, b)$.

(2) $f(x) = x^2 - 2x$ دالة متصلة على $[-5, 0]$.
من (1) ،
 f متصلة على $[-5, 0]$.

حاول أن تحل

5 . $f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10}$ لتكن f
أوجد D_f (مجال الدالة f) ثم ادرس اتصال الدالة f على $[6, 10]$.

مثال (6)

$$D_f = \{x : g(x) \geq 0\}$$

$$9 - x^2 \geq 0$$

$$9 - x^2 = 0 \quad \text{المعادلة الم対اظرة:}$$

$$(3 - x)(3 + x) = 0$$

$$x = 3, x = -3$$



. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ هو مجال الدالة f

لدراسة اتصال الدالة f على $[-3, 3]$ حيث

$$g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [-3, 3]$$

(1)

(2) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ دالة $g(x) = 9 - x^2$ متصلة على $[-3, 3]$

من (1) و (2)

. f متصلة على $[-3, 3]$.

حاول أن تحل

6 . $f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$ لتكن f
ادرس اتصال الدالة f على $[1, 3]$.

ملاحظة:

ناتج تركيب دالتي كل منها متصلة على \mathbb{R} هو دالة متصلة على \mathbb{R} .

مثال (7)

لتكن: $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 5x + 4}$. ادرس اتصال الدالة f على \mathbb{R} .

الحل:

نفرض أن: $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ، $h(x) = x^2 - 5x + 4$

$$f(x) = (g \circ h)(x)$$

$$f(x) = (g \circ h)(x) = g(h(x))$$

$$= g(x^2 - 5x + 4)$$

$$= \sqrt[3]{x^2 - 5x + 4}$$

\therefore الدالة h متصلة على \mathbb{R} .

\therefore الدالة g متصلة على \mathbb{R} .

\therefore الدالة f متصلة على \mathbb{R} لأنها عبارة عن تركيب دالتين كل منهما متصلة على \mathbb{R} .

حاول أن تحل

لتكن: $f(x) = \sqrt[3]{-x^2 + 2x + 5}$. ادرس اتصال الدالة f على \mathbb{R} .

المرشد لحل المسائل

لتكن الدالة: $f(x) = \frac{x^3 + kx^2 + 3x - 2}{x^2 - x - 2}$ حيث k عدد صحيح.

a أوجد مجال الدالة.

b أوجد قيمة k التي تجعل من الممكن إعادة تعريف الدالة f لتصبح متصلة عند $x = 2$, ثم أعد تعريف الدالة.

الحل:

$$x^2 - x - 2 \neq 0$$

$$(x+1)(x-2) \neq 0$$

$$x \neq -1, x \neq 2$$

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 2) \cup (2, +\infty)$$

a المقام لا يساوي صفر

تحليل المقام

b مجال الدالة:

b كي نعرف الدالة وتصبح متصلة عند $x = 2$, يجب أن يكون 2 صفرًا للبسط أي:

$$x^3 + kx^2 + 3x - 2 = (x-2)(ax^2 + bx + c)$$

a, b, c أعداد حقيقة

$$x^3 + kx^2 + 3x - 2 = ax^3 + (b-2a)x^2 + (c-2b)x - 2c$$

نتوسع

بمقارنة المعاملات نجد أن:

$k = b - 2a = -1 - 2(1) = -3$ فنستنتج أن:


$$f(x) = \frac{(x-2)(x^2 - x + 1)}{(x-2)(x+1)}$$

تصبح معادلة الدالة:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + 1}{x + 1} = \frac{3}{3} = 1$$

عندما يمكن إعادة تعريف الدالة وتسميتها بـ g

$$\therefore g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 2}{x^2 - x - 2}, & x \neq 2, x \neq -1 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$




مسألة إضافية

لتكن الدالة: $f(x) = \frac{x^4 + kx^3 - 15x^2 + 2x - 8}{x^2 - 3x - 10}$ حيث k عدد صحيح.

a أوجد مجال الدالة.

b أعد تعريف الدالة f بحيث تكون منفصلة عند $x = -2$ فقط.

مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



ملخص

- لتكن x كمية متغيرة، c عدداً حقيقياً، نقول إن x تقترب من c باطراد إذا كان بالإمكان جعل الكمية $|x - c|$ أصغر من أي عدد حقيقي موجب.
- ليكن c , L عددين حقيقين، f دالة حقيقة معروفة في جوار أو جوار ناقص للعدد c نكتب: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ وتعني أنه عندما تقترب x من c باطراد، $c \neq x$ فإن قيم $f(x)$ تقترب باطراد من L .
- بفرض أن c , L عددين حقيقين يكون للدالة f نهاية عندما تقترب x من c إذا وفقط إذا كانت النهاية من جهة اليمين تساوي النهاية من جهة اليسار ويعبر عن ذلك:
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$
- إذا كانت $f : x \mapsto f(x) = k$ وكان c , k أعداداً حقيقة، ثابت فإن: $\lim_{x \rightarrow c} k = k$
- إذا كانت $f(x) = x$ حيث c عدداً حقيقياً، فإن: $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
- إذا كانت $f(x) = g(x)$ أعداداً حقيقة، k, c, M, L و $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ و $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ فإن:
$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M \quad \text{قاعدة الجمع: a}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M \quad \text{قاعدة الطرح: b}$$

c قاعدة الضرب: $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$

d قاعدة الضرب في ثابت: $\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot L$

e قاعدة القسمة: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, M \neq 0$

• إذا كانت دالة كثيرة الحدود، c عدد حقيقي، فإنّ: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

• إذا كانت $f(x), g(x)$ كثيرتي حدود، c عدد حقيقي، فإنّ: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}, g(c) \neq 0$

• إذا كانت n عدداً صحيحاً موجباً وكانت $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة فإنّ:

a $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow c} f(x))^n$

b $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c} \quad (c > 0)$

c $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)} \quad (\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0)$

• لتكن f دالة معروفة في الفترة (a, ∞) فإنّ: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ يعني أن قيمة $f(x)$ تقترب باطراد من L عندما x تؤول إلى ∞ .

• لتكن f دالة معروفة في الفترة $(-\infty, a)$ فإنّ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ يعني أن قيمة $f(x)$ تقترب باطراد من L عندما x تؤول إلى $-\infty$.

• لتكن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0, f(x) = \frac{1}{x}$

• لتكن: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x^n} = 0 \quad f(x) = \frac{k}{x^n}, n \in \mathbb{Z}^+, k \in \mathbb{R}$

• إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm b] = \pm \infty$ و كان b عدد حقيقي فإنّ:

• إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} [b \cdot f(x)] = \pm \infty$ و كان b عدد حقيقي موجب فإنّ: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$

$$\text{وإذا كان } b \text{ عدد حقيقي سالب } \lim_{x \rightarrow a} [b \cdot f(x)] = \mp \infty$$

• إذا كان $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{(x-c)^n} = \infty$ فإنّ c عدد صحيح موجب وزوجي

• إذا كان n عدد صحيح موجب وفردي فإنّ:

1 $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{1}{(x-c)^n} = \infty$

2 $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{1}{(x-c)^n} = -\infty$

• إذا كانت قيمة $f(x)$ تتزايد بلا حدود عندما تؤول x إلى c فإننا نعبر عن ذلك رياضياً وبالتالي: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$

• إذا كانت $f(x)$ تتناقص بلا حدود عندما x تؤول إلى c فإننا نعبر عن ذلك رياضياً وبالتالي: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$

• $(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty) \text{ إذا وفقط إذا } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

• $(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty) \text{ إذا وفقط إذا } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

• الخط $b = y$ يسمى خط مقارب أفقى لمنحنى الدالة $f(x) = y$ إذا توفر أحد الشرطين التاليين أو كلاهما:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

• الخط $x = a$ يسمى خط مقارب رأسى لمنحنى الدالة $f(x) = a$ إذا توافر على الأقل أحد الشروط التالية:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

- لتكن: $f(x) = ax^n$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{R}^*$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases}$$

إذا كان n عدد زوجي فإن: ①

$$\lim_{x \rightarrow \infty} ax^n = \begin{cases} \infty & : a > 0 \\ -\infty & : a < 0 \end{cases}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} ax^n = \begin{cases} -\infty & : a > 0 \\ \infty & : a < 0 \end{cases}$$

إذا كان n عدد فردي فإن: ②

- إذا كانت كل من f , g دالة حدودية حيث:

a $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_m} : n = m$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

b $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 : n < m$ فإن :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{حيث } x \text{ بالراديان.}$$

- إذا كان a , b عددين حقيقيين، $a \neq 0$, $b \neq 0$ فإن: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{\sin ax} = \frac{b}{a}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$

- ليكن L , c عددين حقيقيين، إذا كان $x \neq c$ في جوار c , و كان $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ لكل $x \neq c$ في جوار c , فإذا كان $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ لـ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ فإن:

- تكون الدالة $y = f(x)$ متصلة عند نقطة c في مجالها إذا كانت $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
- تكون f متصلة عند c يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة التالية:

الدالة معروفة عند c أي $x = c$ موجودة. ①

الدالة موجودة $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ②

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ③

وإذا لم يتحقق أي شرط من الشروط السابقة فنقول إن f ليست متصلة (منفصلة) عند c .

- إذا كانت g , f دالتين متصلتين عند $x = c$, فإن الدوال التالية هي دوال متصلة عند $x = c$:

$$f - g \quad ②$$

$$f + g \quad ①$$

$$f \cdot g \quad ④$$

حيث k أي عدد حقيقي ثابت. ③

$$\frac{f}{g}, \quad g(c) \neq 0 \quad ⑤$$

- الدالة الجذرية $y = \sqrt[n]{x}$ متصلة عند كل $x = c : c \in \mathbb{R}^+$ حيث n عدد صحيح زوجي موجب، ومتصلة عند كل $x = c : c \in \mathbb{R}$ حيث n عدد صحيح فردي أكبر من 1.

- إذا كانت g دالة متصلة عند $x = c$ وكانت $0 < g(c) < \infty$ فإن الدالة $f(x) = \sqrt[g]{g(x)}$ متصلة عند $x = c$

- إذا كانت كل من g , f دالتين حقيقيتين وكان مدى الدالة f مجموعة جزئية من مجال

الدالة g فإنه يتبع دالة مرتبطة $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$: ④

- إذا كانت f متصلة عند c و g متصلة عند $f(c)$ فإن الدالة المرتبطة $g \circ f$ متصلة عند c .

- إذا كانت الدالة f معرفة على الفترة $[a, b]$ فإن:

الدالة f متصلة على الفترة المفتوحة (a, b) , إذا كانت f متصلة عند كل x في الفترة (a, b) ①

الدالة f متصلة عند a من جهة اليمين إذا كان: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ ②

الدالة f متصلة عند b من جهة اليسار إذا كان: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$ ③

وإذا تحقق الشروط الثلاثة، فإن الدالة تكون متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$

- إذا كانت الدالة g متصلة على فترة ما، $0 \leq g(x) \leq f(x)$ في هذه الفترة فإن الدالة $f(x) = \sqrt[g]{g(x)}$ متصلة على هذه الفترة.

الوحدة الثانية

الاشتقاق

The Derivatives

مشروع الوحدة: تأثير الضغط على الغطّاس

1 مقدمة المشروع: يساعد جهاز التنفس الذي يستخدم في الغطس، علماء البحار على استكشاف أعماق المياه إلى أبعد حدود ممكنة، بالإضافة إلى كون الغطس أيضاً رياضة شعبية. ولكن، للغطس بأمان، يتوجب على الغطّاسين فهم ضغط الماء في الأعماق لأنّه يصبح خطيراً إذا تخطى 12 m .

تسمح أجهزة التنفس الحديثة للغطّاسين بالبقاء لأوقات طويلة تحت الماء. ولكن عمق الغطس ومدته يقيمان محدودين ويتأثران في الضغط الذي يسمح جسم الإنسان بتحمله. سوف تستخدم الرياضيات لاكتشاف الأمان في كيفية استخدام أجهزة التنفس للغطس ثم سوف ترسم ملخصاً عن هذا الجهاز.

2 الهدف: إيجاد العلاقة بين معدل الهواء الذي يستخدمه الغطّاس وعدد عوامل مثل: العمق، سعة رئتيه، عمر الغطّاس...

3 اللوازم: ورق رسم بياني – آلة حاسبة – حاسوب.

4 أسئلة حول التطبيق:

تعطيك أجهزة التنفس للغطس كمية الضغط تحت الماء. عند سطح الماء يكون ضغط الهواء واحداً (ضغط جوي) ($P = 1\text{ atm}$). يتزايد الضغط كلّما غطسنا أكثر تحت الماء.

وحدة قياس الضغط $P(\text{atm})$ تتغيّر مع العمق d (المتر) بحسب المعادلة: $\frac{d}{13} + 1 = P$. ومن المعروف، بحسب قانون بويل، أنّ حجم الهواء V يتغيّر عكسياً مع الضغط P أي أن $\frac{12}{P} = V$ حيث V تُقاس بالكوارت (qt).

a) أوجد الضغط على سطح الماء.

b) أوجد الضغط على عمق 5 m ، من ثم أوجد حجم الهواء في رئتيه.

c) ارسم جدولًا تبيّن فيه تغيير الضغط وحجم الهواء نسبة للضغط ($d < 20\text{ m}$).

d) اصنع رسمًا بيانيًا تبيّن فيه تغيير حجم الرئة نسبة إلى العمق.

5 التقرير: أجر بحثاً عن متوسط حجم الرئة لعدة أعمار، من ثم اكتب تقريراً مفصلاً تبيّن فيه متوسط العمق الذي يستطيع النزول إليه كل غطاس بحسب عمره.

دروس الوحدة

المشتقات ذات الرتب العليا والاشتقاق الضمني	قاعدة السلسلة	مشتقات الدوال المثلثية	قواعد الاشتقاق	المشتقة	معدلات التغير وخاطرط المماس
2-6	2-5	2-4	2-3	2-2	2-1

الوحدة الثانية

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

أضف إلى معلوماتك

يعتبر التفاضل Differentiation الفروع المهمة في الرياضيات حيث هو مفاضلة دالة عند نقطة معينة أي مقاييس لمقدار تغير متغير بالنسبة إلى متغير آخر. من المتعارف عليه أن اكتشاف علم التفاضل يعود إلى نيوتن (1642–1727) وليبرنيز (1646–1716) حيث أصدرا بشكل منفصل حوالي سنة 1685 1685 منشورات مفصلة عن هذا العلم.



اسحاق نيوتن
(1642–1727)

ساهم نيوتن في دراسة متسلسلات القوى ونظرية ذات الحدين ووضع طريقة نيوتن لتقريب جذور الدوال إضافة إلى تأسيسه لحساب التفاضل والتكامل.



لايتزتر
(1646–1716)

ينسب إليه رمز التفاضل δx ورمز التكامل

$$\int_{t=x_0}^x f(t) \cdot \delta t$$

- تعلمت نهاية دالة عند نقطة معينة.
- تعلمت الالانهاية لدالة.
- تعلمت الاتصال لدالة عند نقطة وعلى فترة.
- تعرفت نقاط عدم الاتصال (الانفصال) لدالة.
- تعلمت كيفية التخلص من نقاط الانفصال إذا أمكن ذلك.

ماذا سوف تتعلم؟


- إدراك مفهوم التغيير في الدالة، ومتوسط معدل التغيير، و معدل التغيير.
- حساب السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية.
- إيجاد معادلات خط المماس والخط العمودي على المماس عند نقطة معطاة على منحنى الدالة.
- إيجاد الميل والمشتقات باستخدام تعريف المشتقة.
- إيجاد المشتقة من جهة واحدة.
- التعرف على العلاقة بين الاتصال عند نقطة وقابلية الاشتتقاق.
- التمييز بين الركن والناب والمماس الرأسى وعدم الاتصال.
- التعرف على العلاقة بين الاشتتقاق والاتصال.
- إيجاد مشتقات الدوال ومن ضمنها مشتقات الرتب العليا.
- استخدام قواعد الاشتتقاق للدوال المثلثية.
- إيجاد مشتقة دالة الدالة باستخدام قاعدة السلسلة.
- إيجاد الاشتتقاق الضمني وتطبيقه.

المصطلحات الأساسية

مشتقة دالة – رمز المشتققة ' f' ، $f'(x)$ – $\frac{dy}{dx}$ – معدل التغيير – متوسط معدل التغيير – السرعة المتوسطة – السرعة اللحظية – ميل المماس – معادلة الخط العمودي (الناظم) – رسم بياني – قابلية الاشتتقاق – الاشتتقاق – ركن – ناب – مماس رأسى – قواعد الاشتتقاق – قاعدة السلسلة – اشتتقاق الدوال المثلثية – اشتتقاق من رتب عليا – اشتتقاق ضمني.

معدلات التغير وخطوط المماس

Rates of Change and Tangent Lines



دعنا نفكّر ونناقش

أظهرت التجارب أن المسافة التي يقطعها جسم سقط سقوطاً حرّاً من السكون نحو سطح الأرض تعطى بالعلاقة²: $d(t) = 4.9t^2$ حيث d المسافة بالمتر (m)، t الزمن بالثواني (s) (قانون غاليليو). فإذا سقط جسيماً سقوطاً حرّاً من مرتفع، أوجد بعد مرور ثانتين من السقوط:

a التغيير في الزمن.

b التغيير في المسافة.

$$\bar{v} = \frac{\text{التغيير في المسافة}}{\text{التغيير في الزمن}} : \quad \text{السرعة المتوسطة} \quad \bar{v} = \frac{\text{التغيير في المسافة}}{\text{السرعة المتوسطة}} : \quad \text{التغيير في الزمن}$$

c السرعة المتوسطة

السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية

نوجد السرعة المتوسطة \bar{v} لجسم متحرك، في فترة زمنية ما، بقسمة التغيير في المسافة (Δd) على التغيير في الزمن (Δt).

وعليه تكون وحدة السرعة المتوسطة عبارة عن وحدة المسافة مقسومة على وحدة الزمن؛ أي كيلومتر/ساعة (km/h) أو متر/ثانية (m/s) أو أي وحدات أخرى موجودة في المسألة قيد الدراسة.

وفي حالات كثيرة سواء أكان في مجال العلوم أم في الحياة اليومية لا تمدّنا السرعة المتوسطة لجسم متحرك بالمعلومات ذات الأهمية القصوى فمثلاً: إذا ارتطمت سيارة بحائط خرساني فإنّ ما سيحدّد الآثار المترتبة على الحادث ليس مقدار السرعة المتوسطة التي تقاد بها السيارة من نقطة بدء الحركة حتى نقطة الارتطام بل مقدار السرعة عند لحظة الارتطام: السرعة اللحظية. وكذلك بالنسبة إلى «الرادار» فإن السرعة التي تُضبط بها السيارة هي السرعة اللحظية للسيارة.

مثال توضيحي

تسقط كرة من علو 50 m، وفق المعادلة $d(t) = 4.9t^2$ ، حيث d المسافة التي تقطعها الكرة بالأمتار (m)، t الزمن بالثواني (s).

a ما السرعة المتوسطة في الفترة الزمنية من الثانية الأولى إلى الثانية الثالثة؟

b أوجد سرعة الكرة عند اللحظة $t = 3$

سوف تعلم

- إدراك مفهوم التغير في الدالة ومعدل التغير ومتوسط معدل التغير.

- حساب السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية.

- إيجاد ميل مماس منحنى الدالة عند نقطة.

- إيجاد معدل التغير للدالة.

المفردات والمصطلحات:

- معدل التغير

Rate of Change

- السرعة المتوسطة

Average Velocity

- السرعة اللحظية

Instantaneous Velocity

Slope

- الميل

Tangent

- المماس

Normal

- العمودي

معلومات:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

$$\Delta t = h$$

$$\therefore t_2 = t_1 + h$$

وعلیه:

$$f(t_2) - f(t_1)$$

$$= f(t_1 + h) - f(t_1)$$

الحل:

a

$$\therefore d(t) = 4.9t^2$$

$d_1 = d(1) = 4.9(1)^2 = 4.9$ في الثانية الأولى، المسافة التي قطعتها الكرة هي:

$d_2 = d(3) = 4.9(3)^2 = 44.1$ في الثانية الثالثة، المسافة التي قطعتها الكرة هي:

$\bar{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1}$ السرعة المتوسطة بين الثانية الأولى والثالثة هي:

$$\bar{v} = \frac{44.1 - 4.9}{3 - 1} = \frac{39.2}{2} = 19.6$$

السرعة المتوسطة لسقوط الكرة هي: 19.6 m/s

b يمكننا حساب السرعة المتوسطة للجسم على الفترة الزمنية من اللحظة t_1 إلى اللحظة $t_2 = 3 + h$, حيث $\Delta t = h$ هو الفارق الزمني بين اللحظتين

تمثل السرعة المتوسطة على الفترة الزمنية $[3, 3+h]$ التي مدتها $\Delta t = h$

ولا نستطيع استخدام تلك القاعدة لحساب السرعة بالضبط عند اللحظة $t = 3$ أي $h = 0$ لأنه لا يمكن القسمة على صفر.

وعلى ذلك فإنّه يمكنناأخذ فكرة جيدة لما يحدث عند $t = 3$ وذلك بحساب قيمة الصيغة التي حصلنا عليها بجعل h تقترب من الصفر، وإذا فعلنا ذلك فإنّنا نجد نمطاً واضحاً كما في الجدول، يظهر هذا النمط أنّ السرعة المتوسطة تقترب من القيمة 29.4 m/s عندما تقترب h من الصفر، مما يسمح

مدة الفترة الزمنية h بالثانية	السرعة المتوسطة على الفترة $\frac{\Delta d}{\Delta t}$ (m/s)
1	34.3
0.1	29.89
0.01	29.449
0.001	29.4049
0.0001	29.40049

بالقول إن السرعة اللحظية للكرة عند $t = 3$ تساوي 29.4 m/s

أكّد جبرياً:

نفك البسط في المعادلة وننسّط:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta d}{\Delta t} &= \frac{4.9(3+h)^2 - 4.9(3)^2}{h} \\ &= \frac{4.9(9+6h+h^2) - 44.1}{h} \\ &= \frac{29.4h+4.9h^2}{h} = \frac{h(29.4+4.9h)}{h} \\ &= 29.4 + 4.9h \quad , \quad h \neq 0 \end{aligned}$$

لقيم h الموجبة الصغيرة جداً السرعة المتوسطة تساوي (m/s)

وتكون $4.9h$ صغيرة جداً أي قريبة من الصفر.

ونعبر عن ذلك كالتالي:


$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta d}{\Delta t} = \lim_{h \rightarrow 0} (29.4 + 4.9h) \\ = 29.4$$

ملاحظة:

$$\begin{aligned} \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1} \\ = \frac{d(t_1 + h) - d(t_1)}{h} \end{aligned}$$

الربط بالحياة:

السقوط الحر
عندما تسقط الأجسام سقوطاً حرّاً في مكان ما، على افتراض أنه فارغ من الهواء، فإنّها تصل جميعها إلى سطح الأرض في فترة زمنية مشتركة وإن اختلّت كتلها. من ناحية ثانية إذا سقطت هذه الأجسام في مكان ما يملؤه الهواء فالوضع يختلف تماماً إذ نجد أن حجراً صغيراً يصل إلى سطح الأرض في زمن أقل من ورقة علمًا أنها سقطاً في اللحظة نفسها.



معلومة:

عادة ما يرغب علماء الأحياء في معرفة المعدلات التي تنمو فيها الكائنات الموضوعة تحت الملاحظة في شروط مخبرية.

يُبيّن الشكل أدناه كيفية تكاثر مجموعة من ذباب الفاكهة خلال التجارب المخبرية في فترة مدتها 50 يوماً وذلك على فترات زمنية منتظمة، وبتحديد النقاط يمكن رسم المنحنى المبين الذي يمر بهذه النقاط. استخدم النقطتين

$P(23, 150)$, $Q(45, 340)$

في الشكل لحساب متوسط معدل التغيير وميل القاطع \overleftrightarrow{PQ} . ماذَا تلاحظ؟

الحل:

بفرض عدد الذباب = N , t = عدد الأيام.

يوجد 150 ذبابة في اليوم


45, 23 ذبابة في اليوم

متوسط معدل التغيير في عدد الذباب هو:


$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{\Delta t} &= \frac{340 - 150}{45 - 23} \\ &= \frac{190}{22} \quad (\text{ذبابة/يوم})\end{aligned}$$

$\therefore \frac{\Delta N}{\Delta t} \approx 8.6$

أي حوالي 9 ذبابات كل يوم.



نمو ذباب الفاكهة تحت الشروط المخبرية لمجتمع الذباب



وفي هذه الحالة نقول إنّ نهاية السرعة المتوسطة هي 29.4 عندما تقترب h من الصفر ولا تساويه ونقول إنّها السرعة اللحظية عند اللحظة $t = 3$.
ومنه تكون السرعة اللحظية 29.4 m/s

وعموماً لو فرضنا أن جسم يتحرك في خط مستقيم خلال فترة زمنية صغيرة جداً مقدارها h فإنه عندما $t = t_1$ يكون الجسم عند الموقع $d(t_1)$ وعندما $t = t_1 + h$ يكون الموقع هو $d(t_1 + h)$ وعليه فإن السرعة المتوسطة للجسم خلال تلك الفترة تكون:

$$\bar{v} = \frac{d(t_1 + h) - d(t_1)}{h}$$

وعندما تؤول h إلى الصفر نحصل على السرعة اللحظية.


ويمكن أن نعرف السرعة اللحظية v عند الزمن t_1 كالتالي:

$$v = \lim_{h \rightarrow 0} \bar{v} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(t_1 + h) - d(t_1)}{h}$$

بشرط أن تكون النهاية موجودة.

متوسط معدل التغيير وميل المماس

Average Rate of Change and Tangent Slope



شكل (1)

إذا كان لدينا دالة: $y = f(x)$

فإذا طرأ تغير قدره Δx على قيمة المتغير المستقل x

فإنه يتبع ذلك تغير قدره Δy على قيمة المتغير التابع y ويكون:

$$\begin{aligned}\Delta y &= y_2 - y_1 \\ &= f(x_2) - f(x_1)\end{aligned}$$

ويكون متوسط معدل التغيير للدالة y :


$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

وفي الشكل (1) \overleftrightarrow{PQ} قاطع للمنحنى،

$$m(\overleftrightarrow{PQ}) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{ميل القاطع:}$$

والآن، ماذا يحدث لميل القاطع عندما تقترب Q من P بإطراد؟

الحل الذي وجده العالم الرياضي بيير فيرمات Pierre de Fermat سنة 1629 والذي ما زلنا نستخدمه حتى الآن يزودنا بطريقة لتحديد المماسات واستنتاج صيغ لميل المماس عند نقطة على منحنى الدالة ومعدلات التغيير:



2 نجد قيمة نهاية ميل القاطع إن وجدت عندما تقترب Q من P على المنحنى أي أن h تقترب من الصفر.


3 نحدد ميل المماس للمنحنى عند النقطة $P(a, f(a))$ بقيمة m إن وجد:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

معدل التغير للدالة f عند النقطة $P(a, f(a))$ إن وجد هو:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

المستقيم العمودي على منحنى عند نقطة تنتمي إلى المنحنى هو المستقيم العمودي على مماس المنحنى عند تلك النقطة ويسمى الناظم.



مثال (1)

أوجد ميل المماس للقطع المكافئ $y = x^2$ عند النقطة $P(2, 4)$

الحل:

نبدأ بميل القاطع للمنحنى بين النقطة $P(2, 4)$

ونقطة قريبة منها $(2+h)^2$ على المنحنى.

نكتب ميل القاطع ونوجد النهاية للميل عندما تقترب Q من P على المنحنى.


تذكر:

ميل المستقيم المار بال نقطتين: $P(x_1, y_1)$ ، $Q(x_2, y_2)$

$$\text{يساوي: } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

حيث $x_1 \neq x_2$

ويمكن أن نعبر عنه بالصيغة $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.



معلومات:



بيير فيرمات

Pierre de Fermat
(1601–1665)

عالم رياضيات فرنسي عرف بنظرية الشهيرة (نظرية فيرمات): لا توجد أعداد صحيحة موجبة x, y, z تتحقق المعادلة $x^n + y^n = z^n$ حيث n عدد صحيح موجب أكبر من 2.

معلومة:

ميل منحنى عند نقطة يعني
ميل المماس للمنحنى عند
هذه النقطة إن وجد.

يفرض أن:
 $y = f(x)$
 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
 ميل القاطع عند $(2, 4)$:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{(2+h)^2 - 4}{h} \\ &= \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} \\ &= \frac{h^2 + 4h}{h} \\ &= h + 4 \quad , \quad h \neq 0\end{aligned}$$

نهاية ميل القاطع عندما تقترب Q من P على المنحنى هي:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$


على ذلك يكون ميل المماس للقطع المكافئ عند P يساوي 4

حاول أن تحل

أوجد ميل المماس للقطع المكافئ $y = (x - 2)^2 + 2$ عند النقطة $A(1, 3)$ 1


معلومة:

في الهندسة، الزاوية التي
يصنعها مماسان على
منحنين عند نقطة تقاطعهما
هي زاوية المحنين.



المشتقة

The Derivative



شكل (1)

دعنا نفكّر ونناقش

تعلمت فيما سبق أنه إذا كان ℓ مستقيماً يصنع زاوية θ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن ميل المستقيم:

$$m = \tan \theta$$

الشكل (1) يمثل بيان الدالة f .

ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 مماسات لمنحنى f عند النقاط P_1, P_2, P_3 على الترتيب.

1 ميل المستقيم ℓ_1 (المماس لمنحنى الدالة f عند P_1) أكبر من الصفر. لماذا؟

2 ميل المماس ℓ_2 لمنحنى f عند P_2 يساوي صفرًا. لماذا؟

3 ميل المماس ℓ_3 لمنحنى f عند P_3 أصغر من الصفر. لماذا؟

4 إذا أمكن رسم مماسات عند نقاط مختلفة على المحنى، فهل ميل المحنى عند كل نقطة من هذه النقاط يكون قيمة ثابتة أم متغيرة؟

سوف تعلم

- إيجاد الميل والمشتقات باستخدام تعريف المشتق.
- إيجاد مشتقة الدالة عند نقطة.
- إيجاد المشتقة من جهة واحدة.
- العلاقة بين الاتصال عند نقطة أو على فتره وقابلية الاشتقاق.
- تحديد حالات عدم وجود المشتقة عند نقطة.

المفردات والمصطلحات:

- المشتقة عند نقطة

Derivative at a Point

- مشتقة دالة

Derivative of a Function

- مشتقة من جهة واحدة

One-Sided Derivative

- التفاضل

Differentiability

Corner Point

Cusp Point

- مماس رأسي

Vertical Tangent

- عدم اتصال

Discontinuity

Definition of Derivative

تعريف المشتقّة

تعلّمت أنّ ميل منحنى الدالة f عند نقطة إحداثيّها السينيّ $x = a$ هو:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

في حال وجود هذه النهاية فإنّها تسمى **مشتقّة الدالة f عند a**

Derivative at a Point

تعريف: المشتقّة عند نقطة

مشتقّة الدالة f عند $x = a$ هي $f'(a)$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

شرط وجود النهاية.

من التعريف السابق يمكننا القول أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند $x = a$ إذا كانت النهاية موجودة ويرمز لذلك بالرمز:

$$f'(a) \quad \text{أو} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$$

أما إذا كانت النهاية غير موجودة عند $x = a$ نقول إن الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند $x = a$ (غير موجودة $(f'(a))$)

مثال (1)

باستخدام التعريف، أوجد مشتقة الدالة f عند $x = 1$: $f(x) = 2x^2 + 1$

الحل:

(إن وجدت)

$$x = 1 \implies a = 1 , f(1) = 2(1)^2 + 1 = 3$$


$$\begin{aligned} \therefore f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(1+h)^2 + 1 - 3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 + 4h + 2h^2 + 1 - 3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h + 2h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4 + 2h)}{h_1} = \lim_{h \rightarrow 0} (4 + 2h) \\ &= 4 + 0 = 4 \end{aligned}$$

\therefore مشتقة الدالة f عند $x = 1$ هي: $f'(1) = 4$

حاول أن تحل

1 باستخدام التعريف أوجد مشتقة الدالة f عند $x = -2$: $f(x) = 3x^2$

نحصل على مشتقة $f(x)$ عند $x = a$ بأخذ النهاية عندما تقترب h من الصفر ($h \rightarrow 0$) لميل الخطوط القاطعة، كما في الشكل (2)



شكل (2)
ميل الخط القاطع \overleftrightarrow{PQ} هو:
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

تعريف (بديل): المشتقّة عند نقطة

مشتقّة دالة f عند $x = a$ هي:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

شرط وجود النهاية.

ملاحظة: التعريف البديل للمشتقة هو صورة أخرى لتعريف المشتقّة.

مثال (2)

باستخدام التعريف البديل. أوجد مشتقة الدالة f : $f(x) = \sqrt{x}$ عند $x = a$ حيث $a > 0$

الحل:

عند النقطة $x = a$ ، (إن وجدت)

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a}}
\end{aligned}$$

اضرب البسط والمقام بالمرافق $(\sqrt{x} + \sqrt{a})$

يمكنا الآن إيجاد النهاية

حاول أن تحل

$x = b$ ، $b \neq 0$ عند $f(x) = \frac{1}{x}$: 2

One-Sided Derivative

المشتقة من جهة واحدة


مشتقة الدالة f من اليمين يرمز لها بالرمز $f'_+(a)$ وهي:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

ومشتقة الدالة f من اليسار يرمز لها بالرمز $f'_-(a)$ وهي:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

إن الدالة لها مشتقة عند نقطة إذا وفقط إذا كانت المشتقان لجهة اليمين ولجهة اليسار موجودتين ومتساوين عند تلك النقطة.



مثال (3)

بيان أن الدالة التالية لها مشتقة لجهة اليمين ومشتقة لجهة

اليسار عند $x = 0$ ، لكن ليس لها مشتقة عند $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & : x \leq 0 \\ 2x & : x > 0 \end{cases}$$

الحل:

نتحقق من وجود المشتقة لجهة اليمين:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2(0+h) - 0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 2 = 2 \quad (1)$$

نتحقق من وجود المشتقة لجهة اليسار:

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(0+h)^2 - 0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0 \quad (2)$$

$$f'_-(0) \neq f'_+(0) \quad \text{من (1), (2)}$$

$f'(0)$ ليست موجودة أي أن الدالة ليس لها مشتقة عند $x = 0$

حاول أن تحل

لـ f لكن $f(x) = |x - 2|$ ، ابحث قابلية الدالة f للاشتغال عند $x = 2$.

مثال (4)

لتكن الدالة f :

بيّن أن للدالة f مشتقة لجهة اليمين مساوية للمشتقة لجهة اليسار عند $x = 1$.

الحل:

نتحقق من وجود المشتقة لجهة اليسار:

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{4}(1+h)^2 + \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{4}(1+2h+h^2) + \frac{3}{4} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{4} + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{4} + \frac{3}{4} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}h\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}h\right) = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (1)$$

نتحقق من وجود المشتقة لجهة اليمين:

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h} \times \frac{\sqrt{1+h} + 1}{\sqrt{1+h} + 1} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+h} - 1) \cdot (\sqrt{1+h} + 1)}{h \cdot (\sqrt{1+h} + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1+h-1}{h(\sqrt{1+h} + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h(\sqrt{1+h} + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1+h} + 1} \end{aligned}$$

ضرب البسط والمقام بمرافق البسط

$$\begin{aligned}\because \lim_{h \rightarrow 0^+} (1+h) &= 1 \quad , \quad 1 > 0 \\ \therefore \lim_{h \rightarrow 0^+} \sqrt{1+h} &= \sqrt{\lim_{h \rightarrow 0^+} (1+h)} = \sqrt{1} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} (\sqrt{1+h} + 1) &= 1 + 1 = 2 \quad , \quad 2 \neq 0\end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1+h} + 1} = \frac{\lim_{h \rightarrow 0^+} 1}{\lim_{h \rightarrow 0^+} (\sqrt{1+h} + 1)} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

من (2) ، $f'_-(1) = f'_+(1)$ (1)

وبالتالي الدالة f لها مشتقه لجهة اليمين عند $x = 1$ مساوية للمشتقة لجهة اليسار.

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & : x \leq -1 \\ \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2} & : x > -1 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f \quad (4)$$

بيان أن للدالة f مشتقه لجهة اليمين مساوية للمشتقة لجهة اليسار عند $x = -1$.

ملاحظات:

■ إذا كانت الدالة $y = f(x)$ قابلة للاشتراق عند كل $x \in (a, b)$ فإننا نقول إن الدالة قابلة للاشتراق على الفترة (a, b) .

■ إذا كانت الدالة $y = f(x)$ قابلة للاشتراق عند كل $x \in (-\infty, \infty)$ فإننا نقول إن الدالة قابلة للاشتراق على \mathbb{R} مثل كثيرة الحدود.

■ إذا وضعنا x بدلاً من a في تعريف المشتقه عند النقطه نحصل على $f'(x)$ حيث $\frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}(f(x)), f'(x), y'$ ويمكن أن نرمز للمشتقة بأحد الرموز التالية:

■ لأي دالة f تكون f' دالة أخرى مجالها مكون من جميع قيم x التي يكون للدالة مشتقه عندها أي f' أي أن f' دالة مستخلصه من f . $(D_{f'} \subseteq D_f)$

مثال (5)

لتكن $f(x) = x^3$. أوجد $f'(x)$ باستخدام تعريف المشتقه إن وجدت.

الحل:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{إن وجدت} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h}\end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) \\ = 3x^2$$

$$\therefore f'(x) = 3x^2$$


حاول أن تحل

لـ 5 **نـ 5** $f'(x)$ باستخدـام تعـريف المـشـتقـة.

متى تكون $f'(a)$ غير موجودة؟

الـدـالـة f لن يكون لها مشـتـقة عند نقطـة $P(a, f(a))$ إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ غير موجودـة. وتوـضـح الأـشكـال التـالـية أـربع حالـات تكون فيها هـذـه النـهاـية غير موجودـة:


b نـاـباـ (Cusp): يكون مـيل المـمـاس لـلـمـنـحـنـي عـند نقطـة تقـاطـع مـحدـدة يـقـتـرـب مـن ∞ فـي إـحـدى الجـهـات ويـقـتـرـب مـن $-\infty$ فـي الجـهـة الثـانـية ويـوـجـد مـمـاس رـأـسي عـندـهـا. مـثـالـ: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$



شكل (4)

يـوـجـد نـاب عـند $x = 0$ ، $f'(0)$ غير موجودـة ويـوـجـد مـمـاس رـأـسي عـندـهـا

a رـكـنـاـ (Corner): تكون المشـتـقـتان من جـهـة الـيمـين وـمن جـهـة الـيـسـار عـندـالتـقـاءـ الشـعـاعـيـنـ غـير مـتـسـاوـيـيـنـ. مـثـالـ: $f(x) = |x|$




شكل (3)

يـوـجـد رـكـن عـند $x = 0$ ، $f'(0)$ غير موجودـة

d عدم اتصـال: تكون المشـتـقة من جـهـة وـاحـدة أو كـلـ من الجـهـتين غـير موجودـة. مـثـالـ:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$




شكل (6)

يـوـجـد عدم اتصـال عـند $x = 0$ ، $f'(0)$ غير موجودـة

c مـمـاسـاـ رـأـسيـاـ: يكون المـمـاس لـلـمـنـحـنـي عـند نقطـة مـحدـدة رـأـسيـاـ.

$$\text{مـثـالـ: } f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$$



شكل (5)


يـوـجـد مـمـاس رـأـسي عـند $x = 1$ ، $f'(1)$ غير موجودـة

سوف نـشـبـت بـعـد ذـلـكـ، نـظـرـيـة تـقـوـلـ بـأنـهـ يـنـبـغـيـ أنـ تكونـ الدـالـةـ مـتـصـلـةـ عـندـ $x = a$. كـشـرـطـ لـدـرـاسـةـ قـابـلـيـةـ الـاشـتـقـاقـ عـندـ $x = a$. وـسـوـفـ تـمـدـنـاـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ بـطـرـيـقـةـ سـرـيـعـةـ وـسـهـلـةـ لـلـتـحـقـقـ مـنـ أنـ الدـالـةـ f غـيرـ قـابـلـةـ لـلـاشـتـقـاقـ عـندـ $x = a$.


تدريب

أوجد كل النقاط في مجال الدالة حيث تكون الدالة غير قابلة للاشتغال في كل مما يلي:


a) $f(x) = |x - 2| + 3$




b) $f(x) = |x^2 - 1|$



c) $f(x) = (x - 1)^{\frac{2}{3}}$



d) $f(x) = \begin{cases} 2 : x > 3 \\ x + 1 : x \leq 3 \end{cases}$



معلومة:

$$|x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1 & : x \leq -1 \\ 1 - x^2 & : -1 < x < 1 \\ x^2 - 1 & : x \geq 1 \end{cases}$$

Differentiability and Continuity

الاشتقاق والاتصال

نبدأ هذا الجزء بإلقاء نظرة على الطرائق العاديّة التي يمكن أن تفشل في أن تكون فيها للدالة مشتقة عند نقطة.

كأحد الأمثلة، قد أظهرنا بيانياً أن عدم اتصال الدالة عند نقطة يسبب عدم وجود مشتقة للدالة عند هذه النقطة.

وعلية إذا كانت الدالة f ليست متصلة عند نقطة $(a, f(a))$ فإنها غير قابلة للاشتغال عند هذه النقطة.

مثال (6)

لتكن $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 2x - 1, & x \geq 2 \end{cases} : f$

ابحث قابلية الاشتغال للدالة f عند $x = 2$.

الحل:

بحث اتصال الدالة f عند $x = 2$

$$f(2) = 2(2) - 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = (2)^2 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x - 1) = 2(2) - 1 = 3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$


وبالتالي f ليست متصلة عند $x = 2$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{غير موجودة}$$

$\therefore f$ غير قابلة للاشتراق عند $x = 2$.

حاول أن تحل

لتكن f **6** ، ابحث قابلية الاشتراق للدالة f عند $x = 2$.



شكل (7)

الشكل (7) يمثل بيان الدالة في مثال (6).

وفي الحقيقة أن الاتصال شرط جوهري لإمكانية وجود المشتقة، والنظرية التالية تبين العلاقة بين الاشتراق والاتصال.

نظريّة الاشتراق والاتصال

إذا كانت الدالة f لها مشتقة عند نقطة، فإنّها تكون متصلة عند هذه النقطة.

البرهان:

لتكن النقطة $(a, f(a))$ تنتهي لبيان الدالة f

علينا أن نبيّن أن $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = 0$ أو مكافئاً لذلك أن: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

باستخدام قاعدة حاصل ضرب النهايات (وملاحظة أن $0 \neq a - x$) ،

نستطيع أن نكتب:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] &= \lim_{x \rightarrow a} \left[(x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= 0 \cdot f'(a) \quad \text{حيث } f'(a) \text{ موجودة} \\ &= 0 \end{aligned}$$

معكوس النظرية ليس صحيحاً دائماً كما رأينا سابقاً:
فالدالة المتصلة قد يكون لها ركن أو ناب أو مماس رأسى، ومن ثم لا تكون قابلة للاشتغال عند نقطة معينة.

مثال (7)

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 1 & : x > \frac{1}{2} \\ 2x + 1 & : x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

يبين أن الدالة f متصلة عند $x = \frac{1}{2}$ ولكنها غير قابلة للاشتغال عندها.

الحل:

لبحث اتصال الدالة f عند $x = \frac{1}{2}$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} (6x - 1) = 6\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} (2x + 1) = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

\therefore الدالة f متصلة عند $x = \frac{1}{2}$.

نبحث اشتغال الدالة f عند $x = \frac{1}{2}$

$$f'_+(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}} \quad \text{إن وجدت}$$

$$f'_+(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{6x - 1 - 2}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{6\cancel{(x - \frac{1}{2})}}{\cancel{x - \frac{1}{2}}} = 6$$

$$f'_-(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{x - \frac{1}{2}} \quad \text{إن وجدت}$$

$$f'_-(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{2x + 1 - 2}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{2\cancel{(x - \frac{1}{2})}}{\cancel{x - \frac{1}{2}}} = 2$$

$$\therefore f'_-(\frac{1}{2}) \neq f'_+(\frac{1}{2})$$

أي أن f متصلة عند $x = \frac{1}{2}$ ولكنها غير قابلة للاشتغال عند $x = \frac{1}{2}$

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1 & : x > -\frac{1}{3} \\ 5x + 1 & : x \leq -\frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } f$$

يبين أن الدالة f متصلة وغير قابلة للاشتغال عند $x = -\frac{1}{3}$

مثال (8)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 2 & : x \leq 2 \\ -x^2 + 7x - 10 & : x > 2 \end{cases}$$

يبين أن الدالة f متصلة عند $x = 2$ وادرس قابلية الاشتتقاق عندها.

الحل:

لبحث اتصال الدالة f عند $x = 2$

$$f(2) = (2)^2 - (2) - 2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - x - 2) = 4 - 2 - 2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x^2 + 7x - 10) = -4 + 14 - 10 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

\therefore الدالة f متصلة عند $x = 2$

ندرس قابلية الاشتتقاق عند $x = 2$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - x - 2 - 0}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x+1)(x-2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+1) = 2+1 = 3$$

$$\therefore f'_-(2) = 3$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-x^2 + 7x - 10 - 0}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-(x-2)(x-5)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} -(x-5) = -(2-5) = 3$$

$$\therefore f'_+(2) = 3$$

$$f'_+(2) = f'_-(2) = 3$$

\therefore الدالة f قابلة للاشتتقاق عند $x = 2$ و $f'(2) = 3$.

أي أن f متصلة عند $x = 2$ وقابلة للاشتتقاق عند هذه النقطة.

حاول أن تحل

ادرس اتصال الدالة f عند $x = 1$ وقابلية اشتقاها عند هذه النقطة حيث:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2 + 1} & : x \leq 1 \\ 2x - 1 & : x > 1 \end{cases}$$

معلومة:

يستخدم علماء الفضاء الاشتتقاق في دراسة سرعة دوران الأقمار الاصطناعية على مجالها.



(٩) مثال

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & : x \leq 3 \\ x^2 - 1 & : x > 3 \end{cases}$$

أو جد إن أمكن $f'(3)$
الحل:

$$f'_-(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$\begin{aligned} f'_-(3) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+5-8}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-3}{x-3} = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore f'_-(3) = 1$$

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} \quad (\text{إن وجدت})$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 1 - 8}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} (x+3) = 6 \end{aligned}$$

$$\therefore f'_+(3) = 6$$

$$\therefore f'_-(3) \neq f'_+(3)$$

$f'(3)$ غير موجودة

حاول أن تحل

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & : x \leq -1 \\ x^2 - x - 2 & : x > -1 \end{cases}$$

أو جد إن أمكن $f'(-1)$

قواعد الاشتقاق

Rules of Derivative

دعنا نفكّر ونناقش

أوجد مشتقات الدوال التالية بالنسبة إلى x مستخدماً تعريف المشتقة.

$$1 \quad g(x) = 7$$

$$2 \quad f(x) = \frac{x}{3}$$

$$3 \quad u(x) = -\frac{2}{x}$$

$$4 \quad v(x) = x^4$$

من فقرة «دعنا نفكّر ونناقش» لاحظنا أن إيجاد مشتقة الدالة بالتعريف تحتاج إلى مهارات وعمليات حسابية مطولة والقواعد التالية تساعدك في إيجاد مشتقة بعض الدوال دون استخدام تعريف المشتقة وذلك لدوال قابلة للاشتقاق.

قاعدة (1): مشتقة دالة ثابتة

إذا كانت $f(x) = k$ حيث k عدد ثابت فإن $f'(x) = 0$ لجميع قيم x الحقيقية.

يمكننا القول بأن مشتقة أي دالة ثابتة تساوي صفرًا.

البرهان:

إذا كانت $f(x) = k$ حيث k ثابت، فإن:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\therefore f'(x) = 0$$

تدريب (1)

أوجد مشتقة $f(x)$ في الحالات التالية:

a) $f(x) = 5$

b) $f(x) = e^2$

c) $f(x) = \pi^{15}$

قاعدة (2): مشتقة الدالة $f(x) = x$

Derivative of the Function $f(x) = x$

إذا كانت $f(x) = x$ فإن $f'(x) = 1$

لجميع قيم x الحقيقية

سوق تعلم

مشتقات دوال

- القوى الصحيحة الموجبة.
- الضرب في عدد ثابت.
- الجمع والطرح.
- الضرب والقسمة.
- القوى الصحيحة السالبة للمتغير x .

- إيجاد معادلة المماس ومعادلة

- الناظم عند نقطة على منحنى دالة.

- قابلية الاشتقاق على فترة.

المفردات والمصطلحات:

- قاعدة

- مشتقة ثابت

- of a Constant

- مشتقة قوى صحيحة موجبة

- Derivative of Postive Integer Powers

- مشتقة قوى صحيحة سالبة

- Derivative of Negative Integer Powers

- مشتقة الضرب بعدد ثابت

- Derivative of the Constant Multiple

- مشتقة الجمع والطرح

- Derivative of the Sum and the Difference

- مشتقة الضرب والقسمة

- Derivative of the Product and the Quotient

البرهان:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$
$$\therefore f'(x) = 1$$

قاعدة (3): قاعدة القوى للأسس الصحيحة الموجبة للمتغير x

Power Rule for Positive Integer Powers of x

إذا كان $f(x) = x^n$ حيث n عدد صحيح موجب $1 \neq n$ فإن:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}$$

أي أن: $f'(x) = nx^{n-1}$

تدريب (2)

أوجد مشتقة كل من الدوال التالية:

a $f(x) = x^4$

b $g(x) = x^{10}$

c $h(x) = x^{12}$

The Constant Multiple Rule

قاعدة (4): قاعدة الضرب بعدد ثابت

إذا كانت f دالة في x قابلة للاشتقاق وكان k عدداً ثابتاً فإن:

$$\frac{d}{dx}(kf(x)) = k \frac{d}{dx} f(x)$$

($kf(x)$)' = $k f'(x)$ أي أن:

البرهان:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(kf(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(f(x+h) - f(x))}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = k \frac{d}{dx}(f(x)) \end{aligned}$$

توضّح القاعدة (4) بأنّه

مشتقة ضرب دالة قابلة للاشتقاق في ثابت هو مشتقة هذه الدالة مضروبة في الثابت.

القواعدتان (4), (3) تمكننا من إيجاد مشتقة أي حدّ جبري بسرعة.

$$(7x^4)' = 7(x^4)' = 28x^3 \quad \text{مثلاً}$$

لإيجاد مشتقات كثيرات الحدود، نحتاج إلى إيجاد مشتقات مجاميع وفروق حدود جبرية.

نستطيع أن نفعل ذلك بتطبيق قاعدة الجمع والطرح.

قاعدة (5): قاعدة الجمع والطرح

إذا كانت f, g دالّتين في x قابلتين للاشتغال، فإن مجموعهما والفرق بينهما يكونان قابلين للاشتغال عند كل نقطة تكون عندها كل من f, g قابلة للاشتغال.

$$\frac{d}{dx}(f(x) \pm g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) \pm \frac{d}{dx}(g(x))$$

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

أي أن:

البرهان:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \frac{d}{dx}(f(x)) + \frac{d}{dx}(g(x)) \end{aligned}$$

وبالمثل بالنسبة إلى الفرق بين دالّتين.

مثال (1)

أوجد $\frac{dy}{dt}$ حيث $y = t^3 + 6t^2 - \frac{5}{3}t + 16$

الحل:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(t^3) + \frac{d}{dt}(6t^2) - \frac{d}{dt}\left(\frac{5}{3}t\right) + \frac{d}{dt}(16)$$

قاعدة الجمع
والطرح

$$= 3t^2 + 6 \times 2t - \frac{5}{3} + 0$$

قاعدة الدالة الثابتة وقاعدة القوى

$$= 3t^2 + 12t - \frac{5}{3}$$

حاول أن تحل

أوجد $\frac{dy}{dx}$ حيث $y = 5x^3 - 4x^2 + 6$ 1

The Product Rule

قاعدة (6): اشتغال ضرب دالّتين

ضرب دالّتين f, g في x قابلتين للاشتغال يكون قابلاً للاشتغال بحيث:

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = f(x) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) + g(x) \cdot \frac{d}{dx}(f(x))$$

$$(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

أي أن:

البرهان:

نبدأ كالمعتاد بتطبيق التعريف:
(إن وجدت)

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h}$$

لتغيير الكسر إلى كسر مكافئ يحتوي على الفرق بين نواتج القسمة لمشتقّات الدالّتين f , g , نطرح ونجمع $f(x+h) \cdot g(x)$ في البسط.

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

عندما تقترب h من الصفر فإن $f(x+h)$ تقترب من $f(x)$, لأن f تكون متصلة عند x وقابلة للاشتغال عند x .

الكسران يقتربان من قيم $\lim_{h \rightarrow 0} g(x) = g(x)$, $\lim_{h \rightarrow 0} f(x) = f(x)$,

$$\frac{d}{dx}(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot \frac{d}{dx}g(x) + g(x) \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

يمكّنا القول إن مشتقّة ضرب دالّتين = الدالة الأولى × مشتقّة الدالة الثانية + الدالة الثانية × مشتقّة الدالة الأولى.

مثال (2)

أوجد $f'(x)$ إذا كان $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$

الحل:

$$u = x^2 + 1, \quad v = x^3 + 3$$

لتكن:

بتطبيق قاعدة الضرب نجد أن:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx} \\ &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

حاول أن تحل

a هل يمكنك حل مثال 2 بطريقة أخرى؟ فسر إجابتك.

b أوجد $f'(x)$ إذا كان:

1 $f(x) = (2x + 1)(3x - 2)$

2 $f(x) = 4x^2(x + 6)$

3 $f(x) = (x^3 - 4)^2$

قاعدة (7): قاعدة القسمة

The Quotient Rule

لتكن f, g دالتين في x قابلتين للاشتغال حيث $0 \neq g(x)$ فإن:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x) \cdot \frac{d}{dx} f(x) - f(x) \cdot \frac{d}{dx} g(x)}{(g(x))^2}$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \quad \text{أي أن:}$$

البرهان:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot f(x+h) - f(x) \cdot g(x+h)}{h \cdot g(x+h) \cdot g(x)}$$

لتغيير الكسر إلى كسر مكافئ يحتوي على الفرق بين نواتج القسمة لمشتقّات الدالتين g, f , نطرح ونجمع $(g(x) \cdot f(x))$ في البسط.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) \cdot f(x+h) - g(x) \cdot f(x) + g(x) \cdot f(x) - f(x) \cdot g(x+h)}{h \cdot g(x+h) \cdot g(x)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{g(x+h) \cdot g(x)}$$

وبأخذ الهايات في البسط والمقام نحصل على قاعدة ناتج القسمة التالية:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x) \cdot \frac{d}{dx} f(x) - f(x) \cdot \frac{d}{dx} g(x)}{(g(x))^2}$$

يمكّنا القول إن: مشتقّة قسمة دالتين =

$$\frac{\text{دالة المقام} \times \text{مشتقّة دالة البسط} - \text{دالة البسط} \times \text{مشتقّة دالة المقام}}{\text{مربع دالة المقام}}$$

مثال (3)

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{5x^2 + 1} \quad \text{أوجد مشتقّة}$$

الحل:

بتطبيق قاعدة القسمة حيث: $u = x^3 - 1$, $v = 5x^2 + 1$

$$f(x) = \frac{u}{v}$$

$$f'(x) = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{(5x^2 + 1) \cdot (3x^2) - (x^3 - 1) \cdot (10x)}{(5x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{15x^4 + 3x^2 - 10x^4 + 10x}{(5x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{5x^4 + 3x^2 + 10x}{(5x^2 + 1)^2}$$

حاول أن تحل

$$f(x) = \frac{4x^2 + 2x}{2x^3 + 5} \quad 3$$

يمكننا إيجاد ميل المماس لمنحنى الدالة f عند النقطة $(a, f(a))$ عن طريق إيجاد المشتقة

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

والمستقيم العمودي (الناظم) على منحنى الدالة عند النقطة $(a, f(a))$ هو المستقيم العمودي على مماس المنحنى عند تلك النقطة ومعادلته:

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

مثال (4)

أوجد معادلة المماس ومعادلة الناظم عند النقطة $(1, \frac{2}{3})$ لمنحنى الدالة f حيث

الحل:

نوجد أولاً مشتقة الدالة f بتطبيق قاعدة القسمة

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 2)(x^3 + 1)' - (x^3 + 1)(x^2 + 2)'}{(x^2 + 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 2)(3x^2) - (x^3 + 1)(2x)}{(x^2 + 2)^2}$$

$$f'(1) = \frac{(1^2 + 2)(3(1)^2) - (1^3 + 1)(2(1))}{(1^2 + 2)^2} = \frac{5}{9} \quad \text{ومنه الميل:}$$

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) \quad \text{معادلة خط المماس:}$$

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

$$\therefore y - \frac{2}{3} = \frac{5}{9}(x - 1)$$

$$y = \frac{5}{9}x - \frac{5}{9} + \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{5}{9}x + \frac{1}{9}$$

لإيجاد معادلة الناظم عند النقطة $(1, \frac{2}{3})$ على المنحنى نستخدم المعادلة:

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$


$$\frac{-1}{f'(a)} = -\frac{9}{5} \quad \text{ميل الناظم:}$$

$$y - \frac{2}{3} = -\frac{9}{5}(x - 1)$$

$$y = -\frac{9}{5}x + \frac{37}{15}$$

تذكرة:

إذا كان مستقيمان متوازيان وليس أيّاً منهما أفقياً فإنّ ناتج ضرب ميليهما يساوي -1 .



رسم توضيحي
العمودي متوازٍ مع المماس
عند النقطة $(1, 3)$.

حاول أن تحل

أوجد معادلة المماس ومعادلة الناظم على منحني الدالة f حيث $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ عند النقطة $(1, 0)$ 4

نتيجة

إذا كانت g دالة قابلة للاشتغال وكانت $0 \neq g(x)$ ، k عددا ثابتا فإن:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{k}{g(x)} \right) &= \frac{-k \frac{d}{dx}(g(x))}{(g(x))^2} \\ \left(\frac{k}{g(x)} \right)' &= \frac{-k \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \quad \text{أي أن:} \end{aligned}$$

البرهان:

$$\therefore \frac{d}{dx}(k) = 0 \quad \text{مشتقة دالة ثابتة}$$

وبتطبيق قاعدة القسمة

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \left(\frac{k}{g(x)} \right) &= \frac{g(x) \times 0 - k \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \\ &= \frac{-k \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \end{aligned}$$

مثال (5)

أوجد $f'(x)$ حيث $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$

الحل:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{x^2 + 1} \right) \\ &= \frac{-3 \times 2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-6x}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

حاول أن تحل

أوجد $f'(x)$ حيث $f(x) = \frac{-4}{x^2 + 2x + 5}$ 5

Negative Integer Powers of x

قوى x الصحيحة السالبة (الأسس الصحيحة السالبة)

قاعدة اشتتقاق قوى x الصحيحة السالبة هي قاعدة الاشتتقاق نفسها في حالة القوى الصحيحة الموجبة كما في القاعدة (3). لذلك نستطيع الآن أن نوسع قاعدة القوى لتشمل القوى الصحيحة السالبة باستخدام قاعدة القسمة.

قاعدة (8): قاعدة القوى للأسس الصحيحة السالبة للمتغير x

Power Rule for Negative Integer Powers of x

إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً، $0 \neq x$ فإن:

$$\frac{d}{dx}(x^{-n}) = -n x^{-n-1}$$

$$(x^{-n})' = -n x^{-n-1} \quad \text{أي أن}$$

البرهان:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^{-n}) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^n}\right) \\ &= \frac{-1 \times \frac{d}{dx}(x^n)}{(x^n)^2} \\ &= \frac{-1 \times (n x^{n-1})}{(x^n)^2} \\ &= \frac{-n x^{n-1}}{x^{2n}} \\ &= -n x^{n-1-2n} \\ &= -n x^{-n-1} \end{aligned}$$

نتيجة

قاعدة (3)

مثال (6)

لتكن: $x = 1$. أوجد $\frac{dy}{dx}$ عند $y = \frac{x^2 + 3}{2x}$

الحل:

يمكن أن نوجد المشتقة بقاعدة القسمة، لكن من الأيسر أن نبسط أو لا كمجموع قوتين للمتغير x :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2x} + \frac{3}{2x}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x^{-1}\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x^{-2} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \left[\frac{1}{2} - \frac{3}{2}x^{-2}\right]_{x=1} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

حاول أن تحل

لتكن: 6 $x = -1$ عند $\frac{dy}{dx}$ ، أوجد $y = \frac{3x^2 + 7}{8x^2}$

قاعدة (9)

إذا كان $\frac{d}{dx}(x^{\frac{m}{n}}) = \frac{m}{n}x^{\frac{m}{n}-1}$ حيث $f(x) = x^{\frac{m}{n}}$ عددان صحيحان مختلفان، فإن $n \neq 0$ فإن جميع قيم x التي تكون المشتقة عندها موجودة.

$$(x^{\frac{m}{n}})' = \frac{m}{n}(x)^{\frac{m}{n}-1} \quad \text{أي أن}$$

يمكن استنتاج أن: إذا كانت $f(x) = \sqrt{x}$ تكون $f'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

مثال (7)

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ ، $x > 0$:
الحل:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} \\ &= \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \\ f'(x) &= \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

بتطبيق القاعدة

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = x^{\frac{4}{3}}$: 7

مثال (8)

لتكن الدالة $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & : x \leq 1 \\ 2x + 1 & : x > 1 \end{cases}$ دالة متصلة على مجالها.
أوجد $f'(x)$ إن أمكن

الحل:

مجال الدالة: $D_f = (-\infty, 1] \cup (1, \infty) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & : x < 1 \\ \text{تحث} & : x = 1 \\ 2 & : x > 1 \end{cases}$$

$$f(1) = (1)^2 + 2 = 3$$

$$\begin{aligned}
 f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} && \text{إن وجدت} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 2 - 3}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) \\
 &= 1 + 1 = 2 && (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} && \text{إن وجدت} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x + 1 - 3}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - 2}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x-1)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 = 2 && (2)
 \end{aligned}$$

$$f'_-(1) = f'_+(1) = 2 \quad \text{من (1) و (2)}$$

$$\therefore f'(1) = 2$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & : x < 1 \\ 2 & : x = 1 \\ 2 & : x > 1 \end{cases} \quad \text{ومنه}$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} 2x & : x \leq 1 \\ 2 & : x > 1 \end{cases}$$

حاول أن تحل

أوجد المشتقة إن أمكن لكل من الدوال المتصلة التالية: 8

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & : x \leq 2 \\ 4x - 3 & : x > 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & : x < 1 \\ 2\sqrt{x} & : x \geq 1 \end{cases}$

مشتقات الدوال المثلثية

Derivatives of Trigonometric Functions

دعونا نفك ونتناقش

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = \sin x$:
مستخدماً تعريف المشتقة.

والقواعد التالية تساعدك في إيجاد مشتقة بعض الدوال المثلثية دون استخدام تعريف المشتقة.

أولاً: مشتقات الدوال الجيبية


1 مشتقة دالة الجيب هي موجب دالة جيب التمام

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

2 مشتقة دالة جيب التمام هي سالب دالة الجيب

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

قواعد الاشتغال التي تم دراستها صحيحة للدوال الجيبية.



شكل (1)

لاحظ الشكل (1):

الدالة $f(x) = \sin x$ لها مماسات أفقية عند كل من القيم $\dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ وبيان الدالة $f'(x) = \cos x$ يتقاطع مع محور السينيات عند هذه القيم أي أن المشتقة عندها تساوي الصفر.

مثال (1)

أوجد المشتقّات للدوال التالية:

a $y = x^2 \sin x$

b $u = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

c $f(x) = \sin^2 x$

سوف تعلم

- إيجاد مشتقة دالة الجيب.
- إيجاد مشتقة دالة جيب التمام.
- إيجاد مشتقات الدوال المثلثية الأخرى.

المفردات والمصطلحات:

- مشتقة دالة الجيب

Derivative of the Sine Function

- مشتقة دالة جيب التمام

Derivative of the Cosine Function

- مشتقة دالةظل الظل

Derivative of the Tangent Function

- مشتقة دالة ظل التمام

Derivative of the Cotangent Function

- مشتقة دالة القاطع

Derivative of sec Function

- مشتقة دالة قاطع التمام

Derivative of csc Function

تذكرة:

إذا كان x درجة زاوية
بالرadian فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

الحل:

قاعدة الضرب

$$\begin{aligned} \text{a} \quad \frac{dy}{dx} &= \left(\frac{d}{dx}x^2 \right) \cdot \sin x + \left(\frac{d}{dx}\sin x \right) \cdot x^2 \\ &= 2x\sin x + x^2\cos x \end{aligned}$$

قاعدة القسمة

$$\begin{aligned} \text{b} \quad \frac{du}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \cdot \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{-\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c} \quad \frac{d}{dx} f(x) &= \frac{d}{dx} (\sin^2 x) \\ &= \frac{d}{dx} (\sin x \cdot \sin x) \\ &= \sin x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= \sin x \cdot \cos x + \sin x \cdot \cos x \\ &= 2 \sin x \cos x \end{aligned}$$

حاول أن تحل

أوجد المشتقات للدوال التالية: 1

a) $h(x) = \cos^2 x$ b) $g(x) = \frac{x}{\cos x}$ c) $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$

ثانيًا: مشتقات الدوال المثلثية الأخرى

الدالتان $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ دالتان قابلتان للاشتتقاق، لذا فإن الدوال المثلثية التالية:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

هي أيضًا دوال قابلة للاشتتقاق عند كل قيمة للمتغير x تكون معرفة عندها وتعطى مشتقاتها بالقواعد التالية:

1) $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$

2) $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$

3) $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$

4) $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$

تذكرة:

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

مثال (2)

أوجد مشتقات الدوال التالية:

a) $f(x) = \tan x + \cot x$

b) $g(x) = \sec x \cdot (1 + \sin x)$

c) $h(x) = \csc x + \sin x \cdot \tan x$

الحل:

a) $f(x) = \tan x + \cot x$

$$f'(x) = \sec^2 x + (-\csc^2 x) = \sec^2 x - \csc^2 x$$

b) $g(x) = \sec x \cdot (1 + \sin x)$

$$g'(x) = (1 + \sin x)(\sec x \cdot \tan x) + \sec x \cdot \cos x = \sec x \cdot \tan x + \sec x \cdot \tan x \cdot \sin x + 1$$

c) $h(x) = \csc x + \sin x \cdot \tan x$

$$h'(x) = -\csc x \cdot \cot x + \tan x \cdot \cos x + \sec^2 x \cdot \sin x$$

حاول أن تحل

أوجد مشتقات الدوال التالية: 2

a) $f(x) = \frac{1 + \tan x}{\tan x}$

b) $g(x) = \sec x + \csc x$

c) $h(x) = \frac{\sec x}{\csc x}$

مثال (3)

أوجد معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة: $y = \tan x$ عند النقطة $P\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$

الحل:

نوجد أولاً مشتقة الدالة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \sec^2 \frac{\pi}{4} = (\sqrt{2})^2 = 2$$

وعليه ميل المستقيم العمودي لمنحنى عند $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$

$$m_1 = \frac{-1}{m} = \frac{-1}{2}$$

هي معادلة المستقيم العمودي:

$$y - 1 = \frac{-1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y = \frac{-1}{2}x + \frac{\pi}{8} + 1$$

حاول أن تحل

أوجد معادلة المستقيم العمودي لمنحنى الدالة: 3 $y = \sec x$ عند النقطة $F\left(\frac{\pi}{3}, 2\right)$

قاعدة السلسلة

Chain Rule

سوف تعلم

- إيجاد مشتقة تركيب دالتين باستخدام قاعدة السلسلة.

المفردات والمصطلحات:

- قاعدة السلسلة

Chain Rule

- دالة مركبة

Composite Function

- قاعدة سلسلة القوى

Power Chain Rule

دعنا نفك ونناقش

لتكن الدوال التالية:

$$f(x) = 3x^2 + 1, \quad g(x) = x^2$$

$$h(x) = x^3, \quad q(x) = x^{10}$$

أكمل ما يلي:

a $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x^2 + 1)$
 $= (3x^2 + 1)^2 = 9x^4 + \dots + \dots$

$$\frac{d}{dx}(g \circ f)(x) = 36x^3 + \dots + \dots$$

b $(h \circ f)(x) = h(f(x)) = \dots$
 $= \dots = \dots$

$$(h \circ f)'(x) = \dots$$

c $(q \circ f)(x) = \dots$

هل من السهل إيجاد $(q \circ f)'(x)$ بنفس الأسلوب السابق؟

من فقرة «دعنا نفك ونناقش» لاحظنا أنه عند إيجاد مشتقة:

$$(q \circ f)(x) = (3x^2 + 1)^{10}$$

سنجد صعوبة في فك هذا المقدار.

تساعدنا القواعد التالية على إيجاد مشتقة مثل هذه الدوال.

قاعدة السلسلة (التسلسل)

إذا كانت الدالة f قابلة للاشتغال عند x ، الدالة g قابلة للاشتغال عند $f(x)$ ، فإن الدالة المركبة

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

تكون قابلة للاشتغال عند x ، ويكون:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

أي يمكننا القول إن مشتقة الدالة المركبة $(f \circ g)(x)$ هي مشتقة الدالة f عند x مضروبة في مشتقة الدالة g عند x .

مثال (1)

إذا كان $f(x) = 3x^2 + 1$ ، $g(x) = x^{10}$. فأوجد باستخدام قاعدة السلسلة

($f \circ g$)'(x) a

($g \circ f$)'(-1) b

الحل: $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

a) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$f'(x) = 6x$ ، $g'(x) = 10x^9$

$f'(g(x)) = 6(x^{10}) = 6x^{10}$

$\therefore (f \circ g)'(x) = 6x^{10} \cdot 10x^9 = 60x^{19}$

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = 3(x^{10})^2 + 1 = 3x^{20} + 1$

$\therefore (f \circ g)'(x) = 60x^{19}$

حل آخر

b) $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

$= 10(f(x))^9 \cdot 6x$

$= 10(3x^2 + 1)^9 \cdot 6x$

$(g \circ f)'(-1) = -60(4)^9$

$= -15728640$

حاول أن تحل

a) هل يمكنك حل مثال (1) بطريقة أخرى؟ فسر.

لتكن: b) $(g \circ f)'(0)$ ، $(f \circ g)'(x)$ أو جد باستخدام قاعدة السلسلة $f(x) = -2x^3 + 4$ ، $g(x) = x^{13}$

مثال (2)

لتكن: $f(x) = \frac{2x+1}{x}$ ($x \neq 0$) ، $g(x) = x^2 + 1$

أوجد باستخدام قاعدة السلسلة $(f \circ g)'(x)$

الحل:

$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$f'(x) = \frac{2x - (2x+1)}{x^2} = \frac{-1}{x^2}$ ، $g'(x) = 2x$

$f'(g(x)) = f'(x^2 + 1) = \frac{-1}{(x^2 + 1)^2}$

المتغير: $g(x)$

$\therefore (f \circ g)'(x) = \frac{-1}{(x^2 + 1)^2} \cdot 2x$

قاعدة السلسلة

$= \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$

حاول أن تحل

لتكن: 2 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$ ، $g(x) = \sqrt{x}$

أوجد باستخدام قاعدة السلسلة (1)

وضع عالم الرياضيات لاینتر (Leibniz) صورة أخرى لقاعدة السلسلة.

صورة أخرى لقاعدة السلسلة

إذا كانت $y = f(u)$ ، $u = g(x)$ فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

يتم حسابها عند $u = g(x)$

مثال (3)

إذا كانت: $y = u^3 - 3u + 1$ ، $u = 5x^2 + 2$

فأجد: $\frac{dy}{dx}$ باستخدام قاعدة التسلسل
الحل:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{du} = 3u^2 - 3$$

مشقة بدلالة u

$$\frac{du}{dx} = 10x$$

مشقة بدلالة x

$$\frac{dy}{dx} = (3u^2 - 3) \times (10x)$$

قاعدة التسلسل

$$\frac{dy}{dx} = (3(5x^2 + 2)^2 - 3) \times (10x)$$

تعويض

$$= 750x^5 + 600x^3 + 90x$$

حاول أن تحل

لتكن: 3 $y = u^2 + 4u - 3$ ، $u = 2x^3 + x$

أوجد: $\frac{dy}{dx}$ باستخدام قاعدة التسلسل.

الربط بالفيزياء

إذا كانت $s(t)$ دالة موقع
جسم بعد t ثانية من حركته
فإن سرعته اللحظية v هي:
 $v = \frac{ds}{dt} = s'(t)$

مثال (4)

يتحرّك جسيم على محور السينات بحيث إن موضعه عند أي لحظة $t \geq 0$ يعطى بالدالة:

$$S = \cos(t^2 + 1) . \text{ أوجد السرعة اللحظية للجسيم كدالة في } t.$$

الحل:

$$\text{نعلم أن: } v = \frac{dS}{dt} \text{ هي السرعة اللحظية}$$

في هذه الحالة S دالة مركبة، حيث:

لدينا:

$$\frac{dS}{du} = -\sin(u)$$

$$S = \cos(u)$$

$$\frac{du}{dt} = 2t$$

$$u = t^2 + 1$$

باستخدام قاعدة السلسلة:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \frac{dS}{du} \cdot \frac{du}{dt} \\ &= (-\sin(u)) \cdot 2t \\ &= (-\sin(t^2 + 1)) \cdot 2t \\ &= -2t \sin(t^2 + 1) \end{aligned}$$

حاول أن تحل

$$4 . \text{ أوجد مشتقة } y = \sin(x^2 + x) \text{ بالنسبة إلى المتغير } x.$$

من مثال (4) يمكن إيجاد المشتقة باستخدام القاعدة التالية:
 $\frac{d}{dx}(\cos f(x)) = (-\sin f(x)) \cdot f'(x)$ ويمكن تعميمها على الدوال المثلثية الأخرى.

مثال (5)

أوجد مشتقة الدالة: $f(x) = \sin^3 x$ باستخدام قاعدة السلسلة.

الحل:

$$g(x) = \sin x , h(x) = x^3$$

نفرض أن:

$$\therefore f(x) = (h \circ g)(x)$$

$$f'(x) = (h \circ g)'(x)$$

$$= h'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$= 3(g(x))^2 \cdot \cos x$$

$$= 3 \sin^2 x \cos x$$

حاول أن تحل

$$5 . \text{ أوجد مشتقة الدالة: } f(x) = \cos^5 x \text{ باستخدام قاعدة السلسلة.}$$

ملاحظة:

$v = \frac{ds}{dt}$ تسمى أيضًا
السرعة المتجهة ويمكن
أن تكون موجبة أو سالبة
أو صفر.

تذكرة:

اقتصرت دراستنا على دوال
قابلة للتركيب

قاعدة سلسلة القوى

Chain Rule Powers

في كثير من الأحيان نحتاج إلى إيجاد مشتقة دالة ما على الصورة: $y = [f(x)]^n$ حيث n عدد نسبي. لذلك نستخدم القاعدة التالية والمسماة بقاعدة سلسلة القوى:

قاعدة سلسلة القوى

إذا كانت $f(x)$ قابلة للاشتقاق على مجالها وكان n عدداً نسبياً فإن:

$$\frac{d}{dx} (f(x))^n = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$$

مثال (6)

لتكن: $y' = \sqrt[5]{(x^2 + 3x + 5)^3}$

الحل:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[5]{(x^2 + 3x + 5)^3} \\ &= (x^2 + 3x + 5)^{\frac{3}{5}} \\ y' &= \frac{3}{5}(x^2 + 3x + 5)^{\frac{3}{5}-1} \cdot (2x + 3) \\ &= \frac{3}{5}(x^2 + 3x + 5)^{-\frac{2}{5}} \cdot (2x + 3) \\ &= \frac{3(2x + 3)}{5\sqrt[5]{(x^2 + 3x + 5)^2}} \end{aligned}$$

حاول أن تحل

6 لتكن: $y' = \sqrt[4]{(2x^4 - 3x^2 + 4)^3}$

مثال (7)

أوجد ميل مماس المنحنى $y = \sin^5 x$ عند $x = \frac{\pi}{3}$

الحل:

$$\frac{dy}{dx} = 5 \sin^4 x (\sin x)' = 5 \sin^4 x \cdot \cos x$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{3}} = 5 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^4 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{45}{32}$$

ميل المماس هو:

حاول أن تحل

7 يَبْيَنُ أَنَّ مِيلَ أَيِّ مِمَاسٍ لِلْمَنْحُنِيِّ $y = \frac{1}{(-2x-1)^3}$ دَائِمًا يَكُونُ مُوجَّاً حيث

المشتقات ذات الرتب العليا والاشتقاق الضمني

Higher Order Derivatives and Implicit Differentiation

دعا نفكر ونتناقش

لتكن: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$

أكمل:

$$1 \quad f'(x) = \dots = g(x)$$

$$2 \quad g'(x) = \dots$$

هل $? g'(x) = (f'(x))'$

سوف تعلم

- المشتقات العليا.
- الاشتقاق الضمني.

المفردات والمصطلحات:

- مشتقة ذات رتبة عليا

Higher Order Derivative

- اشتقاق ضماني

Implicit Derivative

تذكر:

$$(a) \quad y = f(x)$$

$$(b) \quad \frac{dy}{dx} = y'$$

ملاحظة:

أحياناً نستخدم قاعدة السلسلة مرتين أو أكثر لإيجاد مشتقة.

ملاحظة:

لا يجب الخلط بين رتبة مشتقة الدالة $y^{(n)}$ و y^n من قوى y .

Higher Order Derivatives

أولاً: المشتقات ذات الرتب العليا

رمزنا سابقاً لمشتقة دالة على مجالها بالرمز $\frac{dy}{dx} = y'$ والآن سوف تسمى y' المشتقة من الرتبة الأولى للدالة y بدلالة المتغير x .

والمشتقة الأولى نفسها (y') يمكن أن تكون دالة قابلة للاشتقاق على مجالها بدلالة المتغير x وبالتالي يمكن كتابتها:

$$y'' = \frac{d(y')}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

وهذه تسمى المشتقة من الرتبة الثانية للدالة y بدلالة x .

والمشتقة الثانية نفسها يمكن أن تكون دالة قابلة للاشتقاق على مجالها بدلالة المتغير x وبالتالي يمكن كتابة:

$$y''' = \frac{d(y'')}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d^3 y}{dx^3}$$

وهذه تسمى المشتقة من الرتبة الثالثة للدالة y بدلالة المتغير x .

وبصورة عامة إذا كان n عددًا صحيحًا حيث $1 < n$ فإن مشتقة الدالة y من الرتبة n بدلالة x هي على الشكل التالي:

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx}(y^{(n-1)}) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

مثال (1)

أوجد المشتقات حتى الرتبة الرابعة للدالة $y = 2x^7 - 4x^2 + 3x - 5$ بدلالة المتغير x .

الحل:

$$y = 2x^7 - 4x^2 + 3x - 5$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = 14x^6 - 8x + 3 \quad \text{المشتقة من الرتبة الأولى}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = 84x^5 - 8 \quad \text{المشتقة من الرتبة الثانية}$$

$$y''' = \frac{d^3y}{dx^3} = 420x^4 \quad \text{المشتقة من الرتبة الثالثة}$$

$$y^{(4)} = \frac{d^4y}{dx^4} = 1680x^3 \quad \text{المشتقة من الرتبة الرابعة}$$

حاول أن تحل

إذا كانت: 1 $y = 4x^5 - 5x^3 + 7$

فأوجد المشتقات حتى الرتبة الثالثة.

مثال (2)

إذا كانت $y = \sin x$. بين أن $y^{(4)} = y$.

الحل:

$y = \sin x$ دالة معروفة لكل قيم x على \mathbb{R}

$$y' = \cos x \quad \text{مشتقة من الرتبة الأولى}$$

$$y'' = -\sin x \quad \text{مشتقة من الرتبة الثانية}$$

$$y''' = -\cos x \quad \text{مشتقة من الرتبة الثالثة}$$

$$y^{(4)} = \sin x \quad \text{مشتقة من الرتبة الرابعة}$$

$$\therefore y^{(4)} = y$$

حاول أن تحل

لتكن الدالة: 2 $y = \cos x$

$$\therefore y^{(4)} + y'' = 0$$

مثال (3)

أوجد y'' حيث $y = \frac{1}{\cos x}$
الحل:

$$y = \frac{1}{\cos x} = \sec x$$

$$y' = \sec x \tan x$$

$$y'' = \frac{d}{dx}(\sec x \tan x)$$

$$= \tan x \frac{d}{dx} \sec x + \sec x \frac{d}{dx} \tan x$$

$$= \tan x \cdot \sec x \cdot \tan x + \sec x \cdot \sec^2 x$$

$$= \sec x \cdot \tan^2 x + \sec^3 x$$

حاول أن تحل

3 أوجد y'' حيث $y = \frac{1}{\sin x}$

Implicit Derivative

ثانياً: الاشتتقاق الضمني

في دراستنا السابقة يمكننا إيجاد مشتقات بعض الدوال على الصورة $y = f(x)$ مثل:

$$y = 3x^2 - 2x + 1, \quad y = \sqrt{x^2 + 4}, \dots$$

وبالنظر لمعادلة المنحنى x


نلاحظ أنه يمكننا كتابتها بالصورة الصريحة $y = f(x)$ أي

ومنه يمكننا إيجاد مشتقة هذه الدالة أو ميل منحنى هذه الدالة حيث $x \neq 1$.

وبالنسبة لمنحنى $25 = y^2 + x^2$ نجد أن ميل المنحنى معروف عند جميع نقاطه باستثناء النقطتين $(5, 0)$ و $(-5, 0)$. لماذا؟

ونجد أن المنحنى هو اتحاد منحني الدالتين

$y_1 = f_1(x) = \sqrt{25 - x^2}$ ، $y_2 = f_2(x) = -\sqrt{25 - x^2}$ كلّ منها قابلة للاشتقاق عند أيّ نقطة في مجالها عدا 5 ، -5 .



ولكن، هل يمكننا إيجاد ميل المنحنى إذا كان من غير الممكن التوصل للصورة الصريحة للحصول على الدالة المكونة لها؟ الإجابة عن هذا السؤال تمثل في اعتبار y دالة قابلة للاشتتقاق في x ، واحتتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى x باستخدام قواعد الاشتتقاق التي سبق تعلّمها في هذه الوحدة.

وهذا يمكننا من إيجاد صيغة $\frac{dy}{dx}$ بدالة y ، x نحسب منها ميل المنحنى عند أيّ نقطة (x, y) على المنحنى.

تسمى عملية إيجاد المشتقة $\frac{dy}{dx}$ بهذه الطريقة الاشتتقاق الضمني.

مثال توضيحي

$$\text{أوجد } \frac{dy}{dx} \text{ حيث } y^3 + 5y^2 - x^3 = 0$$

الحل:

نفرض أن $y = f(x)$ وبالتعويض في المعادلة:

$$(f(x))^3 + 5(f(x))^2 - x^3 = 0$$

ويستخدم قاعدة السلسلة نوجد المشتق فتكون كالتالي:

$$3(f(x))^2 \cdot f'(x) + 10f(x) \cdot f'(x) - 3x^2 = 0$$

أي أن:

$$3y^2 y' + 10yy' - 3x^2 = 0$$

ومنها نحصل على y' :

$$y'(3y^2 + 10y) = 3x^2$$

$$\therefore y' = \frac{3x^2}{3y^2 + 10y}$$

باستخدام نفس الخطوات المتبعة في المثال التوضيحي يمكننا التوصل إلى أن:

$$(y^2)' = 2yy'$$

$$(y^3)' = 3y^2 y'$$

مثال (4)

$$\text{أوجد } y' = \frac{dy}{dx} \text{ في الحالات التالية:}$$

a) $y^2 + xy = 7x$

b) $y = x + x^2 y^5$

الحل:

a) نشتّق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير x باعتبار أن y دالة في x قابلة للاشتقاق، وتطبيق قاعدة السلسلة هو:

$$\left[\frac{d}{dx}(f(x))^n = n(f(x))^{n-1} f'(x) \right]$$

$$2yy' + 1xy' + y = 7$$

$$y'(2y + x) = 7 - y$$

$$y' = \frac{7 - y}{2y + x}$$

b) $y = x + x^2 y^5$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dx} + \frac{d(x^2 y^5)}{dx}$$

$$y' = 1 + y^5 \frac{d(x^2)}{dx} + x^2 \frac{d(y^5)}{dx}$$

$$y' = 1 + 2xy^5 + 5x^2y^4y'$$

$$y' - 5x^2y^4y' = 1 + 2xy^5$$

$$y'(1 - 5x^2y^4) = 1 + 2xy^5$$

$$y' = \frac{1 + 2xy^5}{1 - 5x^2y^4}$$

حاول أن تحل

٤ لكن: $y' = \frac{dy}{dx}$ ، $y^2 = x^2 - 2x$ ، أوجد

و عموماً، تتم عملية الاشتتقاق الضمني وفق الخطوات التالية على الترتيب:

١ اشتتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير x .

٢ تجميع الحدود التي تحتوي $\frac{dy}{dx}$ أو y' في أحد طرفي المعادلة.

٣ إخراج $\frac{dy}{dx}$ أو y' كعامل مشترك.

٤ كتابة المعادلة على الصورة $\frac{dy}{dx}$ أو y' بدالة y ، x .

مثال (٥)

أوجد ميل المماس للمنحنى (الدائرة) الذي معادلته $x^2 + y^2 = 25$ عند النقطة $(3, -4)$.

الحل:

يمكننا إيجاد ميل المنحنى عند النقطة $(3, -4)$ بسهولة باستخدام الاشتتقاق الضمني للمعادلة الأصلية بالنسبة إلى x .

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = -2x \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$$

وبالتعويض بـ $(3, -4)$

$$\therefore \text{ميل المماس} = \frac{3}{4}$$

حاول أن تحل

٥ أوجد ميل المماس للمنحنى الذي معادلته: $x^2 - y^2 + yx - 1 = 0$ عند $(1, 1)$

مثال (6)

أوجد ميل المماس $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ للمنحنى الذي معادلته: $2y = x^2 + \sin y$ عند النقطة $(2\sqrt{\pi}, 2\pi)$

الحل:

نشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى x .

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

$$2\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2\frac{dy}{dx} = 2x + (\cos y)\frac{dy}{dx}$$

$$2\frac{dy}{dx} - (\cos y)\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{(2\sqrt{\pi}, 2\pi)} = \frac{2(2\sqrt{\pi})}{2 - \cos(2\pi)}$$

$$= \frac{4\sqrt{\pi}}{2 - 1} = 4\sqrt{\pi}$$

ميل المماس للمنحنى عند النقطة $(2\sqrt{\pi}, 2\pi)$ هو $4\sqrt{\pi}$

حاول أن تحل

6 أوجد ميل المماس $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ للمنحنى الذي معادلته: $x^2 + y^2 - 2xy = 1$ حيث $y \neq x$ عند النقطة $(1, 2)$

مثال (7)

للمنحنى الذي معادلته $x = 2\sqrt{y} + y$ ثم أوجد ميل المماس لهذا المنحنى عند النقطة $(1, 3)$

الحل:

الاشتقاق الضمني

$$2y^{\frac{1}{2}} + y = x$$

$$2 \cdot \frac{1}{2}(y)^{-\frac{1}{2}}y' + y' = 1$$

$$\frac{1}{y^{\frac{1}{2}}} \cdot y' + y' = 1$$

$$y' \left(\frac{1}{\sqrt{y}} + 1 \right) = 1$$

$$\therefore y' = \frac{1}{\sqrt{y} + 1}$$

$$y' = \frac{\sqrt{y}}{1 + \sqrt{y}}$$

$$y' = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

وبالتعويض بـ (3, 1)

$\frac{1}{2}$. ميل المماس

حاول أن تحل

7 للمنحنى الذي معادلته: $y^2 + \sqrt{y} + x^2 = 3$ ثم أوجد y' في ذلك المنحنى عند النقطة (1, 1).

مثال (8)

إذا كانت $yy'' + (y')^2 = 0$ فأثبت أن: $y = \sqrt{1 - 2x}$

الحل:

لتكن $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = 1 - 2x$ حيث $y = (g \circ h)(x)$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} , \quad h'(x) = -2 , \quad g'(h(x)) = \frac{1}{2\sqrt{1-2x}}$$

$$y' = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{1-2x}} \times (-2)$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1-2x}}$$

$$y'' = \frac{0 \times \sqrt{1-2x} - (-1) \times \frac{-1}{\sqrt{1-2x}}}{(\sqrt{1-2x})^2}$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$y'' = \frac{\frac{-1}{\sqrt{1-2x}}}{(\sqrt{1-2x})^2}$$

$$= \frac{-1}{(1-2x)\sqrt{1-2x}}$$

$$yy'' + (y')^2 = \sqrt{1-2x} \times \frac{-1}{(1-2x)\sqrt{1-2x}} + \left(\frac{-1}{\sqrt{1-2x}} \right)^2$$

$$= \frac{-1}{1-2x} + \frac{1}{1-2x} = 0$$

حاول أن تحل

إذا كانت $y = x \sin x$ فأثبت أن: 8

$y''' + y' + 2 \sin x = 0$

مثال (9)

$$(1+x^2) f'''(x) + 6x f''(x) + 6 f'(x) = 0 \quad \text{أثبت أن:}$$

$$\text{لتكن } f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

الحل:

نوجد أولاً:

$$f'(x), f''(x), f'''(x)$$

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

$$f''(x) = \frac{(1+x^2)^2(-2) - (-2x)(2)(1+x^2)(2x)}{(1+x^2)^4}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(1+x^2)(6x^2-2)}{(1+x^2)^4} \\ &= \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

بسط

$$f'''(x) = \frac{(1+x^2)^3(12x) - (6x^2-2)(3)(1+x^2)^2(2x)}{(1+x^2)^6}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(1+x^2)^2(-24x^3+24x)}{(1+x^2)^6} \\ &= \frac{-24x^3+24x}{(1+x^2)^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(1+x^2) f'''(x) + 6x f''(x) + 6 f'(x) \\ &= \frac{-24x^3+24x}{(1+x^2)^3} + \frac{36x^3-12x}{(1+x^2)^3} + \frac{-12x^3-12x}{(1+x^2)^3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

حاول أن تحل

$$f'''(x) = \frac{3!}{(1-x)^4} \quad \text{فأثبت أن:}$$

$$\text{لتكن } f(x) = \frac{1}{1-x} \quad 9$$

المرشد لحل المسائل

يتحرّك جسيم ويحدّد موقعه عند اللحظة $t \geq 0$ بالدالة: $s(t) = 0.6t^3 - 1.5t - 0.9$ حيث s تفاس بالمتر (m) و t بالثواني (s).

- a** أوجد مسافة انتقال الجسم في أول 5 s
- b** أوجد السرعة المتوسطة خلال 5 s
- c** أوجد السرعة اللحظية المتوجهة عند اللحظة $t = 5$

الحل:

كيف فكر أحمد لحل هذه المسألة:

a $s(5)$

$$s(5) = 0.6(5)^3 - 1.5(5) - 0.9 = 66.6 \text{ m}$$

المسافة التي انتقلها الجسم هي 66.6 m خلال 5 s

b لإيجاد السرعة المتوسطة خلال 5 s

$$\frac{s(5) - s(0)}{5 - 0} = \frac{66.6 + 0.9}{5} = 13.5 \text{ m/s}$$

c نوجد دالة السرعة وهي مشتقة دالة الحركة:

$$s'(t) = \frac{ds}{dt} = 1.8t^2 - 1.5$$

من ثم نحسب $s'(5)$:


$$s'(5) = 1.8(5)^2 - 1.5 = 43.5 \text{ m/s}$$

مسألة إضافية

موقع جسم يتحرّك ميّن في الدالة: $s(t) = 9t^3 - 7t + 3$ وذلك بعد t ثانية حيث $t \geq 0$.

- a** أوجد المسافة التي قطعها الجسم بعد 3 s.
- b** أوجد الدالة التي تدل على سرعة الجسم بالنسبة إلى الزمن عند اللحظة t .
- c** أوجد السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية المتوجهة عند $t = 3$.

مخطط تنظيمي للوحدة الثانية



ملخص

- يُعرف متوسط معدل التغير للدالة f على فترة مغلقة $[a, b]$ بالقاعدة $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- السرعة المتوسطة بين مدتَين من الزمن هي معدل التغير على هذه الفترة.
- السرعة اللحظية هي السرعة التي تعطى خلال لحظة من الزمن وتعطى بالقاعدة:

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

حيث t هي اللحظة من الزمن لإيجاد السرعة اللحظية.

- معدل التغير للدالة f عند النقطة $P(a, f(a))$ إن وجد هو:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

- ميل المماس لمنحنى عند نقطة محددة يعطى بالقاعدة: $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ حيث إن a هي الإحداثي السيني للنقطة على منحنى الدالة f حيث إن y_0 ، x_0 هما إحداثياً النقطة على المنحنى، m هي ميل المماس.
- معادلة الناظم على المماس عند نقطة على منحنى تعطى بالقاعدة: $y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)}(x - a)$
- مشتقة الدالة f عند نقطة إحداثها السيني a تعطى بالقاعدة:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{أو} \quad f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

- نحصل على رُكن عندما تكون المشتقات من جهة اليمين ومن جهة اليسار عند التقائه الشعاعين غير متساوٍ.
- نحصل على ناب عندما يكون ميل المماس لمنحنى عند نقطة تقاطع محدودة يقترب من ∞ في إحدى الجهات ويقترب من $-\infty$ في الجهة الثانية ويوجد مماس رأسٍ عندها.
- نحصل على مماس رأسٍ عندما يكون المماس لمنحنى عند نقطة رأسٍ.

• إذا كانت الدالة f لها مشتقة عند نقطة ، فإنها تكون متصلة عند هذه النقطة.

- معكوس النظرية ليس صحيحًا دائمًا، الدالة المتصلة قد يكون لها رُكن أو ناب أو مماس عمودي ومن ثم لا تكون قابلة للاشتاقع عند نقطة معينة.

• إذا كان $c = f(x)$ فإن: $f'(x) = 0$ حيث c قيمة ثابتة.

• إذا كانت $x = f(x)$ فإن: $f'(x) = 1$

• إذا كان $x^n = f(x)$ فإن: $f'(x) = nx^{n-1}$ حيث n عدد صحيح موجب أو سالب.

$$(kf(x))' = k f'(x) \quad \bullet$$

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x) \quad \bullet$$

$$(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x) \quad \bullet$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \quad \bullet$$

• إذا كان $f'(x) = \cos x$ فإن $f(x) = \sin x$

• إذا كان $f'(x) = -\sin x$ فإن $f(x) = \cos x$

• إذا كان $f'(x) = \sec^2 x$ فإن $f(x) = \tan x$

• إذا كان $f'(x) = -\csc^2 x$ فإن $f(x) = \cot x$

• إذا كان $f'(x) = \sec x \cdot \tan x$ فإن $f(x) = \sec x$

• إذا كان $f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$ فإن $f(x) = \csc x$

• إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند (x) ، الدالة g قابلة للاشتقاق عند x ، فإن الدالة المركبة

$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ تكون قابلة للاشتقاق عند x ، ويكون: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

• إذا $y = f(u)$ حيث إن $u = g(x)$ فإن: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

• هي مشتقات الدالة y من الرتب العليا إذا وجدت في مجال تعريفها.

• في الاشتقاق الضمني نوجد مشتقة المتغير المستقل x ومشتقة المتغير التابع y ثم نوجد $\frac{dy}{dx}$.

الوحدة الثالثة

تطبيقات على الاشتتقاق

Applications on Differentiation

مشروع الوحدة:

1 مقدمة المشروع: فرضاً أنه لا يوجد مكان مخصص في إحدى السيارات لوضع كوب يحتوي على القهوة، وسوف يوضع بجانب مقعد السائق أثناء القيادة. أظهرت التجربة أن الكوب قابل للانسكاب عندما يكون مليئاً بالكامل. ويصبح أكثر ثباتاً كلما تناقصت منه القهوة.


2 الهدف: تحديد أقصى ارتفاع لكمية القهوة كي لا تسكب من الكوب أثناء قيادة السيارة.

3 اللوازم: ورق رسم بياني - آلة حاسبة علمية - حاسوب - جهاز إسقاط.

4 أسئلة حول التطبيق:

يبين الرسم المقابل أن جزءاً من الكوب يحتوي على القهوة. سوف نفترض أن الكوب يكون أكثر ثباتاً عندما تكون نقطة الارتكاز المشتركة للكوب وكمية القهوة هي في أدنى ارتفاع. نقطة ارتكاز المجسم الأسطواني هي نقطة المركزية الهندسية حيث إن إحداثها الصادي \bar{y} يمكن أن يعطى بالقاعدة:

$$\bar{y} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$



إذا علمت أن: $B = \frac{R}{2}$ (كتلة قاعدة الكوب) ، $y_1 = -\frac{B}{2}$ (إحداثي الصادي لنقطة ارتكاز القاعدة).

$m_1 = \pi \delta (R+T)^2 B$ (كتلة جوانب الكوب) ، $m_2 = \pi \delta (R+T)^2 H - \pi \delta R^2 H$ (كتلة القهوة في الكوب) ، $m_3 = \pi \delta R^2 y$ (إحداثي الصادي لنقطة ارتكاز القهوة).

احسب قيم m_1 ، m_2 ، m_3 حيث δ كثافة مشتركة للقهوة والمادة المصنوع منها الكوب). **a**

ارتفاع مستوى القهوة في الكوب (cm)	$= y$
ارتفاع الكوب (cm)	$= H$
سماكه القاعدة (cm)	$= B$
نصف قطر الدائرة الداخلية من الكوب (cm)	$= R$
سماكه الجوانب (cm)	$= T$
نصف قطر الدائرة الخارجية من الكوب (cm)	$= R + T$

أوجد \bar{y} بدلالة B و y و H و T و **b**

إذا كان: $H = 8 \text{ cm}$ ، $R = 3 \text{ cm}$ ، $T = 0.5 \text{ cm}$ ، $B = 1 \text{ cm}$ **c**

$$f(y) = \bar{y} = \frac{21.75 + y^2}{8.5 + 2y} ; 0 \leq y \leq 8$$

$$f'(y) = \frac{2y^2 + 17y - 43.5}{(2y + 8.5)^2} \quad \text{أثبت أن مشتقّة } f(y) \text{ هي:} \quad \text{d}$$

ما القيمة المحلية الصغرى؟ **5**

التقرير: اكتب تقريراً يبيّن نتائج بحثك. أشر إلى كيفية الاستفادة من مفاهيم التفاضل في عملك. **6**

دع عم التقرير بالرسوم البيانية وبعرض على جهاز الإسقاط. طبق ما توصلت إليه على كوبك المفضل في احتساء القهوة.

دروس الوحدة

تطبيقات على القيم القصوى	رسم بيان دوال كثيرات الحدود	ربط المشتقّة الأولى f' والمشتقّة الثانية f'' بمنحنى الدالة f	تضليل وتناقض الدوال	القيم القصوى (العظمى/الصغرى) للدوال
3-5	3-4	3-3	3-2	3-1

الوحدة الثالثة


أين أنت الآن؟ (المعارف السابقة المكتسبة)

أضف إلى معلوماتك

«إذا كنت أجرؤ القول فإن مسألة تحديد خط المماس هي المسألة الأكثر فائدة وبالعموم هي أكثر ما أود معرفته».

ديكارت (1596 – 1650)

أدت الأبحاث التي قام بها العلماء في القرن السابع عشر في مختلف المجالات: علم الميكانيك والفلك والبصريات، إلى طرح مسائل المماس وحلها. منها: تحديد خط المماس في نقطة معينة، وتحديد النقطة على المنحني حيث المماس مواز لمستقيم معين. للشكل أدناه محور تناول. طور ديكارت طريقة تسمح بتحديد النقاط حيث المماس مواز لهذا المحور.



- تعرفت الدالة التربيعية: القيمة الصغرى والقيمة العظمى.
- تعرفت الرسوم البيانية لبعض الدوال الأسيّة واللوغاريتميّة.
- مثلت النمو الأسيّ والتضاؤل الأسيّ.
- تعرفت الرسوم البيانية للدوال المثلثيّة.
- تعرفت الاشتتقاق وقوانينه.

ماذا سوف تتعلم؟

- إيجاد القيم القصوى المطلقة والقيم القصوى المحلية.
- تطبيق نظرية القيمة المتوسطة.
- تحديد تزايد وتناقص الدوال.
- اختبار المشتقة الأولى للقيم القصوى المحلية.
- تحديد تغير منحنى الدالة.
- تحديد نقاط الانعطف.
- اختبار المشتقة الثانية للقيم القصوى المحلية.
- رسم بيان دوال كثیرات الحدود.
- تطبيقات على القيم القصوى.

المصطلحات الأساسية


قيم قصوى مطلقة – قيمة عظمى مطلقة – قيمة صغرى مطلقة – نقطة طرفية – نقطة داخلية – قيمة قصوى محلية – نقطة حرجة – نظرية القيمة المتوسطة – الدوال المتزايدة – الدوال المتناقصة – الدالة المطرّدة – اختبار المشتقة الأولى – التغير – نقاط الانعطف – اختبار المشتقة الثانية – كثیرات الحدود.

القيم القصوى (العظمى / الصغرى) للدوال

Extreme Values of Functions

دعنا نفكّر ونتناقش

في الشكل المقابل $AM = x$ ، $M \in \overline{AB}$ ، $AB = 6 \text{ cm}$ مربعان فيهما $AMNP$; $MBQR$ نريد معرفة موقع M بحيث يكون مجموع مساحتي المربعين أصغر ما يمكن.



١ أوجد مساحة كل من المربعين.

٢ ماذا تمثل $S(x) = 2x^2 - 12x + 36$ ؟

٣ أكمل الجدول:

x	0	1	2	3	4	5	6
$S(x)$							

٤ لأي قيمة للمتغير x في الجدول تكون قيمة $S(x)$ الأصغر؟

٥ أثبت أن $S(x) - S(3) \geq 0$ لـ كل قيمة x على الفترة $(0, 6)$.

٦ استنتج موقع M .

Extreme Values

القيم القصوى

الشكل (1) يمثل بيان الدالة S من «دعنا نفكّر ونتناقش». ويوضح أن للدالة S قيمة صغرى عند $x = 3$ وتسماى أيضًا قيمة قصوى وفي هذه الحالة $S(x) \geq S(3)$ لكل x تنتمى إلى مجال S . في هذا الدرس ستتعرف على القيم القصوى والتي يمكن أن تكون القيمة الأصغر أو القيمة الأكبر للدالة مستعينين بدراسة إشارة مشتقة الدالة.



شكل (2)

تعريف (1): القيم القصوى المطلقة


إذا كانت f دالة مجالها D ، $c \in D$ ، فإن $f(c)$ تسمى:

١) قيمة عظمى مطلقة للدالة f على D عندما:

$$f(c) \geq f(x) , \quad \forall x \in D_f$$

٢) قيمة صغرى مطلقة للدالة f على D عندما:

$$f(c) \leq f(x) , \quad \forall x \in D_f$$



شكل (1)
بيان الدالة S

- القيم العظمى المطلقة والقيم الصغرى المطلقة تسمى **القيم القصوى المطلقة**.
- تسمى القيم القصوى المطلقة **بالقيم القصوى** أي أنها تكتفى بالقول قيمة عظمى أو قيمة صغرى. قد يكون للدالة قيم قصوى مختلفة وذلك بحسب مجالها.

مثال (1)

لتكن الدالة: $f(x) = x^2$ ، أوجد إن أمكن القيم القصوى للدالة f مع رسم بيانها عندما:

a) $D = (-\infty, \infty)$

b) $D = (0, 2]$


c) $D = [0, 2]$

d) $D = (0, 2)$

الحل:

القيمة القصوى المطلقة للدالة f على D	المجال	بيان الدالة: $f(x) = x^2$	a
لا توجد قيمة عظمى مطلقة.	$(-\infty, \infty)$	$y = x^2$ 	
توجد قيمة صغرى مطلقة تساوي 0 عند $x = 0$.	$(0, 2]$	$y = x^2$ 	b
توجد قيمة عظمى مطلقة تساوي 4 عند $x = 2$. لا توجد قيمة صغرى مطلقة.	$[0, 2]$	$y = x^2$ 	c
لا توجد قيمة صغرى مطلقة.	$(0, 2)$	$y = x^2$ 	d

حاول أن تحل



الشكل يمثل بيان $3 + x^2 - 4x = y$. أوجد القيم القصوى للدالة على المجالات التالية:

- a** $(-\infty, \infty)$ **b** $[2, 3]$ **c** $(1, 3)$ **d** $[3, 4)$

يتضح مما سبق أن الدالة قد لا تكون لها قيمة عظمى أو قيمة صغرى. وهذا لا يحدث مع الدوال المتصلة على فترات مغلقة.

نظريّة (1): نظرية القيمة القصوى


إذا كانت f دالة متصلة على فترة مغلقة $[a, b]$ فإن f تكون لها قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة على هذه الفترة.

ملاحظة: لتكن الدالة f معرفة على $[a, b]$ ، $c \in (a, b)$ فإننا نسمى:

$(a, f(a))$ ، $(b, f(b))$ **نقطات طرفية.** **1**

$(c, f(c))$ **نقطة داخلية.** **2**

الأشكال التالية تمثل بعض الحالات لقيم عظمى وقيم صغرى لدوال متصلة على فترات مغلقة $[a, b]$:




شكل (3)

للدالة قيمة عظمى $f(x_1)$ عند $x = x_1$

وللدالة قيمة صغرى $f(x_2)$ عند $x = x_2$

وهذه القيم عند نقاط طرفية




شكل (4)

للدالة قيمة عظمى $f(a)$ عند $x = a$

وللدالة قيمة صغرى $f(b)$ عند $x = b$

وهذه القيم عند نقاط طرفية




شكل (5)

للدالة قيمة عظمى $f(x_1)$ عند $x = x_1$

وللدالة قيمة صغرى $f(a)$ عند $x = a$

القيمة العظمى عند نقطة داخلية

والقيمة الصغرى عند نقطة طرفية.



شكل (6)

للدالة قيمة عظمى $f(b)$ عند $x = b$

وللدالة قيمة صغرى $f(x_1)$ عند $x = x_1$


القيمة العظمى عند نقطة طرفية

والقيمة الصغرى عند نقطة داخلية.

تعريف (2): القيم القصوى المحلية

لتكن $(c, f(c))$ نقطة داخلية للدالة f ، فتره مفتوحة تحوي c ، تكون

- $f(c) \geq f(x)$ ، $\forall x \in D$ قيمة عظمى محلية عند c عندما: a
- $f(c) \leq f(x)$ ، $\forall x \in D$ قيمة صغرى محلية عند c عندما: b



معلومة:

الدالة الشائعة على الفتره $[a, b]$ لها قيمة قصوى مطلقة واحدة فقط.
أي أن القيمة العظمى تساوي القيمة الصغرى.

يبين الشكل (7) رسمًا بيانيًا له أربع نقاط حيث الدالة **قيم قصوى** على مجالها $[a, b]$. تقع **القيمة الصغرى المطلقة** للدالة عند a وهي $f(a)$ ، في حين أن **قيمة الدالة** عند e أصغر من أي قيمة قريبة منها سواء من جهة اليمين أو اليسار ولذلك تسمى **قيمة صغرى محلية**. يرتفع المنحنى ناحية اليسار وينخفض ناحية اليمين حول النقطة c ، محدثاً **قيمة عظمى محلية** قدرها $f(c)$ في حين أن الدالة لها **قيمة عظمى مطلقة** عند d .

نقاط المجال الداخلية التي تكون المشتقه عندها تساوي الصفر أو المشتقه عندها ليست موجودة. سنطلق عليها تسمية خاصة كما في التعريف التالي:

Critical Point

تعريف (3): النقطة الحرجة

النقطة الداخلية للدالة f ($c, f(c)$) تسمى **نقطة حرجة** عندما $f'(c) = 0$ أو $f'(c)$ غير موجودة.

ملاحظة: يسمى العدد c العدد الحرج.

مثال (2)

أوجد النقاط الحرجة لكل من الدوال المتصلة التالية:

a $g(x) = x^3 - 3x^2 + 5$

b $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 1 \\ 3x - 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$

تذكرة:

تكون $f'(c)$ غير موجودة إذا كان للدالة f عند c ركن أو ناب أو مماس رأسى.

الحل:

a دالة كثيرة حدود متصلة على \mathbb{R} وقابلة للاشتغال على \mathbb{R} .

$$g'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$g'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$3x^2 - 6x = 0$$

$$3x(x - 2) = 0$$

$$x = 0, \quad x = 2$$

$$g(0) = 5, \quad g(2) = (2)^3 - 3(2)^2 + 5 = 1$$

\therefore النقطتان $(1, 5)$, $(2, 1)$ نقطتان حرجةتان للدالة g على مجالها

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & : x < 1 \\ \text{بحث} & : x = 1 \\ 3 & : x > 1 \end{cases}$$

b

$$f(1) = 3(1) - 1 = 2$$

نبحث الاشتغال عند $x = 1$

إن وجدت

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 + 1 - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 + 2h + h^2 + 1 - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\cancel{h}(2+\cancel{h})}{\cancel{h}_1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} (2+h) = 2$$

$$\therefore f'_-(1) = 2$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

إن وجدت

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3(1+h) - 1 - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3 + 3h - 3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{3}\cancel{h}}{\cancel{h}_1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} 3 = 3$$

$$\therefore f'_+(1) = 3$$

$$\therefore f'_-(1) \neq f'_+(1)$$

$f'(1)$ ليست موجودة.

∴ النقطة $(1, 2)$ نقطة حرجة.

$$f'(x) = 3 \quad , \quad x > 1$$

$$\therefore \forall x \in (1, \infty) \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

∴ لا توجد نقاط حرجة على هذه الفترة.

$$f'(x) = 2x \quad : \quad x < 1$$

$$2x = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \in (-\infty, 1)$$

للهالة نقطة حرجة عند $x = 0$

$$f(0) = (0)^2 + 1 = 1$$

∴ النقطة $(0, 1)$ نقطة حرجة.

حاول أن تحل

أوجد النقاط الحرجة لكل من الدوال المتصلة التالية:

a) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 10$

b) $f(x) = |x - 5|$

تذكرة:

إذا كانت الدالة f لها مشتقة عند نقطة فإنها تكون متصلة عند هذه النقطة.

وبالعودة إلى الشكل (7) السابق نجد أن النقاط الحرجة تكون عند $x = c$, $x = e$ لأن المشتقة عند كل منهما تساوي الصفر (لماذا؟) وكذلك توجد نقطة حرجة عند $x = d$ لأن المشتقة عندها ليست موجودة (لماذا؟)

نظرية (2): القيم القصوى المحلية (Fermat's Theorem)

إذا كانت للدالة f قيمة قصوى (عظمى أو صغرى) محلية عند c فإن $(c, f(c))$ نقطة حرجة.

إذا كانت $(c, f(c))$ نقطة حرجة للدالة f فليس بالضرورة أن تكون $(c, f(c))$ قيمة قصوى محلية

فمثلاً الدالة $f(x) = x^3$ لها نقطة حرجة عند $x = 0$ ولكن $f(0)$ ليست قيمة قصوى محلية.

خطوات إيجاد القيم القصوى المطلقة للدالة f المتصلة على الفترة $[a, b]$

تعلمت كيفية إيجاد النقاط القصوى المطلقة للدالة f من خلال التمثيل البياني لها وتطبيق تعريف (1) عليها.

والآن سنعرض خطوات إيجادها جبرياً على $[a, b]$:

1 إيجاد قيم الدالة عند النقاط الطرفية: $x = a$, $x = b$

2 إيجاد النقاط الحرجة للدالة f في الفترة (a, b) إن وجدت.

3 أكبر قيمة للدالة في الخطوتين 1, 2 هي قيمة عظمى مطلقة في $[a, b]$ وأصغر قيمة للدالة هي قيمة صغرى مطلقة في $[a, b]$.

مثال (3)

أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة المتصلة f : $f(x) = x^3 - 3x + 1$ في الفترة $[0, 3]$.
الحل:

..
..
 \therefore الدالة f لها قيمة عظمى مطلقة ولها قيمة صغرى مطلقة في الفترة $[0, 3]$.
نوجد قيم الدالة عند النقاط الطرفية $x = 0$ ، $x = 3$

$$f(0) = (0)^3 - 3(0) + 1 = 1$$

$$f(3) = (3)^3 - 3(3) + 1 = 19$$

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3$$

$$x^2 = 1$$

$$\therefore x = 1 , \quad 1 \in (0, 3)$$

$$x = -1 , \quad -1 \notin (0, 3)$$

$$f(1) = (1)^3 - 3(1) + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

$\therefore (-1, -1)$ نقطة حرجة.

x	0	1	3
$f(x)$	1	-1	19

من الجدول:

أكبر قيمة للدالة f في الفترة $[0, 3]$ هي 19

\therefore 19 قيمة عظمى مطلقة.

أصغر قيمة للدالة f في الفترة $[0, 3]$ هي -1

\therefore -1 قيمة صغرى مطلقة.

حاول أن تحل

3 أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة f : $f(x) = x^3 - 3x + 1$ في الفترة $[-2, 1]$.

مثال (4)

أوجد القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة المتصلة f في الفترة $[-2, 3]$: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

الحل:

.. f متصلة على $[-2, 3]$.

.. f لها قيمة عظمى مطلقة ولها قيمة صغرى مطلقة على الفترة $[-2, 3]$.

نوجد قيم الدالة عند $x = -2$ ، $x = 3$

$$f(-2) = (-2)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(-2)^2} = \sqrt[3]{4}$$

≈ 1.587

$$f(3) = 3^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{9}$$

≈ 2.08

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

لاحظ أن $f'(x) \neq 0$ ولكن

عند $x = 0$ المشتقة ليست موجودة،

.. $(0, 0)$ نقطة حرجة.

x	-2	0	3
$f(x)$	1.587	0	2.08

من الجدول:

أكبر قيمة للدالة f في الفترة $[-2, 3]$ هي $3^{\frac{2}{3}}$


.. $3^{\frac{2}{3}}$ قيمة عظمى مطلقة.

أصغر قيمة للدالة f في الفترة $[-2, 3]$ هي 0

.. 0 قيمة صغرى مطلقة.

حاول أن تحل

4 أوجد القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ في الفترة $[1, 3]$



الشكل (8) يوضح التمثيل البياني للدالة f في مثال (4).

نلاحظ أن:

f لها قيمة عظمى مطلقة 2.08 تقريرًا عند $x = 3$

ولها قيمة صغرى مطلقة هي صفر عند $x = 0$

شكل (8)

مثال (5)

لتكن $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$ ، $a, b \in \mathbb{R}$:
 و كان للدالة قيمة قصوى محلية عند كل من:

أوجد قيمة كل من الثابتين a, b

الحل: ∵ f دالة كثيرة حدود

$\therefore f$ متصلة وقابلة للاشتباك على \mathbb{R}

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

∴ للدالة قيم قصوى محلية عند $x = 1$ ، $x = \frac{1}{3}$

∴ توجد نقاط حرجة للدالة عندهما وبالتالي:

$$f'(1) = 0 , f'\left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

نحصل على المعادلين الآتيين:

$$\begin{cases} 3(1)^2 + 2a(1) + b = 0 \\ 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2a\left(\frac{1}{3}\right) + b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a + b = -3 \\ \frac{2}{3}a + b = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$a = -2 , b = 1$$

استخدم الآلة الحاسبة

العلمية لإيجاد الحل

حاول أن تحل

لتكن $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 1$ ، $a, b \in \mathbb{R}$: 5

و كان للدالة قيمة قصوى محلية عند كل من:

أوجد قيمة كل من الثابتين a, b

الربط بالเทคโนโลยيا:

خطوات الحل المستخدمة
لحل معادلين آيتين
بمتغيرين بالحاسبة.

اضغط المفتاح

يظهر على الشاشة

8 خيارات لبرامج مستخدمة،

اختر البرنامج: 5:EQN

فيظهر على الشاشة 4 صيغ

لمعادلات:

اختر الصيغة:

1: $a_n x + b_n y = c_n$

فيظهر على الشاشة

المصفوفة:

$$\begin{matrix} 1 & a & \square & b & \square & c & \square \\ 2 & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{matrix}$$

اكتب كلاً من المعادلين
على الشكل التالي:

$ax + by = c$

اما المربعات في السطر

الأول بمعامل x يليه = ثم

معامل y يليه = ثم قيمة

يليه = .

كرر العملية في السطر الثاني.

اضغط الآن على المفتاح

$x =$

(المجهول الأول)

اضغط ثانية على المفتاح

$y =$

(المجهول الثاني)



ملاحظة:

يمكنك كذلك حل
المعادلين الآيتين
باستخدام طريقة الحذف
أو طريقة التعويض.


تزايد وتناقص الدوال

Increasing and Decreasing Functions

دعنا نفكّر ونناقش

إذا كانت $f(x) = x^2 - 1$ فأجب عما يلي:

- 1 ارسم المستقيم المار بالنقطتين $A(-1, f(-1))$, $B(2, f(2))$.
- 2 هل الدالة f متصلة على $[-1, 2]$ ؟
- 3 وهل f قابلة للاشتراق على الفترة $(-1, 2)$ ؟
- 4 أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = \frac{1}{2}$ (لاحظ أن $\frac{1}{2} \in (-1, 2)$)
- 5 استنتج العلاقة بين 1, 3.



دعاً نفكّر ونناقش

- 1 ارسم المستقيم المار بالنقطتين $A(-1, f(-1))$, $B(2, f(2))$.
- 2 هل الدالة f متصلة على $[-1, 2]$ ؟
- 3 وهل f قابلة للاشتراق على الفترة $(-1, 2)$ ؟
- 4 أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = \frac{1}{2}$ (لاحظ أن $\frac{1}{2} \in (-1, 2)$)
- 5 استنتاج العلاقة بين 1, 3.

سوق تعلم

- نظرية القيمة المتوسطة.
- تزايد وتناقص الدوال.
- الدوال المطردة.
- الدالة الثابتة.

المفردات والمصطلحات

- نظرية القيمة المتوسطة

Mean Value Theorem

- الدوال المتزايدة

Increasing Functions

- الدوال المتناقصة

Decreasing Functions

- الدالة المطردة

Monotonic Function

معلومات:

إن تسارع سيارة من سكون

لقطع مسافة 120 m

يستغرق 8 s يبلغ معدل

سرعة السيارة خلال هذه

الفترة الزمنية

$$\frac{120}{8} = 15 \text{ m/s}$$

أي 54 km/h

تفيد نظرية القيمة المتوسطة

أنه خلال انطلاق السيارة وفي

نقطة ما محددة على المسار

يجب أن يشير عداد السرعة

إلى 54 km/h


Mean Value Theorem

ترتبط نظرية القيمة المتوسطة بين متوسط معدل تغير دالة على فترة ما، ومعدل التغيير للدالة عند نقطة تتبع إلى هذه الفترة.

تكمّن نتائجها القوية في صميم بعض التطبيقات الكثيرة الأهمية في علم حساب التفاضل والتكامل.

تقول النظرية إنّه في مكان ما بين نقطتين A , B على منحنى دالة قابلة للاشتراق، يوجد على الأقل خط مماس واحد يوازي قاطع المنحنى \overrightarrow{AB} (كما في الشكل (1)).

$$m(\overrightarrow{AB}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



شكل (1)

نظرية القيمة المتوسطة

إذا كانت f دالة:


- 1 متصلة على الفترة $[a, b]$

- 2 قابلة للاشتراق على الفترة (a, b)

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{حيث } c \in (a, b)$$



شروط نظرية القيمة المتوسطة كافية ولنست لازمة، أي أنه إذا توفرت الشروط فبالتأكيد يوجد c الذي تنبئ به النظرية وعدم تحقق أحد الشرطين لا يعني بالضرورة عدم وجود c والملاحظات التالية توضح ذلك.



شكل (2)

ملاحظات:


1 إذا لم يتحقق أحد شرطى النظرية (3) فإنه قد لا يكون لبيان الدالة مماسٌ موازٍ للقاطع \overleftrightarrow{AB} .

فمثلاً، $f(x) = |x|$ دالة متصلة على الفترة $[-1, 1]$ وقابلة للاشتقاق عند كل x تنتهي إلى $(-1, 1)$ باستثناء عند $x = 0$.


بيان الدالة ليس له مماسٌ يوازي \overleftrightarrow{AB} (شكل 2).

2 يبيّن شكل (3) بيان دالة f قابلة للاشتقاق عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ومتصلة على الفترة $[a, b]$.

ولكن لا يوجد مماسٌ يوازي \overleftrightarrow{AB} .




شكل (3)




شكل (4)

3 بيان الدالة في الشكل (4) يبيّن نقطة انفصال وبالرغم من عدم توفر شرط من شروط نظرية القيمة المتوسطة إلا أنه يوجد مماسٌ للممنحنى عند c يوازي \overleftrightarrow{AB} .



شكل (5)

4 يمكن إيجاد أكثر من نقطة واحدة بحيث $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ، $c \in (a, b)$ أي أن المماس عند كل من النقاط $(c_1, f(c_1))$ ، $(c_2, f(c_2))$ يوازي \overleftrightarrow{AB} كما في الشكل (5).



شكل (6)

5 في نظرية القيمة المتوسطة إذا كان $f(a) = f(b)$ فإن $f'(c) = 0$ أي أن المماس للممنحنى عند c يوازي القاطع ويوازي محور السينات أي أن المماس أفقى كما في الشكل (6).

مثال (1)

بَيْنَ أَنَّ الدَّالَّةَ $f : f(x) = x^2$ تَحْقِّق شُرُوط نَظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة عَلَى الْفَتَرَةِ $[0, 2]$ ، ثُمَّ أُوجِدَ c الَّذِي تَبَيَّنَ بِهِ النَّظَرِيَّة وَفَسَّرَ إِجَابَتَك.

الحل:

الدَّالَّةُ $f : f(x) = x^2$ دَالَّةٌ كَثِيرَةٌ حَدُودٌ مُتَصَّلَّةٌ عَلَى \mathbb{R} فَهِيَ مُتَصَّلَّةٌ عَلَى الْفَتَرَةِ $[0, 2]$ ، وَقَابِلَةٌ لِلَاشْتِفَاقِ عَلَى $(0, 2)$.

∴ شُرُوط نَظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة مُحَقَّقةٌ عَلَى الْفَتَرَةِ $[0, 2]$.

∴ يُوجَدُ عَلَى الأَقْلَى $c \in (0, 2)$ بِحِيثَ:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{نظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة}$$

$$= \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$$

$$\therefore f(0) = (0)^2 = 0, \quad f(2) = 2^2 = 4$$

$$f'(x) = 2x, \quad f'(c) = 2c$$

$$\therefore 2c = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$$

$$2c = \frac{4 - 0}{2 - 0}$$

$$2c = 2$$

$$c = 1 \in (0, 2)$$

التفسير:

يُوجَدُ مَمَاسٌ لِمَنْحُنِيِّ الدَّالَّةِ f عِنْدَ $x = 1$ يُوازِي القاطِعَ الْمَارَ بِالنَّقْطَيْنِ $(0, 0)$ ، $(2, 4)$.

حاول أن تحل

1 بَيْنَ أَنَّ الدَّالَّةَ $f(x) = x^2 + 2x$ تَحْقِّق شُرُوط نَظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة عَلَى الْفَتَرَةِ $[-3, 1]$ ،

ثُمَّ أُوجِدَ قِيمَةُ c الَّذِي تَبَيَّنَ بِهِ النَّظَرِيَّة وَفَسَّرَ إِجَابَتَك.

مثال (2)

بَيْنَ أَنَّ الدَّالَّةَ $f : f(x) = x^3 + 1$ تَحْقِّق شُرُوط نَظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة عَلَى الْفَتَرَةِ $[-3, 3]$ ، ثُمَّ أُوجِدَ c الَّذِي تَبَيَّنَ بِهِ النَّظَرِيَّة وَفَسَّرَ إِجَابَتَك.

الحل:

الدَّالَّةُ f دَالَّةٌ كَثِيرَةٌ حَدُودٌ مُتَصَّلَّةٌ عَلَى \mathbb{R} فَهِيَ مُتَصَّلَّةٌ عَلَى الْفَتَرَةِ $[-3, 3]$ وَقَابِلَةٌ لِلَاشْتِفَاقِ عَلَى الْفَتَرَةِ $(-3, 3)$.

∴ شُرُوط نَظَرِيَّة القيمة المُتوسِّطة مُحَقَّقةٌ عَلَى الْفَتَرَةِ $[-3, 3]$.

∴ يُوجَدُ عَلَى الأَقْلَى $c \in (-3, 3)$ بِحِيثَ:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$= \frac{f(3) - f(-3)}{3 - (-3)}$$

$$\therefore f(-3) = (-3)^3 + 1 = -26, \quad f(3) = 3^3 + 1 = 28$$

$$f'(x) = 3x^2, \quad f'(c) = 3c^2$$

$$\therefore 3c^2 = \frac{f(3) - f(-3)}{3 - (-3)}$$

$$3c^2 = \frac{28 - (-26)}{3 + 3} = \frac{54}{6} = 9$$

$$c^2 = \frac{9}{3} = 3$$

$$c = \sqrt{3} \in (-3, 3), \quad c = -\sqrt{3} \in (-3, 3)$$

التفسير:

يوجد مماسان لمنحنى الدالة f عند:

(3, 28), (-3, -26) : والمماسان يوازيان القاطع المار بال نقطتين:

حاول أن تحل

2) يبين أن الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 2$ تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة $[0, 4]$, ثم أوجد c الذي تباع به النظرية وفسّر إجابتك.

Increasing and Decreasing Functions

ترابيد وتناقص الدوال

تعريف (4): ترابيد وتناقص الدوال

لتكن f دالة معروفة على الفترة I . نقول إن:


$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I$$

1) f دالة متزايدة على I إذا كان:

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I$$


2) f دالة متناقصة على I إذا كان:

ملاحظة: تكون الدالة f ثابتة على الفترة I عندما: $\forall x_1, x_2 \in I, f(x_1) = f(x_2)$




شكل (7)

دالة متزايدة



شكل (8)

دالة متناقصة



شكل (9)

دالة ثابتة

Monotonic Function

الدالة المطردة

الدالة التي تكون دائمًا متزايدة على فترة أو دائمًا متناقصة على فترة، يقال عنها إنّها دالة مطردة على هذه الفترة.

تمكّنا نظرية القيمة المتوسطة من تحديد أين تزايـد الدوال وأين تتناقص بالضبط. الدوال التي مشتقاتها موجبة تكون دوال متزايدة، والدوال التي مشتقاتها سالبة تكون دوال متناقصة. ويتبّع ذلك من خلال النظرية التالية:

نظرية (4): الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة والدوال الثابتة

لتكن f دالة قابلة للاشتغال على (a, b) .

- 1 إذا كانت $0 > f'(x)$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن f تزايـد على (a, b) .
- 2 إذا كانت $0 < f'(x)$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن f تتناقص على (a, b) .
- 3 إذا كانت $0 = f'(x)$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن الدالة f ثابتة على (a, b) .

مثال (3)

أوـجد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة f :

الحل:

الدالة f كثيرة حدود فهي متصلة على \mathbb{R}

نوجـد مشتقـة الدالة f :

$$f'(x) = 2x - 5$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نـصـع}$$

$$2x - 5 = 0 \implies x = \frac{5}{2}$$

نـكـون الجـدول لـدرـاسـة إـشارـة f'

الفترات	$(-\infty, \frac{5}{2})$	$(\frac{5}{2}, \infty)$
إـشارـة f'	--	++
سـلـوكـ الدـالـة f		

من الجـدول:

f مـتـناـقـصـة عـلـىـ الفـتـرـة $(-\infty, \frac{5}{2})$

f متـزاـيـدة عـلـىـ الفـتـرـة $(\frac{5}{2}, \infty)$

حاـولـ أنـ تـحلـ

أوـجد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة f :

مثال (4)

لتكن $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$:
حدّد الفترات حيث تكون f متزايدة والفترات حيث تكون f متناقصة.

الحل:

الدالة f كثيرة حدود فهي متصلة على \mathbb{R}
نوجد أولاً مشتقة الدالة:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$3x^2 - 6x - 9 = 0$$

$$3(x+1)(x-3) = 0$$

$$x = -1, \quad x = 3$$

نكون الجدول لدراسة إشارة f'


الفترات	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
إشارة f'	++	--	++
سلوك الدالة f	↗↗	↘↘	↗↗

من الجدول: الدالة f متزايدة على كل من الفترة $(-\infty, -1)$ والفترة $(3, \infty)$ ومتناقصة على الفترة $(-1, 3)$.

حاول أن تحل

إذا كانت f : $f(x) = x^3 - 6x$. حدد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة f . 4

الشكل (10) يمثل بيان الدالة f في مثال (4) السابق.



شكل (10)

بيان الدالة يوضح فترات التزايد وفترات التناقص.

مثال (5)

إذا كانت f الدالة: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.
حدّد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة.

الحل:

الدالة f حدودية نسبية فهي متصلة لكل x حيث $x \in \mathbb{R} - \{1\}$.
نوجد مشتقة الدالة

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x(x-1) - 1(x)^2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$\frac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0$$

$$\implies x = 0 , \quad x = 2$$


نكون الجدول لدراسة إشارة f'

الفترات	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
إشارة f'	+	-	-	+
سلوك الدالة f	↗	↘	↘	↗

من الجدول f متزايدة على كل من الفترة $(0, \infty)$ والفترة $(1, 2)$ ومتناقصة على كل من الفترة $(-\infty, 0)$ والفترة $(0, 1)$.

حاول أن تحل

5 حدد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة f :



نشاط

الشكل المقابل يوضح بيان الدالة f وبيان مشتقتها f'
أكمل ما يلي:

في الفترة $(-\infty, -1)$ الدالة f متزايدة ومنحنى الدالة f' يقع أعلى محور السينات أي
أن $f'(x)$ موجبة $\forall x \in (-\infty, -1)$

في الفترة $(-1, 1)$ الدالة f و منحنى الدالة f' يقع
أي أن


في الفترة $(1, \infty)$ الدالة f و منحنى الدالة f' يقع
أي أن

ربط المشتقه الأولى f' والمشتقه الثانيه f'' بمنحنى الدالة f

Connecting f' and f'' with the Graph of f

دعنا نفك ونناقش

انظر إلى بيان الدالة في الشكل أدناه، ثم ضع علامة (✓) لكل فقرة مناسبة في الجدول أدناه:



الفترة	تناقص في فترة	تزايد في فترة	قيمة عظمى محلية	قيمة صغرى محلية	قيمة عظمى مطلقة	قيمة صغرى مطلقة	الفترة (المجال)
							$[a, c_2]$
							$[c_1, c_3)$
							$[c_2, c_3)$
							$[c_3, c_5)$
							$[c_1, c_4]$
							$[c_5, b]$

نظرية (5): اختبار المشتقه الأولى للقيم القصوى المحلية

لتكن f دالة متصلة على مجالها وكانت $(c, f(c))$ نقطة حرجة.

- 1 إذا كانت إشارة المشتقه f' تتغير من الموجب إلى السالب عند $x = c$ ، فإن f يكون لها قيمة عظمى محلية عند c .
- 2 إذا تغيرت إشارة f' من السالب إلى الموجب عند $x = c$ ، فإن f يكون لها قيمة صغرى محلية عند c .
- 3 إذا لم تتغير إشارة f' عند $x = c$ ، فإن f لا يكون لها قيمة قصوى محلية عند c .

سوف تعلم

- اختبار المشتقه الأولى لتحديد القيم القصوى المحلية.
- تحديد تغير منحنى الدالة باستخدام المشتقه الثانية أو الرسم البياني.
- تحديد نقاط الانعطاف بدراسة المشتقه الثانية.
- اختبار المشتقه الثانية لتحديد القيم القصوى المحلية.

المفردات والمصطلحات

- قيمة قصوى محلية

Local Extrema

- اختبار المشتقه الأولى

First Derivative Test

- نقطة طرفية
- التغير
- نقاط الانعطاف

Points of Inflection


- اختبار المشتقه الثانية

Second Derivative Test

ملاحظة:

- $f' > 0$ يعني أن قيم $f'(x)$ موجبة لكل قيم x
- $f' < 0$ يعني أن قيم $f'(x)$ سالبة لكل قيم x

الأشكال التالية توضح بيان دالة f وتوضح نظرية (5) من خلالها.



شكل (1)

هنا نبين كيف نطبق اختبار المشتقة الأولى لإيجاد القيم القصوى المحلية لدالة f .
والأعداد الحرجة لدالة f تجزئ محور السينات إلى فترات تكون فيها f' موجبة أو سالبة. نحدد إشارة f' على كل فترة بإيجاد قيمة f' لقيمة واحدة x على الفترة، ثم نطبق نظرية (5) كما في المثالين (1) و(2) التاليين:

مثال (1)

لتكن الدالة f : $f(x) = x^3 - 12x - 5$

أوجد كلاً مما يلي:

a النقاط الحرجة للدالة.

b الفترات التي تكون الدالة f متزايدة أو متناقصة عليها.

c القيم القصوى المحلية.

الحل:

a $\therefore f$ دالة كثيرة حدود.

$\therefore f$ متصلة وقابلة للاشتباك عند كل $x \in \mathbb{R}$.

نوجد النقاط الحرجة فقط عند أصفار مشتقة الدالة f' .

$$f'(x) = 3x^2 - 12$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع:}$$

$$3x^2 - 12 = 0 \implies 3(x-2)(x+2) = 0$$

$$x = -2, \quad x = 2$$

$(-2, f(-2)) = (-2, 11)$. النقطة الحرجة هي:

$(2, f(2)) = (2, -21)$

b) نكون الجدول لدراسة إشارة f' :

الفترات	$(-\infty, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, \infty)$
إشارة f'	+++	---	+++
سلوك الدالة f	متزايدة	متناقصة	متزايدة

نلاحظ من الجدول: الدالة متزايدة على الفترة $(-2, \infty)$ والفترات $(-\infty, -2)$ ومتناقصة على الفترة $(-2, 2)$.

c) نستطيع أن نلاحظ من الجدول أنه توجد قيمة عظمى محلية عند $x = -2$ ، وقيمة صغرى محلية عند $x = 2$.

القيمة العظمى المحلية هي $f(-2) = 11$ ، والقيمة الصغرى المحلية هي $f(2) = -21$.

حاول أن تحل

1) لتكن الدالة f : $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$. أوجد كلاً مما يلي:

a) النقاط الحرجة للدالة.

b) الفترات التي تكون الدالة f متزايدة أو متناقصة عليها.

c) القيم القصوى المحلية.

مثال (2)

لتكن الدالة f : $f(x) = x - 3 + \frac{4}{x-1}$

فأوجد كلاً مما يلي:

a) النقاط الحرجة للدالة.

b) الفترات التي تكون عليها الدالة f متزايدة وتلك التي تكون عليها متناقصة.

c) القيم القصوى المحلية.

الحل:

a) f مجموع دالتين إحداهما كثيرة حدود والأخرى حدودية نسبية

.. \therefore مجال الدالة f هو $\mathbb{R} - \{1\}$

.. f متصلة وقابلة للاشتغال على كل من الفترتين من مجالها $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1 - \frac{4}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 4}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(x-1-2)(x-1+2)}{(x-1)^2} \\
 &= \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}
 \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0$$

نضع

$$\frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2} = 0$$

$$(x-3)(x+1) = 0$$

$$x = 3, \quad x = -1$$

$$(3, f(3)) = (3, 2)$$

\therefore النقاط الحرجة هي

$$(-1, f(-1)) = (-1, -6)$$

b : نكون الجدول لدراسة إشارة f'

الفترات	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	1	$(1, 3)$	$(3, \infty)$
إشارة f'	+++	---		---	+++
سلوك الدالة f	متزايدة ↗	متناقصة ↘	غير متناقصة	متناقصة ↘	متزايدة ↗

نلاحظ من الجدول أن الدالة متزايدة على كل من الفترتين $(-\infty, -1)$, $(3, \infty)$

ومتناقصة على كل من الفترتين $(-1, 1)$, $(1, 3)$

c : توجد قيمة عظمى محليّة عند $x = -1$ وقيمة صغرى محليّة عند $x = 3$

القيمة العظمى المحليّة هي: $f(-1) = -6$ والقيمة الصغرى المحليّة هي: $f(3) = 2$

حاول أن تحل

لتكن الدالة g : 2

أوجد كلاً مما يلي:

a : النقاط الحرجة.

b : الفترات التي تكون الدالة ممتزايدة أو متناقصة عليها.


c : القيم القصوى المحليّة.

التععر

يبين الشكل المقابل أن الدالة $f : f(x) = x^3$ تزداد مع تزايد قيم x ، ولكن جزئي المنحنى المعروفي على كل من الفترتين $(-\infty, 0)$ ، $(0, \infty)$ ينبعطان بشكل مختلف.

إذا أمعنا النظر في المنحنى والمماسات وتحصيناها بدقة من اليسار إلى اليمين نلاحظ أن المنحنى يقع أسفل المماسات على الفترة $(-\infty, 0)$. ويقع أعلى المماسات على الفترة $(0, \infty)$.

يمكنا القول إن منحنى الدالة f مقعر للأسفل على الفترة $(-\infty, 0)$. ومقعر للأعلى على الفترة $(0, \infty)$.




تعريف (5): التععر

إذا وقع منحنى الدالة أعلى جميع مماساته على فترة I فإنه يكون مقعرًا لأعلى على I .


وإذا وقع منحنى الدالة أسفل جميع مماساته على فترة I فإنه يكون مقعرًا للأسفل على I .

الشكلان التاليان يوضحان التععر :




شكل (2)

في الفترة (a, b) نلاحظ أن:
جميع نقاط المنحنى (ما عدا نقاط التماس)
تقع أسفل المماسات.
لذلك نقول المنحنى مقعر للأسفل.



شكل (1)

في الفترة (a, b) نلاحظ أن:
جميع نقاط المنحنى (ما عدا نقاط التماس)
تقع أعلى المماسات.
لذلك نقول المنحنى مقعر لأعلى.




اختبار التععر

a إذا كانت $I \subset \mathbb{R}$ فإن منحنى الدالة f مقعرًا لأعلى على I

b إذا كانت $I \subset \mathbb{R}$ فإن منحنى الدالة f مقعرًا للأسفل على I .

Point of Inflection



تعريف (6): نقطة الانعطاف

تسمى النقطة $(c, f(c))$ نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f إذا كانت f دالة متصلة عند c ، ومنحنى الدالة f يغير تعرّفه عند هذه النقطة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى.

إذا كانت $(c, f(c))$ نقطة انعطاف لبيان الدالة f فإن $f''(c) = 0$ أو $f''(c)$ غير موجودة.

مثال (3)

أوجد فترات التعرّف ونقطة الانعطاف لمنحنى الدالة f : $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$

الحل:

$\therefore f$ دالة كثيرة حدود
 $\therefore f$ قابلة للاشتقاق على \mathbb{R}

$$f'(x) = 6x^2 + 6x$$

$$f''(x) = 12x + 6$$

$$f''(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$12x + 6 = 0 \implies x = -\frac{1}{2}$$

نكون الجدول لدراسة إشارة f'' :

الفترات	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, \infty)$
إشارة f''	--	++
بيان الدالة f	↙	↗

نلاحظ من الجدول أنَّ: بيان الدالة f مقعر لأسفل على الفترة $(-\infty, -\frac{1}{2})$

بيان الدالة f مقعر لأعلى على الفترة $(-\frac{1}{2}, \infty)$


$$f(-\frac{1}{2}) = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{2}$$

لإيجاد نقطة الانعطاف:

النقطة $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ هي نقطة انعطاف لمنحنى f

حاول أن تحل

أوجد فترات التعمّر ونقطة الانعطاف لمنحنى الدالة f : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ (3)



نلاحظ في الشكل المقابل أن بيان الدالة f في مثال (3) مقعر للأسفل على الفترة $(-\infty, -\frac{1}{2})$ وأن النقطة $(-\frac{1}{2}, \infty)$ هي نقطة انعطاف.

لدراسة حركة جسم يتحرك على خط مستقيم غالباً ما تحتاج إلى وصف هذه الحركة من خلال دالة الموضع (الإزاحة) ومشتقتها (السرعة) ومشتقتها الثانية (العجلة) في أي لحظة على مساره.

مثال إثري

يتحرك جسم على خط مستقيم أفقى حيث دالة موقعه $s(t) = 2t^3 - 14t^2 + 22t - 5$ ، $t \geq 0$.
أوجد السرعة اللحظية للجسم وعجلته ثم صف حركته.

الحل:

$$s(t) = 2t^3 - 14t^2 + 22t - 5$$

$$\begin{aligned} v(t) &= s'(t) = 6t^2 - 28t + 22 \\ &= 2(t-1)(3t-11) \end{aligned}$$


السرعة اللحظية هي:

$$a(t) = v'(t) = s''(t)$$

$$= 12t - 28 = 4(3t - 7)$$


والعجلة هي:

عندما تزيد الدالة $s(t)$ يتحرك الجسم إلى اليمين، وعندما تتناقص $s(t)$ يتحرك الجسم إلى اليسار.
يبين الشكل أدناه الرسوم البيانية للموضع (المسافة) والسرعة اللحظية والعجلة للجسم.




$$s(t) = 2t^3 - 14t^2 + 22t - 5$$

$$t \geq 0$$



$$s'(t) = 6t^2 - 28t + 22$$



$$s''(t) = 12t - 28$$

لاحظ أن المشتقة الأولى ($v = s'$) تساوي 0 عند $t = \frac{11}{3}$

الفترات	$(0, 1)$	$(1, \frac{11}{3})$	$(\frac{11}{3}, \infty)$
$v = s'$	++	--	++
سلوك s	متزايدة ↗	متناقصة ↘	متزايدة ↗
حركة الجسم	يمين	يسار	يمين

يتحرك الجسم إلى اليمين على الفترة الزمنية $(1, \frac{11}{3})$ ، ويتحرك إلى اليسار على الفترة $(\frac{11}{3}, \infty)$

$$\text{العجلة: } a(t) = s''(t) = 12t - 28 = 4(3t - 7)$$

$$t = \frac{7}{3} \text{ عند}$$

الفترات	$(0, \frac{7}{3})$	$(\frac{7}{3}, \infty)$
$a = s''$	--	++
بيان الدالة s	↙	↗

اتجاه العجلة ناحية اليسار (العجلة سالبة) أثناء الفترة الزمنية $(0, \frac{7}{3})$ ، وتكون في لحظة تساوي صفرًا عند $t = \frac{7}{3}$ واتجاهها ناحية اليمين (العجلة موجة بعد ذلك).

تدريب إثري

يتحرك جسم معين على خط مستقيم أفقي حيث دالة موقعه: $f(t) = t^3 - 3t^2 + 5$; $t \geq 0$ أوجد السرعة اللحظية للجسم وعجلته، ثم صف حركته.

Second Derivative Test for Local Extrema

اختبار المشتقة الثانية للقيم القصوى المحلية

بدلاً من النظر إلى إشارة التغير في y' عند نقاط حرجة، يمكننا أن نستخدم أحياناً الاختبار الآتي لتحديد وجود قيم قصوى محلية.

نظرية (6): اختبار المشتقة الثانية للقيم القصوى المحلية

إذا كانت $0 < f''(c) < 0$ ، فإن f تكون لها قيمة عظمى محلية عند $x = c$ ①

إذا كانت $0 > f''(c) > 0$ ، فإن f تكون لها قيمة صغرى محلية عند $x = c$ ②

يتطلب منا هذا الاختبار أن نعرف f'' فقط عند العدد c نفسه وليس على فترة تشمل c . وهذا يجعل الاختبار سهلاً للتطبيق.

الاختبار لا يصلح (يفشل) إذا كانت $f''(c) = 0$ أو لا يكون لها وجود.

فمثلاً: الدالة $f : f(x) = x^4$ ، مشتقتها الأولى هي:

$$f'(x) = 4x^3$$

$$f'(x) = 0 \implies x = 0$$

$$f''(0) = 0$$

عندما يحدث ذلك نعود إلى اختبار المشتقّة الأولى للبحث عن القيم القصوى المحلّية.

في مثال (4) نطبق اختبار المشتقّة الثانية للدالة الموجودة في مثال (1).

مثال (4)

أوجد القيم القصوى المحلّية للدالة: $f(x) = x^3 - 12x - 5$

الحل:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 12 \\ &= 3(x^2 - 4) \\ &= 3(x - 2)(x + 2) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع:}$$

$$x = -2, \quad x = 2 \quad \text{ومنها}$$

$$f''(x) = 6x$$

باختبار الأعداد الحرجية $x = \pm 2$ ، نجد أن:

$$f''(-2) = -12, \quad -12 < 0$$

فيكون للدالة f قيمة عظمى محلّية عند $x = -2$ وهي 11

$$f''(2) = 12, \quad 12 > 0$$


فيكون للدالة f قيمة صغرى محلّية عند $x = 2$ وهي -21

حاول أن تحل

4) استخدم اختبار المشتقّة الثانية لتجد القيم القصوى المحلّية للدالة $f : f(x) = 4x^3 - 12x^2$

رسم بيان دوال كثيرات الحدود

Graph of Polynomial Functions



دعنا نفكّر ونناقش

يبيّن الشكل المقابل بيان الدالة f : $f(x) = x^2 + 2x - 1$

1 أوجد إن أمكن:

a $(x)f'$ محدّداً كلّاً من النقاط الحرجة

وفترات التزايد وفترات التناقص للدالة f .

b $(x)f''$ محدّداً كلّاً من نقاط الانعطاف وفترات التغير.

2 قارن نتائج الحل في **1** مع المنحنى المرسوم.

سوق تعلم

- ربط بيان f' و f .
- خطوات رسم بيان دوال كثيرات الحدود.

المفردات والمصطلحات

- بيان دوال كثيرات الحدود

Graph of Polynomial Functions

تعلمت فيما سبق كيفية رسم منحنى تقريري لبيان دالة كثيرة حدود معتمداً على سلوك نهاية الدالة، وفي البنود السابقة تعلمت تحديد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة وتحديد النقاط الحرجة والقيم العظمى أو الصغرى، وتم تحديد نقاط الانعطاف والفترات التي يكون فيها منحنى الدالة مقعرًا للأعلى أو لأأسفل. وسنستفيد من كل هذه المعلومات لرسم بيان دالة كثيرة الحدود رسمًا أكثر دقة.

الخطوات اللازم اتباعها في دراسة تغير الدالة كثيرة الحدود ورسم بيانها

Steps to be Followed in Drawing the Graph of a Polynomial Function

1 عّين مجال الدالة f .

مجال دالة كثيرة الحدود هو \mathbb{R} ولكنه يقتصر أحياناً على فترة من \mathbb{R} خاصة في المسائل الحياتية.

2 أوجد النهايات عند الحدود المفتوحة لمجال الدالة f .

3 عّين النقاط الحرجة للدالة f .

4 كون جدولًا لدراسة إشارة f' وتحديد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة والقيم القصوى المحلية.

5 كون جدولًا لدراسة إشارة f'' وتحديد فترات التغير لمنحنى الدالة ثم نقاط الانعطاف إن وجدت.

6 أوجد نقاطاً إضافية.

تساعد هذه النقاط على رسم بيان الدالة بدقة وأهم هذه النقاط، نقاط التقاطع مع أحد المحورين إن أمكن.

7 ارسم بيان الدالة f . استخدم نتائج الخطوات السابقة في الرسم.

مثال (1)

ادرس تغير الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 4$: f وارسم بيانها.

الحل:

f دالة كثيرة الحدود مجالها \mathbb{R} .
نوجد النهايات عند الحدود المفتوحة

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x^3) = \infty$$

نوجد النقاط الحرجة للدالة f

f دالة كثيرة الحدود قابلة للاشتغال على مجالها.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

$f'(x) = 0$ نضع:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0$$

$$x = 1 , x = -1$$

$$f(1) = (1)^3 - 3(1) + 4 = 2 , f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 4 = 6$$

$\therefore (1, 2), (-1, 6)$ نقطتان حرجة.

نكون جدول لدراسة إشارة f'

الفترات	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
f' إشارة	+++	---	+++
f سلوك الدالة	متزايدة \nearrow	متناقصة \searrow	متزايدة \nearrow

الدالة متزايدة على كل من الفترة $(-\infty, -1)$ وال فترة $(1, \infty)$ ومتناقصة على الفترة $(-1, 1)$


نكون جدول لدراسة إشارة f'' :

الفترات	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
f'' إشارة	--	++
التقعر	\cap	\cup

$f''(x) = 6x$
نضع: $6x = 0 , x = 0$
 $f(0) = 4$

منحنى الدالة مقعر لأسفل على الفترة $(-\infty, 0)$ ومقعر لأعلى على الفترة $(0, \infty)$

نقطة انعطاف $(0, 4)$.



نقاط إضافية							
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-14	2	6	4	2	6	22

نقطة إضافية محلية محلية انعطاف نقطة صغرى محلية نقطة إضافية محلية نقطة إضافية

بيان الدالة f :

حاول أن تحل

1 ادرس تغير الدالة $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$ وارسم بيانها.

مثال (2)

ادرس تغير الدالة $f(x) = 1 - x^3$ وارسم بيانها.

الحل:

f دالة كثيرة الحدود مجالها \mathbb{R} .

نوجد الهايات عند الحدود المفتوحة.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3) = -\infty$$

نوجد النقاط الحرجة حيث f دالة قابلة للاشتباك على مجالها.

$$f'(x) = -3x^2$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع:}$$

$$-3x^2 = 0 \implies x = 0$$

$$f(0) = 1 - (0)^3 = 1$$

$\therefore (0, 1)$ نقطة حرجة.

نكون جدول التغير لدراسة إشارة f' :

الدالة متناقصة على الفترة $(-\infty, 0)$ والفرقة $(0, \infty)$.

إشارة f'	$-\infty$	0	∞
سلوك الدالة f	∞	متناقصة	$-\infty$

نكون جدول لدراسة إشارة f''

$$f''(x) = -6x$$

$$-6x = 0 \implies x = 0$$

منحنى الدالة مقعر لأعلى على الفترة $(-\infty, 0)$


ومقعر لأسفل على الفترة $(0, \infty)$

$(0, 1)$ نقطة انعطاف.

إشارة f''	$-\infty$	0	∞
التقعر	$++$	$--$	

تقعر لأعلى تقعر لأسفل

نقاط إضافية



x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	9	2	1	0	-7

بيان الدالة f :

حاول أن تحل

ادرس تغير الدالة f : 2 ادرس تغير الدالة $f(x) = x - 2x^3$ وارسم بيانها.

مثال (3)

ادرس تغير الدالة f : $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 2$ وارسم بيانها.

الحل:

f دالة كثيرة الحدود مجالها \mathbb{R} .
نوجد النهايات عند الحدود المفتوحة.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^4) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (3x^4) = \infty$$

نوجد النقاط الحرجة للدالة f .

f دالة كثيرة الحدود قابلة للاشتقاق على مجالها.

$$f'(x) = 12x^3 + 12x^2$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{نضع:}$$

$$12x^3 + 12x^2 = 0$$

$$12x^2(x+1) = 0 \implies x = 0, \quad x = -1$$

$$f(0) = 2, \quad f(-1) = 3 - 4 + 2 = 1$$

(-1, 1), (0, 2) نقطتان حرجنات.

نكون جدول لدراسة إشارة f'

f' إشارة	$-\infty$	-1	0	∞
f سلوك الدالة	∞ متناقصة	متزايدة	متزايدة	∞ متزايدة

الدالة متناقصة على الفترة $(-\infty, 0)$ ومتزايدة على الفترة $(0, \infty)$

نكون جدول لدراسة إشارة f''

$$f''(x) = 36x^2 + 24x$$

$$f''(x) = 0 \quad \text{نصل:}$$

$$12x(3x+2) = 0$$


$$x = 0, \quad x = -\frac{2}{3}$$

$$f(0) = 2, \quad f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{38}{27}$$

f'' إشارة	$++$	$--$	$++$
التعّر	\cup تعّر لأعلى	\cap تعّر لأسفل	\cup تعّر لأعلى

منحني الدالة مقعر لأعلى على كل من الفترتين $(-\infty, -\frac{2}{3})$ ، $(0, \infty)$ ومقعر لأسفل على الفترة $(-\frac{2}{3}, 0)$ هما نقطتا انعطاف.

نقاط إضافية



x	-2	-1	$-\frac{2}{3}$	0	1
$f(x)$	18	1	$\frac{38}{27}$	2	9

بيان الدالة: f

حاول أن تحل

3 ادرس تغير الدالة f : $f(x) = x^4 - 2x^2$ وارسم بيانها.

مثال (4)

ادرس تغير الدالة f : $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$ وارسم بيانها.

الحل:

f دالة كثيرة الحدود مجالها \mathbb{R} .
نوجد النهايات عند الحدود المفتوحة.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^4) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^4) = -\infty$$

نوجد النقاط الحرجة للدالة f

دالة كثيرة الحدود قابلة للاشتغال على مجالها.

$$f'(x) = -4x^3 + 4x$$

$$f'(x) = 0$$

نضع:

$$-4x^3 + 4x = 0$$

$$-4x(x^2 - 1) = 0$$

$$-4x(x-1)(x+1) = 0 \implies x=0, \quad x=1, \quad x=-1$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = -(1)^4 + 2(1)^2 + 1 = 2$$

$$f(-1) = -(-1)^4 + 2(-1)^2 + 1 = 2$$

$\therefore (0, 1), (1, 2), (-1, 2)$ نقاط حرجة.

نكون جدول لدراسة إشارة f'

f' إشارة	$+\infty$	-1	0	1	∞
سلوك الدالة f	$-\infty$ مترابدة ↑	متناقصة ↓	متناقصة ↓	$-\infty$ مترابدة ↑	متناقصة ↓

\therefore الدالة مترابدة على كل من الفترة $(-\infty, -1)$ والدالة متناقصة على كل من الفترة $(0, 1)$ والفترات $(1, \infty)$.

نكون جدول لدراسة إشارة f''

$$f''(x) = -12x^2 + 4$$

$$f''(x) = 0$$

نضع:

$$-12x^2 + 4 = 0$$

$$-12\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$-12\left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

f'' إشارة	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	∞
التقعر	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑

↑↑

تقعر لأسفل

↑↑

تقعر لأعلى

↑↑


تقعر لأسفل

منحنى الدالة مقعر لأسفل على كل من الفترتين $(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{3}})$, $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$ ومقعر لأعلى على الفترة $(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$

نقاط الانعطاف هي: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{14}{9}\right)$, $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{14}{9}\right)$

• نقاط إضافية

x	-2	-1	$\frac{-1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	2
$f(x)$	-7	2	$\frac{14}{9}$	1	$\frac{14}{9}$	2	7



بيان الدالة f :

حاول أن تحل


ادرس تعديل الدالة: 4 ادرس تعديل الدالة: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ وارسم بيانها.

Relations Between the Graphs of f' and f

العلاقات بين بيان الدالة f' و f

إن معرفة النقاط الحرجة وإشارة الدالة المشتقة f' تسمحان بمعرفة سلوك الدالة f .


يمكن قراءة بيانات f' من رسماها البياني واستنتاج سلوك f . فمثلاً يمثل الشكل (1) المقابل بيان الدالة f .



شكل (1)
بيان الدالة f'

- نقطة حرجة $(1, f(1))$

- إشارة f' سالبة على الفترة $(-\infty, 1)$
- إشارة f' موجبة على الفترة $(1, \infty)$




نستنتج أن f متناقصة على الفترة $(-\infty, 1)$ ومتزايدة على الفترة $(1, \infty)$ ولها قيمة صغيرة $f(1)$.

لكن هذا لا يسمح برسم بيان f بدقة إذ يلزمها بعض النقاط الإضافية. يمثل الشكل المقابل بيانات بعض الدوال التي يمكن أن تكون بيانات f .

مثال (5)

الرسم البياني للدالة f' من (إثراي)



الرسم البياني للمشتقة

ارسم صورة تقريرية للرسم البياني للدالة f التي لها الخواص التالية:

$f(0) = 0$ a

b الرسم البياني للدالة f (مشتقة الدالة f) موضح في الشكل المقابل.

c دالة متصلة لكل x


الحل:

لتحقيق الخاصية a نبدأ بنقطة الأصل.

لتحقيق الخاصية b نأخذ بعين الاعتبار ما يوضحه الرسم البياني للمشتقة بالنسبة إلى الميل. إلى يسار $x = 1$ الرسم البياني للدالة f له ميل ثابت قدره -1 ، لذلك نرسم مستقيماً ميله -1 إلى يسار $x = 1$ مع التأكد من أنه يمر بنقطة الأصل.

إلى يمين $x = 1$ الرسم البياني للدالة f له ميل ثابت قدره 2 ، لذلك ينبغي أن يكون مستقيماً ميله 2 . هناك عدد لا نهائي من مثل تلك المستقيمات، ولكن واحداً فقط، المستقيم الذي يقابل الجانب الأيسر من الرسم البياني عند النقطة $(1, -1)$ سوف يحقق شرط الاتصال.

يبين الشكل أعلاه الرسم البياني الناتج.



الرسم البياني للدالة f منشأ عن الرسم البياني للمشتقة f' وشرطين آخرين.

حاول أن تحل


5

ارسم صورة تقريرية للرسم البياني للدالة f التي لها الخواص التالية:

$f(0) = 1$ a

b الرسم البياني للدالة f موضح في الشكل المقابل.

c دالة متصلة لكل x .



تطبيقات على القيم القصوى

Applications on Extreme Value



عمل تعاوني

وجد صاحب محل لبيع الأحذية الرياضية أنه يمكن نمذجة ربحه بالدالة f :

$$f(x) = -15x^2 + 600x + 50$$

حيث x تمثل سعر الحذاء بالدينار.

- a** ما سعر الحذاء الذي يحقق أعلى ربح؟
- b** ما قيمة أعلى ربح؟

سوف تعلم

- تطبيقات على الهندسة والصناعة.
- تطبيقات على الاقتصاد.

المفردات والمصطلحات

- القيم العظمى والقيم الصغرى

Max-Min Values

من «العمل التعاوني» وجدت أكبر قيمة للدالة من خلال تطبيق خواص القطع المكافئ للدالة التربيعية، وفي هذا البند يمكنك إيجاد القيم نفسها باستخدام خواص القيم القصوى التي درستها حيث إن الاشتغال يقدم لنا الطريقة الناجحة لإيجاد أكبر القيم وأصغرها للدوال ويمكن أن تساعدنا الخطوات التالية على ذلك :

- 1 افهم المسألة: اقرأ المسألة بعناية، حدد المعلومات التي تحتاج إليها لحل المسألة.
- 2 كون نموذجًا رياضيًّا للمسألة: ارسم أشكالًا وضع علامات على الأجزاء المهمة في المسألة. ضع متغيرًا واحدًا يمثل الكمية المطلوب الحصول على قيمتها العظمى أو قيمتها الصغرى. ثم اكتب دالة باستخدام المتغير بحيث تعطي قيمتها القصوى المعلومات التي نبحث عنها.
- 3 أوجد مجال الدالة. وحدّد قيم المتغير التي تكون معقولة في المسألة.
- 4 حدد النقاط الحرجة ويمكن إيجاد النقاط الطرفية: أوجد أين تكون المشتقّة صفرية أو أين لا يكون لها وجود.
- 5 حل النموذج الرياضي: إذا لم تكن واثقًا من النتيجة دعم أو أكّد صحة حلّك بطريقة أخرى.
- 6 فسر الحل: ترجم نتيجتك الرياضية إلى الموقف في المسألة، ثم قرّر ما إذا كانت النتيجة معقولة.

مثال (1)

عددان موجبان مجموعهما 100 ومجموع مربعيهما أصغر ما يمكن، ما العددان؟

الحل:

نمذج:

بفرض أن أحد العددين x حيث $0 < x < 100$

\therefore العدد الآخر هو $100 - x$

مجموع مربعيهما هو: $g(x) = x^2 + (100 - x)^2$

$$g'(x) = 2x + 2(100 - x)(-1)$$

$$g'(x) = 2x - 200 + 2x$$

$$= 4x - 200$$

$$g'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$4x - 200 = 0 \Rightarrow x = 50$$

\therefore توجد نقطة حرجة $(50, g(50))$.

$$g''(x) = 4, \quad 4 > 0$$

$x = 50$ قيمة صغرى مطلقة عند $\therefore g(50)$.

$x = 50$ العدد الأول هو:

$100 - x = 100 - 50 = 50$ العدد الثاني هو:

$50, 50 \quad \therefore$ العددان هما

حاول أن تحل

أوجد عددين مجموعهما 14 وناتج ضربهما أكبر ما يمكن.

1

مثال (2) صنع صندوق

يراد صنع صندوق بدون غطاء بقص مربّعات متطابقة طول ضلع كل منها x من أرکان طبقة صفيح أبعادها 16 cm , 6 cm وهي جوانبها إلى أعلى (انظر الشكل المقابل).

أوجد قيمة x بحيث يكون حجم الصندوق أكبر ما يمكن. وما هو حجم أكبر صندوق يمكن صنعه بهذه الطريقة؟

الحل:



نمذج:

ارتفاع الصندوق x , والبعدان الآخران هما $(16 - 2x)$, $(6 - 2x)$

$$0 < 2x < 6$$

لا يمكن أن تزيد على $2x$

$$0 < x < 3 \quad \text{أي أن}$$



$$V(x) = x(6 - 2x)(16 - 2x)$$

\therefore حجم الصندوق هو:

$$V(x) = 4x^3 - 44x^2 + 96x$$

بفك الأقواس نحصل على:

$$V'(x) = 12x^2 - 88x + 96$$

المشتقة الأولى للحجم V هي:

$$V'(x) = 0$$

نضع

$$12x^2 - 88x + 96 = 0$$

$$4(3x^2 - 22x + 24) = 0$$

$$4(x - 6)(3x - 4) = 0$$

$$x = 6 \quad , \quad x = \frac{4}{3}$$

حلاً المعادلة التربيعية هما:

وحيث إن $(0, 3) \notin$ ففيتم استبعادها

$$V''(x) = 24x - 88$$

المشتقة الثانية:

$$V''\left(\frac{4}{3}\right) = 24 \times \frac{4}{3} - 88 = -56 \quad , \quad -56 < 0$$

لذلك يكون الصندوق أكبر ما يمكن عند $x = \frac{4}{3}$

$$V\left(\frac{4}{3}\right) = 4\left(\frac{4}{3}\right)^3 - 44\left(\frac{4}{3}\right)^2 + 96\left(\frac{4}{3}\right)$$

حجم أكبر صندوق:

$$= \frac{1600}{27} \text{ cm}^3$$


فسّر

طول ضلع كل مربع يقطع من أركان طبقة صفيح $\frac{4}{3} \text{ cm}$ يعطي أكبر سعة للصندوق.

ويكون أكبر حجم $\frac{1600}{27} \text{ cm}^3$

حاول أن تحل

في مثال (2)، ما أكبر حجم للصندوق إذا كانت أبعاد طبقة الصفيح $8 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$



تصميم علبة

مثال (3)

طلب إليك تصميم علبة زيت تسع لترًا واحدًا تكون على شكل أسطوانة دائيرية قائمة (كما في الشكل المقابل).

ما أبعادها لتكون كمية المعدن المستخدم لصنعها أقل ما يمكن؟

الحل:

نفرض أن طول نصف قطر قاعدة العلبة هو r وارتفاعها h . لكي تكون كمية المعدن المستخدمة أقل ما يمكن،

يجب أن تكون المساحة السطحية (الكلية) أقل ما يمكن وفي الوقت نفسه تتحقق شرط الحجم

المساحة السطحية للعلبة = المساحة الجانبيّة + مجموع مساحتي القاعدين

$$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \quad (1)$$

$$1L = 1000 \text{ cm}^3$$

وحيث إن حجم العلبة معلوم

$$\therefore V = \pi r^2 h = 1000$$



$$h = \frac{1000}{\pi r^2} \quad (2)$$

وبالتعويض عن h في المعادلة (1) نحصل على

$$A = 2\pi r \times \frac{1000}{\pi r^2} + 2\pi r^2$$

$$A = \frac{2000}{r} + 2\pi r^2$$

$$\frac{dA}{dr} = \frac{-2000}{r^2} + 4\pi r$$

$$\frac{dA}{dr} = 0 \quad \text{نضع}$$

$$\therefore 0 = \frac{-2000}{r^2} + 4\pi r$$

$$4\pi r = \frac{2000}{r^2}$$

$$\therefore 4\pi r^3 = 2000$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$r \approx 5.42$$

وهذه هي القيمة الحرجة الوحيدة حيث $r \neq 0$

وللتتأكد من أن هذه القيمة تعطي أقل مساحة سطحية نوجد المشقة الثانية:

$$\frac{d^2A}{dr^2} = \frac{4000}{r^3} + 4\pi \quad \text{المشقة الثانية:}$$

وهي موجبة على كل مجال A .

لذلك فإن منحنى الدالة A مقعرًا للأعلى وقيمة A عند $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ هي قيمة صغرى مطلقة.

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2 \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r \quad , \quad h \approx 10.84$$

فسر:

علبة اللتر الواحد التي تستخدم أقل معدن ممكن لتصنيعها يكون ارتفاعها مساوياً للقطر، حيث:

$$r \approx 5.42 \text{ cm} \quad , \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

حاول أن تحل

3 تعطى الدالة $V(h) = 2\pi(-h^3 + 36h)$ حجم أسطوانة بدلالة ارتفاعها h .

a) أوجد الارتفاع h (cm) للحصول على أكبر حجم لأسطوانة.

b) ما قيمة هذا الحجم؟

مثال (4)

أوجد أقصر مسافة بين النقطة $P(x, y)$ على المنحنى الذي معادلته $y^2 - x^2 = 16$ والنقطة $Q(6, 0)$.

الحل:

$$y^2 - x^2 = 16 \Rightarrow y^2 = x^2 + 16$$

نوجد المسافة بين نقطتين P ، Q

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2} \\ &= \sqrt{(x - 6)^2 + (y - 0)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sqrt{(x - 6)^2 + (y - 0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 - 12x + 36 + y^2} = \sqrt{x^2 - 12x + 36 + x^2 + 16} \\ &= \sqrt{2x^2 - 12x + 52} \end{aligned}$$

نفرض أن دالة المسافة هي:

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{1}{2}(4x - 12)(2x^2 - 12x + 52)^{\frac{-1}{2}} \\ &= \frac{2x - 5}{\sqrt{2x^2 - 12x + 52}} \end{aligned}$$

$$S'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 5 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$2x^2 - 12x + 52 = 0$$

$$x^2 - 6x + 26 = 0$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 26$$

$$= 36 - 104 = -68 , -68 < 0$$

نوجد أصفار المقام بوضع

المميز:

\therefore لا يوجد أصفار للمقام

نكون جدول التغير

x	$-\infty$	3	∞
$S'(x)$	--	++	
$S(x)$			

\therefore أقصر مسافة بين نقطتين P ، Q هي عند $x = 3$.

$$S(3) = \sqrt{2(3)^2 - 12(3) + 52}$$

$$= \sqrt{34}$$

أقصر مسافة هي $\sqrt{34}$ وحدة طول.

حاول أن تحل

أوجد أقصر مسافة بين النقطة $A(x, y)$ على المنحنى الذي معادلته $y = \sqrt{x}$ والنقطة $B(3, 0)$. 4

مثال (5)



تنتج إحدى شركات الأدوات الكهربائية خلال فترة زمنية محددة كمية x من الخلاطات الكهربائية..

يعطى معدل كلفة إنتاج كل قطعة (بالدينار) بالعلاقة $C(x) = x - 20 + \frac{400}{x}$

أوجد كمية عدد القطع المنتجة خلال الفترة لتحقيق أقل كلفة ممكنة.

1 تباع كل قطعة منتجة بمبلغ 100 دينار.

2 a) عَبَرَ عن ربح الشركة بمعلومية x .

b) أوجد قيمة x التي تحقق أكبر ربح، وما قيمته؟

الحل:

يمثل المتغير x عدد القطع المنتجة $\therefore x$ عدد صحيح موجب.

ندرس تغير الدالة C على الفترة $(0, \infty)$ لحساب قيمة x التي تعطي قيمة صغيرة.

$$C'(x) = 1 - \frac{400}{x^2} = \frac{x^2 - 400}{x^2} = \frac{(x-20)(x+20)}{x^2}$$

$\therefore x+20 > 0, x^2 > 0$ (x عدد صحيح موجب)

$\therefore x-20 > 0$ ، C' لها نفس الإشارة

جدول التغير

x	0	20	∞
إشارة f'	--	++	
سلوك f			

من جدول التغير نستنتج أن إنتاج 20 قطعة يحقق أقل كلفة ممكنة.

a) الربح = سعر مبيع الكمية - كلفة الكمية المباعة

سعر الكمية المباعة: $100x$

كلفة الكمية المباعة: $\left(x - 20 + \frac{400}{x} \right) \cdot x = x^2 - 20x + 400$

الربح:

$$P(x) = 100x - (x^2 - 20x + 400)$$

$$= 100x - x^2 + 20x - 400$$

$$= -x^2 + 120x - 400$$

b) لحساب قيمة x التي تحقق أكبر ربح ندرس تغير الدالة P على الفترة $(0, \infty)$ ونوجد قيمة x التي تحقق قيمة قصوى.

$$P'(x) = -2x + 120$$

$$P'(x) = 0 \quad \text{نضع}$$

$$-2x + 120 = 0$$

$$x = 60$$

تغير الدالة P :


x	0	60	∞
إشارة P'	++	--	
سلوك P			

من جدول التغير نستنتج أن قيمة x التي تحقق قيمة عظمى للدالة P هي 60 أي أن مبيع 60 قطعة يحقق أكبر ربح للشركة.
أكبر قيمة للربح:

$$\begin{aligned}
 P(60) &= -(60)^2 + 120(60) - 400 \\
 &= -4000 + 7200 \\
 &= 3200
 \end{aligned}$$

أكبر قيمة للربح 200 دينار.

حاول أن تحل



- 5 تصنع إحدى الشركات يومياً x (بالملايين) من المكثفات الكهربائية.
يعطى معدل كلفة إنتاج كل قطعة بالعلاقة: $C(x) = x - 2 + \frac{25}{x}$
- a أو جد كمية عدد المكثفات المنتجة يومياً لتحقيق أقل كلفة ممكنة.
b تابع كل ألف قطعة بسعر 10 دنانير.
أو جد كمية المكثفات المنتجة لتحقيق أكبر ربح.

المرشد لحل المسائل

مستطيلات داخل أشكال: يبيّن الشكل مستطيلاً داخل مثلث قائم الزاوية متطابق الضلعين، طول وتره وحدتي طول:

١ عَبَرْ عن الإِحْدَاثِيِّ الصَّادِيِّ لِلنَّقْطَةِ P بِدَلَالَةِ x .

[إرشاد: اكتب معادلة \overrightarrow{AB} .]

٢ عَبَرْ عن مساحة المستطيل بِدَلَالَةِ x .

٣ ما أَكْبَرْ مساحة يأخذها المستطيل؟ وما أبعاده حينها؟

الحل:

١ يجب إيجاد معادلة \overrightarrow{AB} : لدينا $A(1, 0)$, $B(0, 1)$

$y = -x + 1$: معادلة \overrightarrow{AB} ميل $-1 = \overrightarrow{AB}$

∴ النقطة P موجودة على \overrightarrow{AB}

٢ مساحة المستطيل = الطول \times العرض

الطول $2 \times x_p = 2x$

العرض $y_p = -x + 1$

∴ مساحة المستطيل $= 2x(-x + 1) = -2x^2 + 2x$

٣ نرسم على الآلة الحاسبة البيانية الدالة f :

$f(x) = -2x^2 + 2x$ نجد بيانياً أن $f(x)$ لها قيمة قصوى تساوى 0.5 عندما $x = 0.5$

∴ أقصى مساحة يأخذها المستطيل هي 0.5 وحدة مربعة.


قياسات المستطيل:

الطول $2 \times 0.5 = 1$ units

العرض $-0.5 + 1 = 0.5$ units

مسألة إضافية

لتصميم صندوق له غطاء، أخذت قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل أبعادها $20\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ ، قطع مربعان متطابقان من أركانها طول ضلع كل منهما $x\text{ cm}$ ، وقطع مستطيلان متطابقان من الجهة الأخرى بحيث أصبح بالإمكان طي الأجزاء البارزة لتكون متوازي مستطيلات له غطاء.




a اكتب صيغة تعبر عن $V(x)$ حجم الصندوق.

b أوجد مجال V للمسألة واستخدم رسمًا بيانياً يمثل V في ذلك المجال.

c استخدم الطريقة البيانية لإيجاد أكبر حجم ممكن للصندوق وقيمة x التي تعطي ذلك الحجم.

d دعم النتائج التي حصلت عليها تحليلياً.

مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة



ملخص

- إذا كانت f دالة مجالها D ، $c \in D$ فإن $(c, f(c))$ تسمى:
 - قيمة عظمى مطلقة للدالة f على D عندما: $f(c) \geq f(x)$ ، $\forall x \in D_f$
 - قيمة صغرى مطلقة للدالة f على D عندما: $f(c) \leq f(x)$ ، $\forall x \in D_f$
 - إذا كانت f دالة متصلة على فترة مغلقة $[a, b]$ فإن f تكون لها قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة على هذه الفترة.
 - لتكن $(c, f(c))$ نقطة داخلية للدالة f ، D فترة مفتوحة تحوي c ، $f'(c)$ تكون:
 - a قيمة عظمى محلية عند c عندما: $f'(c) \geq f(x)$ $\forall x \in D$
 - b قيمة صغرى محلية عند c عندما: $f'(c) \leq f(x)$ $\forall x \in D$
 - النقطة الداخلية للدالة f $(c, f(c))$ تسمى نقطة حرجة عندما $f'(c) = 0$ أو $f'(c)$ غير موجودة.
 - إذا كانت للدالة f قيمة قصوى (عظمى أو صغرى) محلية عند c فإن $x = c$ نقطة حرجة.
 - إذا كانت f دالة:
 - متصلة على الفترة $[a, b]$
 - قابلة للاشتاق على الفترة (a, b)
- فإنّه يوجد على الأقل $c \in (a, b)$ بحيث
- لتكن f دالة معروفة على الفترة I . نقول إن:
 - 1 f دالة متزايدة على I إذا كان: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ ، $\forall x_1, x_2 \in I$
 - 2 f دالة متناقصة على I إذا كان: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ ، $\forall x_1, x_2 \in I$
 - الدالة التي تكون دائمًا متزايدة على فترة أو دائمًا متناقصة على فترة، يقال عنها إنّها دالة مطردة على هذه الفترة.
 - لتكن f دالة قابلة للاشتاق على (a, b) .
 - إذا كانت $f'(x) > 0$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن f متزايدة على (a, b) .
 - إذا كانت $f'(x) < 0$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن f متناقص على (a, b) .
 - إذا كانت $f'(x) = 0$ عند كل x تنتهي إلى الفترة (a, b) ، فإن الدالة f ثابتة على (a, b) .
 - لتكن f دالة متصلة على مجالها وكانت $(c, f(c))$ نقطة حرجة.
 - إذا كانت إشارة المشتقة f' تتغير من الموجب إلى السالب عند c فإن f يكون لها قيمة عظمى محلية عند c .
 - إذا تغيرت إشارة f' من السالب إلى الموجب عند c فإن f يكون لها قيمة صغرى محلية عند c .

- إذا لم تغير إشارة f' عند c فإن f لا يكون لها قيمة قصوى محلية عند c .
- تعريف: التقعّر

إذا وقع منحنى الدالة أعلى جميع مماساته على فتره I فإنه يكون مقعرًا لأعلى على I .

وإذا وقع منحنى الدالة أسفل جميع مماساته على فتره I فإنه يكون مقعرًا لأسفل على I .

- اختبار التقعّر:

a إذا كانت $I \in f''(x) > 0 \quad \forall x$ فإن منحنى الدالة f مقعرًا لأعلى على I .

b إذا كانت $I \in f''(x) < 0 \quad \forall x$ فإن منحنى الدالة f مقعرًا لأسفل على I .

- نقطة الانعطاف:

تسمى النقطة $(c, f(c))$ نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f إذا كانت f دالة متصلة عند c ، ومنحنى الدالة f يغير تقعّره عند هذه النقطة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى.

• إذا كانت $0 = f'(c) < 0$ ، $f'(c)$ تكون لها قيمة عظمى محلية عند $x = c$.

• إذا كانت $0 = f'(c) > 0$ ، $f'(c)$ تكون لها قيمة صغرى محلية عند $x = c$.

الوحدة الرابعة

الإحصاء

Statistics

مشروع الوحدة: ما هي أفضل طريقة لإيجاد وظيفة؟

1 مقدمة المشروع: بعد التخرج يواجه الحاصلون على الإجازات والشهادات الجامعية تحديًّا جديًّا هو الانخراط في سوق العمل.

2 الهدف: هو البحث عن فرص عمل من خلال القيام بخطوات ومحاولات متنوعة واستخدام العديد من الوسائل.

3 اللوازم: حاسوب – شبكة الإنترنت.

4 أسئلة حول التطبيق:

(a) كيف ستحتاج عينة عشوائية من الموظفين للاستفسار عن الوسيلة التي استخدموها في إيجاد وظيفتهم؟

(b) ما الخيارات التي اكتشفتها؟ نظمها في استماراة.

(إرشاد):

- من خلال الأصدقاء والمعارف.

- من خلال الإعلانات في الصحف والمجلات.

- من خلال الوكالات المختصة في الربط بين سوق العمل وطالبي الوظائف.

- من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت.

- من خلال التقدم مباشرةً بطلب وظيفة من الشركة المختصة أو اعتماد وسيلة أخرى (اذكرها ...).

(c) حدد النسب المئوية لكل خيار مما سبق.

5 التقرير: اكتب تقريرًا مفصلاً يحدد النسب التي حصلت عليها من خلال العينة العشوائية التي اعتمدتها مكونًا جدولاً بالنسبة المئوية عن كل وسيلة تم استخدامها لإيجاد وظيفة.

القرار: ضمن تقريرك بعض الاقتراحات والنصائح والاستنتاجات التي نتجت عن تلك الدراسة.

دروس الوحدة

الارتباط والانحدار	اختبارات الفروض الإحصائية	القدر
4-3	4-2	4-1

الوحدة الرابعة

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- تعلمت مقاييس النزعة المركزية: المتوسط الحسابي – الوسيط – المتوسط.
- تعلمت المجتمع الإحصائي.
- تعلمت العينة العشوائية وأنواعها واستخداماتها.

أضف إلى معلوماتك

في الوسائل الإعلامية المرئية والمسمعة والمكتوبة تطالعك نتائج إحصائية تتحدث عن توقعات أحداث معينة تتناول انتخابات نيابية أو رئاسية أو مبيعات أو مباريات... وأكثر ما يستوقفك هو نسبة مؤدية معينة مع هامش خطأ محدد والسؤال المهم هو: كيف يتم التقدير وكيف يحسب هامش الخطأ؟ توفر دروس هذه الوحدة فرصة أمام الطلاب للتعرف على التقدير وهامش الخطأ والفرض والإحصائية وكيفية احتسابها.

كما يتعرف الطلاب على مفهوم الارتباط والانحدار ويحسبوا معامل ارتباط بيرسون ثم يكتبوا معادلة خط الانحدار ويتبيّأ نتائج معينة.

ماذا سوف تتعلم؟

- يُعرف المعلمة والإحصاء.
- إيجاد التقدير بنقطة.
- إيجاد التقدير بفترة ثقة.
- استكشاف الفروض الإحصائية.
- يُعرف الاختبارات الإحصائية ويجريها.
- اتخاذ القرار المناسب.
- يتعرف الارتباط والانحدار.
- يوجد معامل ارتباط بيرسون.
- يكتب معادلة خط الانحدار ويتبيّأ.

المصطلحات الأساسية

المعلمة – الإحصاء – التقدير – التقدير بنقطة – فترة الثقة – التقدير بفترة الثقة – درجة الشقة – التوزيع الطبيعي – القيمة الحرجة – هامش الخطأ – الخطأ المعياري – خواص التوزيع σ – الفرض الإحصائي – المقياس الإحصائي – فرض العدم – الفرض البديل – القرار – الانحدار – المخطط الانتشاري – الارتباط – معامل الارتباط الخططي – خواص معامل الارتباط – معامل ارتباط بيرسون – التنبؤ.

التقدير

Estimation



دعنا نفكّر ونناقش

متوسط عدد الرحلات الجوية المغادرة يومياً خلال شهر يونيو من أحد المطارات هو 75 رحلة.

هل يمكن استخدام هذه العينة لتقدير متوسط عدد الرحلات μ خلال أشهر السنة؟ لماذا؟

وما هي أفضل وسيلة للتقدير لنقترب من الحقيقة؟

سبق لنا في الصف الحادي عشر تعريف المجتمع الإحصائي والعينة العشوائية والأسباب التي تؤدي إلىأخذ العينات لدراسة المجتمع بدلاً من الحصر الشامل، وذلك لتقدير المتوسط (الوسط) الحسابي للمجتمع μ أو الانحراف المعياري له s .

ويعتبر الوسط الحسابي للمجتمع \bar{x} والانحراف المعياري للمجتمع s من معالم المجتمع، وعادة ما تكون هذه المعالم مجدهولة.

ولتقدير هذه المعالم نلجأ إلى سحب عينة عشوائية منه، ثم نحسب المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} أو الانحراف المعياري s والذي يعتمد على قيم العينة ولا يعتمد على معالم المجتمع.

المعلمة (Parameter): هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالمتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري s .

الإحصاءة (Statistic Function): هو اقتران تعيين قيمة من العينة كالمتوسط الحسابي \bar{x} أو الانحراف المعياري s .

تقدير المعلمة (Parameter Estimate): هو إحصاءة تعتمد على قيم العينة وتعكس قيمة قريبة لمعلمة المجتمع ككل وتوزيعه.

في هذا الدرس سوف تتعرف طريقتين تساعدان على إيجاد قيم تقديرية لبعض معالم مجتمع معين:

- طريقة أولى: التقدير بنقطة.
- طريقة ثانية: التقدير بفتررة الثقة.

سوف تعلم

- التقدير بنقطة.
- التقدير بفتررة الثقة.
- هامش الخطأ.

المفردات والمصطلحات:

- Parameter • المعلمة
- الإحصاءة

Statistic Function

- تقدير المعلمة

Parameter Estimate

- Estimation • تقدير
- تقدير بنقطة

Point Estimate

- تقدير بفتررة الثقة

Confidence Interval

Estimation

- درجة الثقة (مستوى الثقة)

(Level of Confidence)

Degree of Confidence

- نسبة الخطأ (مستوى المعنوية)

Percentage of error

(Significance Level)

- القيمة الحرجة

Critical Value

- هامش الخطأ

Margin of Error

- درجات الحرية

Degree of Freedom

تذكرة:

الاقتران هو قيمة تربط مفردات معينة وتنتج منها.

Point Estimate

التقدير بنقطة

التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع. فمثلاً المتوسط الحسابي للعينة العشوائية \bar{x} يستخدم كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع μ , وكذلك الانحراف المعياري للعينة s يستخدم كتقدير بنقطة لانحراف المعياري للمجتمع σ .

Confidence Interval Estimation

التقدير بفترة الثقة

علمنا مما سبق أن لكل مجتمع معالم منها المتوسط الحسابي μ والانحراف المعياري σ , ودرسنا كيفية إيجاد التقدير بنقطة لتلك المعالم. وعلمنا أن التقدير بنقطة لإحدى معالم المجتمع هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة، ولذلك فإن احتمال الخطأ في التقدير بنقطة يكون كبيراً. وبناء عليه فإنه من الأفضل إيجاد فترة معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو باحتمال معين. إن مثل هذه الفترة تسمى فترة الثقة.

Confidence Interval

فترة الثقة

هي فترة طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى درجة الثقة (مستوى الثقة).

التقدير بفترة الثقة

هو إيجاد فترة معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو احتمال معين.

درجة الثقة (مستوى الثقة)

Degree of Confidence (Level of Confidence)

إن درجة الثقة أو مستوى الثقة هو احتمال ($1 - \alpha$) أن تكون فترة الثقة تحوي القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع قيد الدراسة، وعادة يعبر عنها كنسبة مئوية. أما α فهي نسبة الخطأ في التقدير وتسمى مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة. فمثلاً:

- إذا كانت $\alpha = 0.05$ حينها تكون درجة الثقة $1 - \alpha = 0.95$ أي 95%
- إذا كان مستوى الثقة 90% فإن مستوى المعنوية $\alpha = 10\%$
- أيضاً إذا كان مستوى الثقة 99% فإن مستوى المعنوية $\alpha = 1\%$

ومن هذه الخيارات الثلاثة، يعتبر مستوى الثقة 95% هو الأكثر انتشاراً لأنه يؤمن التوازن الأنسب بين الدقة الموضحة من خلال طول فترة الثقة والدقة الموضحة من خلال مستوى الثقة.

تذكرة:

$$\text{المتوسط الحسابي لعينة} =$$

$$\frac{\text{مجموع قيم البيانات}}{\text{عدد البيانات}}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

الانحراف المعياري لعينة:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

تذكرة:

المتوسط الحسابي للمجتمع


$$\mu = \frac{\sum x_i}{N}$$

الانحراف المعياري للمجتمع:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$


التوزيع الطبيعي

تعرفنا فيما سبق على بيان منحنى التوزيع الطبيعي، وعلمنا من خواص التوزيع الطبيعي ما يلي:



شكل (1)

- المتوسط الحسابي = الوسيط = المنسوب.
- يكون بيان المنحنى على شكل ناقوس (جرس) متماثل حول محوره ($x = \mu$).
- يمتد المنحنى من طرفيه إلى ∞ وإلى $-\infty$ (لا يقطع المحور الأفقي).
- المساحة تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح (وحدة مساحة).
- المستقيم الرأسى $x = \mu$ يقسم المساحة تحت المنحنى إلى منطقتين متماثلتين مساحة كل منها تساوى نصف (وحدة مساحة) كما في الشكل (1).



شكل (2)


منحنى التوزيع الطبيعي المعياري:

إذا كان المتوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي $0 = \mu$ والانحراف المعياري $1 = \sigma$ يسمى التوزيع الطبيعي **بالتوزيع الطبيعي المعياري**.
الشكل المرسوم يمثل بيان منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.
المستقيم $Z = 0$ هو محور التماثل للمنحنى. تأخذ Z قيمًا موجبة وتزداد جهة اليمين بينما تأخذ Z قيمًا سالبة وتنقص جهة اليسار.

القيمة الحرجة $Z_{\frac{\alpha}{2}}$

الشكل (3) المرسوم يبيّن منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.

- نعلم أن مساحة المنطقة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري تساوى الواحد (وحدة مساحة) والمحور الرأسى يقسم المنطقة تحت المنحنى إلى قسمين متطابقين مساحة كل منها تساوى $\frac{1}{2}$ وحدة مساحة. ومجموع مساحتى الجزئين باللون الأحمر معاً تساوى α وتكون مساحة كل جزء منها تساوى $\frac{\alpha}{2}$ وعليه تكون مساحة كل من الجزئين باللون الأخضر على جانبي المحور الرأسى $\frac{1-\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2}$ أي $\frac{1-\alpha}{2}$.




شكل (3)

- نعبر عن الحدين الرأسين بالرموز $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ و $-Z_{\frac{\alpha}{2}}$ حيث $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ يفصل المنطقة التي مساحتها $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيمن عن المنطقة التي مساحتها $\frac{1-\alpha}{2}$ من المستقيم $Z = 0$ ، بينما $-Z_{\frac{\alpha}{2}}$ يفصل المنطقة التي مساحتها $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيسر عن المنطقة التي مساحتها $\frac{1-\alpha}{2}$ من المستقيم $Z = 0$.

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{1-\alpha}{2}}, \quad -Z_{\frac{\alpha}{2}} = -Z_{\frac{1-\alpha}{2}}$$

إيجاد القيمة الحرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

لإيجاد قيمة $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ المناظرة لمساحة تحت المنحنى نحسب المساحة $\frac{1-\alpha}{2}$ التي تقع على يسار $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ ويمين الصفر أي في الفترة $[0, Z_{\frac{\alpha}{2}}]$ ثم نكشف عنها في الجدول المرفق في نهاية الوحدة صفحة 194 حيث




شكل (4)

العمود الأول قيم Z ابتداءً من 0.0 وحتى 3.1 وأكثر. والصف الأول يمثل الأجزاء من المئة لقيم Z ، ومنه يمكن تحديد قيمة $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ وذلك بجمع قيمتي الصف والعمود Z .

مثال (1)

أوجد القيمة الحرجية $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ الم対اظرة لمستوى ثقة 95% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.



الحل:

$$\therefore \text{مستوى الثقة هو } 95\% \quad \therefore 1 - \alpha = 0.95 \quad \therefore \frac{1 - \alpha}{2} = \frac{0.95}{2} = 0.475$$

نأخذ جدول التوزيع الطبيعي المعياري (Z) صفحة 194

نبحث في الجدول عن 0.4750 فنجدتها على التفاصيل

الأفقي العمودي للعدادين على الترتيب: 1.9 ، 0.06

وبالتالي القيمة الحرجية هي:

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.9 + 0.06$$

$$\therefore Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

حاول أن تحل

1 أوجد القيمة الحرجية $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ الم対اظرة لمستوى ثقة 97% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

Margin of Error

Point Estimation Error

أولاً: الخطأ بالتقدير بنقطة

علمنا فيما سبق أنه يمكن استخدام المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي μ للمجتمع.

ومن المتوقع أن تكون قيمة المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} غير مساوية لقيمة المتوسط الحسابي μ للمجتمع.

تسمى القيمة المطلقة للفرق بين القيمتين السابقتين بالخطأ المعياري وتساوي $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ حيث σ الانحراف المعياري للمجتمع، n عدد قيم العينة (أو حجم العينة).

Interval Estimation Error

ثانياً: الخطأ بالتقدير بفترته

والآن نتعرض للخطأ بالتقدير بفترته فعندما نستخدم عينة لتقدير المتوسط الحسابي μ لمجتمع، يكون الخطأ في التقدير هو القيمة المطلقة لفرق بين المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} ، والمتوسط الحسابي μ للمجتمع.

هامش الخطأ E

عند استخدام بيانات عينة لتقدير المتوسط الحسابي μ لمجتمع، يكون هامش الخطأ، يرمز إليه بـ E ، القيمة العظمى الأكثـر ترجـحـاً عند درجة ثقة $(1 - \alpha)$ للفرق بين المتوسط الحسابي \bar{x} للعينة والمتوسط الحسابي μ للمجتمع.

يسمى أيضاً هامش الخطأ الأكبر في التقدير، ويمكن إيجاده بأخذ ناتج ضرب القيمة الحرجية $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ والخطأ المعياري $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

عند درجة ثقة $(1 - \alpha)$.

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

وحتى يكون الخطأ في التقدير أقل ما يمكن يجب أن تتحقق المتباينة:

$$|\bar{x} - \mu| < E$$

$$|\mu - \bar{x}| < E \quad \text{أي أن:}$$

$$-\bar{E} < \mu - \bar{x} < E$$

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

وعليه تكون فترة الثقة هي:

التقدير بفترة الثقة للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي

Confidence Interval Estimation for the Mean Value μ of Statistical Population

أولاً: إذا كان التباين σ^2 للمجتمع معلوم

إذا أخذت عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي (μ, σ^2) حيث تباعنه σ^2 معلوم وحجم العينة $n > 30$ أو $n \leq 30$ فإن تقدير فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ هو:

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E) \quad \text{عند درجة ثقة } (1 - \alpha)$$

حيث \bar{x} المتوسط الحسابي للعينة، E هامش الخطأ.

وتسمى القيمتان $\bar{x} - E, \bar{x} + E$ طرفي فترة الثقة.

ملاحظة: عند إيجاد فترة الثقة سنكتفي بدرجة الثقة 95% والتي تناظرها القيمة الحرجة $Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

(من جدول التوزيع الطبيعي المعياري).

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

إذا كانت σ^2 معلومة و $n > 30$ أو $n \leq 30$.

1 نوجد القيمة الحرجة $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ المناظرة لدرجة ثقة 95% وهي 1.96

2 نوجد هامش الخطأ $E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ، حيث σ هي الانحراف المعياري للمجتمع.

3 نوجد فترة الثقة $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.

تفسير فترة الثقة

عند اختيار عينات عشوائية مختلفة متساوية في الحجم (n) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95% من فترات الثقة هذه تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ).

فمثلاً عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n) وفي كل مرة نحسب \bar{x} وفترة الثقة فإننا نتوقع أن 95% فترات μ الحقيقة و5 فترات لا تحويها.

مثال (2)

أجريت دراسة لعينة من الإناث حول معدل النبض لديهن فإذا كان حجم عينة الإناث $n = 40$ والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = 12.5$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 76.3$. باستخدام مستوى ثقة 95%



١. أوجد هامش الخطأ.

٢. أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي لمجتمع الإحصائي لها.

٣. فسر فترة الثقة.

الحل:

١. مستوى الثقة 95% $\therefore Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

$$\therefore \text{نلاحظ أن } \sigma \text{ معلومة}$$

$$\therefore n = 40, \sigma = 12.5, \bar{x} = 76.3$$

$$E = 1.96 \times \frac{12.5}{\sqrt{40}}$$

$$E \approx 3.87379$$

٢. هامش الخطأ:

$\therefore \text{هامش الخطأ } \approx 3.8738$

٣. فترة الثقة هي:

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

$$= (76.3 - 3.8738, 76.3 + 3.8738)$$

$$= (72.4262, 80.1738)$$

٤. عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم ذات نفسه ($n = 40$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95% تتحوي القيمة الحقيقة للمتوسط الحسابي لمجتمع الإناث.

حاول أن تحل

٥. من المثال (2) إذا أجريت الدراسة على عينة أخرى من الإناث حجمها 25 والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = 3.6$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 18.4$

باستخدام مستوى ثقة 95%

٦. أوجد هامش الخطأ.

٧. أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي لمجتمع الإحصائي لها.

٨. فسر فترة الثقة.

ثانية: إذا كان التباين σ^2 لمجتمع غير معلوم وحجم العينة $n > 30$

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي لها

٩. نوجد القيمة الحرجة $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ المناظرة لدرجة ثقة 95% وهي 1.96

١٠. نوجد هامش الخطأ $E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$ ، حيث S هي الانحراف المعياري للعينة.

١١. نوجد فترة الثقة $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.

مثال (3)

عينة عشوائية حجمها 36، فإذا كان المتوسط الحسابي للعينة 60 وتبينها 16، باستخدام مستوى ثقة 95%

أوجد هامش الخطأ. 1

أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ . 2

فسّر فترة الثقة. 3

الحل:

حجم العينة: $n = 36$ ، المتوسط الحسابي: $\bar{x} = 60$

التبين: $S^2 = 16$ ، الانحراف المعياري: $S = 4$

• مستوى الثقة 95% 1

$$\therefore Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

$$n > 30 \text{ ، } \sigma^2 \text{ غير معلوم ، } \therefore$$

$$\begin{aligned} E &= Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \\ &= 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{36}} \\ &= 1.3066 \end{aligned}$$

\therefore هامش الخطأ ≈ 1.3067

فترة الثقة هي: 2

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

$$= (60 - 1.3067, 60 + 1.3067)$$

$$= (58.6933, 61.3067)$$

3 عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = 36$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95% تتحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

حاول أن تحل

3 أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها $n = 81$ ، ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 50$ ، وانحرافها المعياري $S = 9$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%.

أوجد هامش الخطأ. 1

أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ . 2

فسّر فترة الثقة. 3

ثالثاً: إذا كان التبین σ^2 للمجتمع غير معلوم وحجم العينة $n \leq 30$


إذا أخذت عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي تباینه σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n \leq 30$ فإن توزيع العينة لا يؤول إلى التوزيع الطبيعي وفي هذه الحالة يلزم منا استخدام توزيع آخر هو توزيع t للعينات الصغيرة التي حجمها $n \leq 30$ ويكون تقدير فترة الثقة $(1 - \alpha) t$ للمتوسط الحسابي μ هو $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.

حيث \bar{x} المتوسط الحسابي للعينة، E هامش الخطأ.

خواص التوزيع t

Properties of t Distribution


- 1 توزيع متماثل حول متوسطه الحسابي والذي يساوي صفرًا، ويمتد إلى ∞ من جهة اليمين وإلى $-\infty$ من جهة اليسار ويزداد قرباً من الصفر في الجهتين.
- 2 انحرافه المعياري أكبر من الواحد.
- 3 يعتمد هذا التوزيع على درجات الحرية والتي تساوي (حجم العينة - 1) أي $(n - 1)$.
- 4 التوزيع t يشبه التوزيع الطبيعي إلا أن قمته أكثر انخفاضاً من التوزيع الطبيعي.
- 5 كلما زادت درجات الحرية اقترب هذا التوزيع الطبيعي ويقترب انحرافه المعياري إلى الواحد الصحيح.



إيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع t

لإيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع t حيث يبين العمود الأول قيم درجات الحرية $(n - 1)$ وتبدأ من 1 إلى 30 وأكثر والصف الأول يمثل قيم $\frac{\alpha}{2}$ ومنه يمكن تحديد $t_{\frac{\alpha}{2}}$. لاحظ أن:

$$t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{1 - \frac{\alpha}{2}}$$



هامش الخطأ للمتوسط الحسابي E للمجتمع الإحصائي (في حالة σ^2 غير معروف، $n \leq 30$)

Margin of Error for Mean Value of Statistical Population where σ^2 is not known and $n \leq 30$

$$E = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

حيث S الانحراف المعياري للعينة

فترة الثقة للمتوسط الحسابي E للمجتمع الإحصائي (في حالة σ^2 غير معروف، $n \leq 30$)

Confidence Interval for Mean Value of Statistical Population where σ^2 is not known and and $n \leq 30$

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

الخطوات المتبعة لإيجاد فترات الثقة للمتوسط الحسابي E إذا كانت σ^2 غير معروفة، $n \leq 30$:

1. نوجد درجات الحرية $(n - 1)$.

2. نوجد القيمة الحرجة $t_{\frac{\alpha}{2}}$ المناظرة لدرجة ثقة 95% من جدول توزيع t .

3. نوجد هامش الخطأ $E = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$

4. نوجد فترات الثقة $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.

مثال (4)

أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها $n = 25$ ، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (S) يساوي 10 ومتوسطها الحسابي (\bar{x}) يساوي 15، استخدم مستوى ثقة 95% لإيجاد:

1 هامش الخطأ.

2 فتره الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

الحل:

$$n \leq 30 \quad \text{غير معلوم} , \quad 1$$

نستخدم توزيع t .

$$\therefore n = 25$$

$$n - 1 = 25 - 1 = 24$$

$$1 - \alpha = 95\%$$

درجات الحرية:

مستوى الثقة:

$$\therefore 1 - \alpha = 0.95 \implies \alpha = 0.050$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

من جدول توزيع t تكون قيمة $t_{0.025} = 2.064$ مناظرة للعدد 2.064

$$E = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \quad \text{هامش الخطأ}$$

$$= 2.064 \times \frac{10}{\sqrt{25}}$$

$$\therefore \text{هامش الخطأ} = 4.128$$

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

فتره الثقة:

$$= (15 - 4.128, 15 + 4.128)$$

$$= (10.872, 19.128)$$

حاول أن تحل

أوجد فتره ثقة 95% للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ علماً أن العينة أخذت من مجتمع طبيعي.

4

$$\text{إذا كان لدينا } \bar{x} = 8.4, S = 0.3, n = 13$$

اختبارات الفرض الإحصائية

Statistical Hypotheses Testing

دعنا نفك ونناقش

ينتاج مصنع نوعاً معيناً من المعلبات مسجل على العلبة أن الوزن الصافي g 200. فإذا تمأخذ عينة حجمها 100 علبة وتم حساب المتوسط الحسابي لأوزان هذه العينة فوجد أنه g 197.3، فهل يمكن الحكم على هذا المصنع بأنه يقوم بغض تجاري؟ ما هي حيثيات هذا الحكم؟

نحن نعلم أنه في كثير من الأحيان وفي مواقف معينة نحتاج إلى اتخاذ قرار بناء على معلومات محددة وحيثيات معقولة لها مبررها، لذلك دعت الضرورة إلى دراسة ما يسمى بالفرض الإحصائي واختبارات الفرض الإحصائية.

Statistic Hypothesis

تعريف: الفرض الإحصائي

هو ادعاء معين مبني على حيثيات معقولة حول معلومة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي لما أو الانحراف المعياري ٥.

تعريف: المقاييس الإحصائي

هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.

تعريف: اختبارات الفرض الإحصائية (اختبار المعنوية)

هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلومة من معالم المجتمع.

ملاحظة: سنكتفي في هذا الموضوع بدراسة معلومة واحدة من معالم المجتمع وهي المتوسط الحسابي لما.

إليك بعض الأمثلة عن الفرض التي يمكن اختبارها من خلال الطرق التي سنتورها في هذا الدرس. على سبيل المثال:

■ في إدارة الأعمال: تدعى إحدى الصحف في مقال لها أنّ معظم الموظفين يجدون عملاً عن طريق وكالات التوظيف.

■ في الطب: يدعى باحثون في الطب أنّ متوسط درجة حرارة جسم أي بالغ معافى ليست

.37°C

سوق تعلم

- القيمة الحرجية.
- مستوى المعنوية.
- درجة المعنوية.
- الفرض.
- اختبار الفرض.
- فرض العدم.
- الفرض البديل.

المفردات والمصطلحات:

- الفرض الإحصائي Statistic Hypothesis
- المقاييس الإحصائي Statistical Scale
- اختبارات الفرض الإحصائية Statistical Hypotheses Testing
- فرض العدم Null Hypothesis
- الفرض البديل Alternative Hypothesis

■ في سلامة الطيران المدني: تدعي إدارة الطيران المدني في الكويت أن متوسط وزن المسافر (مع حقائبه) يتعدّى الوزن المسموح منذ عشرين سنة والبالغ 84 kg

Null and Alternative Hypothesis

فرض العدم والفرض البديل

- فرض العدم (H_0): يفيد بأنّ قيمة معلمة المجتمع (مثل المتوسط الحسابي μ) تساوي قيمة مزعومة.
- نختبر فرض العدم مباشرةً أي نفترض بأنه صحيح ونتوصل إلى خلاصة بفرض أو عدم رفض H_0 .
- الفرض البديل (H_1): يفيد بأن للمعلمة قيمة تختلف نوعاً ما عن فرض العدم (H_0).
- يضم الشكل الرمزي للفرض البديل أحد هذه الرموز: $>$ أو $<$ أو \neq
- وستقتصر دراستنا على الحالة (\neq). فمثلاً: $H_0: \mu = 98.6$ ، $H_1: \mu \neq 98.6$


الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفرض الإحصائي:

- 1 صياغة الفروض الإحصائية (فرض العدم H_0 والفرض البديل H_1).
- 2 التحقق من الانحراف المعياري σ للمجتمع (معلوم أم غير معلوم) وتحديد حجم العينة (n) ومن ثم إيجاد المقياس الإحصائي للاختبار (Z أو t ، مسترشداً بالجدول التالي):

حجم العينة (n)	المقياس الإحصائي (Z أو t)	الانحراف المعياري (σ)
لا يشترط حجم معين للعينة	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	معلوم
$n > 30$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	
$n \leq 30$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	غير معلوم

- 3 تحديد مستوى المعنوية α وحساب القيمة الجدولية $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ من جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو القيمة الجدولية $t_{\frac{\alpha}{2}}$ من جدول t ذي درجات حرية.
- 4 تحديد منطقة القبول: $(Z_{\frac{\alpha}{2}}, -Z_{\frac{\alpha}{2}})$ أو $(t_{\frac{\alpha}{2}}, -t_{\frac{\alpha}{2}})$ كما هو موضح بالشكل.
- 5 اتخاذ القرار الإحصائي (قبول فرض العدم) أو (رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل).

ملاحظة: ستقتصر دراستنا على مستوى ثقة 95%.



إذا كان الانحراف المعياري σ لمجتمع معلوم

مثال (1)


ترى شركة أن متوسط رواتب موظفيها يساوي 4 000 دينار كويتي. إذا أخذت عينة من 25 موظفاً، ووجد أن متوسط رواتب العينة هو 3 950 ديناراً كويتاً فإذا علمت أن الانحراف المعياري للمجتمع (دیناراً) $\sigma = 125$ وضّح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي بمستوى ثقة 95%

الحل:

1 صياغة الفرض

$$H_1: \mu \neq 4000 \quad \text{مقابل} \quad H_0: \mu = 4000$$

$$\sigma = 125 \quad \therefore 2 \quad (\text{معلومة})$$



$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

\therefore نستخدم المقياس الإحصائي Z

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\therefore Z = \frac{3950 - 4000}{\frac{125}{\sqrt{25}}} = -2$$

3 \therefore مستوى الثقة 95%

$$\therefore \alpha = 0.05 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$\therefore Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

4 منطقة القبول هي $(-1.96, 1.96)$

5 اتخاذ القرار الإحصائي: $-2 \notin (-1.96, 1.96)$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 4000$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 4000$

حاول أن تحل



1 بيّنت الدراسة أن المتوسط الحسابي لقوة تحمل أسلاك معدنية هو

$$\mu = 1800 \text{ kg} \quad \text{مع انحراف معياري} \quad \sigma = 150 \text{ kg}$$

وبيّن الأخصائيون في المصنع المنتج لهذه الأسلاك أن بإمكانهم زيادة قوة تحمل هذه الأسلاك، وتأكيدها على ذلك تم اختبار عينة من 40 سلكاً

فتبين أن متوسط قوة تحمل هذه الأسلاك يساوي 1840 kg

هل يمكن قبول مثل هذا الفرض بمستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ؟

إذا كان الانحراف المعياري σ لمجتمع غير معلوم، $n > 30$

مثال (2)

$$n = 80 , \bar{x} = 37.2 , S = 1.79$$

اخبر الفرض بأن $\mu = 37$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$

الحل:

$$n = 80 , \bar{x} = 37.2 , S = 1.79$$

صياغة الفروض: 1

$$H_1: \mu \neq 37$$

$$H_0: \mu = 37$$

$n > 30$ غير معلومة، 2

نستخدم المقياس الإحصائي Z :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{37.2 - 37}{\frac{1.79}{\sqrt{80}}} = 0.999$$

$\therefore \alpha = 0.05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$ 3 تحديد مستوى المعنوية: α

$$\therefore Z_{0.025} = 1.96$$

منطقة القبول هي $(-1.96 , 1.96)$ 4

$$\therefore 0.999 \in (-1.96 , 1.96)$$

اتخاذ القرار الإحصائي: 5

القرار بقبول فرض العدم $\mu = 37$.

حاول أن تحل



متوسط العمر بالساعات لعينة من 100 مصباح كهربائي مصنعة في أحد المصانع $\bar{x} = 1570$ بانحراف معياري $S = 120$. 2

يقول صاحب المصنع إنًّا متوسط العمر بالساعات $\mu = 1600$ لل المصابيح المصنعة في المصنع.

اخبر صحة الفرض $\mu = 1600$ مقابل الفرض $\mu \neq 1600$ وباختيار مستوى معنوية $\alpha = 0.05$

إذا كان الانحراف المعياري σ لمجتمع غير معلوم، $n \leq 30$



مثال (3)

يعتقد مدير شركة دراسات إحصائية أن متوسط الإنفاق الشهري على الطعام في منازل مدينة معينة يساوي 290 ديناراً كويتياً.
فإذا أخذت عينة عشوائية من 10 منازل تبيّن أن متوسطها الحسابي (ديناراً) $S = 283 = \bar{x}$ وانحرافها المعياري (ديناراً) $S = 32$.

فهل يمكن الاعتماد على هذه العينة لتأكيد ما افترضه؟
استخدم مستوى ثقة 95% (علمًا بأن المجتمع يتبع توزيعًا طبيعيًا).

الحل:

$$n = 10, \quad \bar{x} = 283, \quad S = 32$$

1 صياغة الفروض

$$H_1: \mu \neq 290 \quad \text{مقابل} \quad H_0: \mu = 290$$

$$n = 10, \quad 10 < 30 \quad 2 \quad \sigma \text{ غير معلومة، } 10 < 30$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \quad \therefore \text{ نستخدم المقياس الإحصائي } t :$$

$$t = \frac{283 - 290}{\frac{32}{\sqrt{10}}}$$

$$t \approx -0.6917$$

$$n - 1 = 10 - 1 = 9 \quad \therefore n = 10 \quad 3 \quad \text{درجات الحرية:}$$

$$1 - \alpha = 0.95 \quad \text{مستوى الثقة 95%}$$

$$\alpha = 0.05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$\therefore t_{0.025} = 2.262 \quad \text{من جدول توزيع } t$$

$$4 \quad (-2.262, 2.262) \quad \text{منطقة القبول هي } (-2.262, 2.262)$$

$$5 \quad \text{اتخاذ القرار الإحصائي: } (-0.6917 \in (-2.262, 2.262)) \quad \therefore$$

$$\mu = 290 \quad \therefore \text{ القرار بقبول فرض العدم}$$



حاول أن تحل

في المثال (3)، إذا أجريت دراسة إحصائية أخرى على المدينة ذاتها وتبيّن من خلالها أن $S = 5, \bar{x} = 296$ لعينة من 10 منازل مع استخدام درجة الثقة نفسها.

فهل يبقى افتراض المدير عند الشركة صحيحًا أم لا؟ وضح إجابتك.

الارتباط والانحدار

Correlation and Regression

دعنا نفك ونناقش

هل تسألت يوماً: كيف تحسب العلاقة بين الطول والوزن؟
 ما الذي يربط بين التدخين والإصابة بمرض السرطان؟
 كيف نجد رابطاً بين وزن سيارة واستهلاكها للوقود؟
 كيف يتغير سعر الذهب مع تغير قيمة الدولار الأمريكي؟
 وما هي أفضل وسيلة للتقدير لتقرب من الحقيقة؟

Correlation

أولاً: الارتباط

من دراستنا السابقة تم عرض بعض المقاييس الإحصائية مثل مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابي - الوسيط - المتوسط) ومقاييس التشتت (المدى - التباين - الانحراف المعياري). نلاحظ أن هذه المقاييس كانت تصف شكل البيانات التي تم جمعها من ظاهرة إحصائية واحدة أي من متغير واحد والذي يمكن الحصول عليه من العينة. بينما يقابلنا في حياتنا العملية مواقف كثيرة تتضمن متغيرين (ظاهرتين) أو أكثر ويكون تساؤلنا: هل هناك علاقة بين هذه المتغيرات؟ وما هو شكل هذه العلاقة؟ وأيضاً كيف يمكن التنبؤ بقيمة أحد هذين المتغيرين إذا علم قيمة المتغير الآخر؟ وكثيراً ما يرى الباحثون ضرورة دراسة العلاقة بين متغيرين (ظاهرتين) كما يتضح من الأمثلة التالية:

- الطول والوزن.

■ التدخين والإصابة بمرض السرطان.

■ وزن سيارة واستهلاكها للوقود.

■ الإنفاق والدخل.

■ سعر السلعة والكمية المعروضة منها.

■ العمر وضغط الدم.

والأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتنوعة ولدراسة العلاقة بين هذه الظواهر ندرس ما يسمى الارتباط.

تعريف

الارتباط هو العلاقة بين متغيرين.

سوف تعلم

- مفهوم الارتباط وأنواعه.
- رسم مخطط الانشار.
- إيجاد معامل الارتباط الخطى.
- خواص معامل الارتباط.
- إيجاد معامل ارتباط بيرسون.
- مفهوم الانحدار.
- إيجاد معادلة خط الانحدار.
- تنبؤ قيمة أحد المتغيرين.
- التقدير باستخدام معادلة خط الانحدار.
- التنبؤ.
- إيجاد مقدار الخطأ.

المفردات والمصطلحات:

- Correlation
- ارتباط طردي
- Positive Correlation
- ارتباط عكسي
- Negative Correlation
- معامل الارتباط الخطى
- Linear Correlation
- Coefficient
- الانحدار
- معادلة خط الانحدار
- Regression Line
- Equation
- Prediction
- التنبؤ
- Error Value
- مقدار الخطأ

سنرمز للمتغير الأول بالرمز « x » وهو المتغير الذي يتم تحديده من قبل الباحث القائم بالدراسة ويسمى «بالمتغير المستقل».

ونرمز للمتغير الثاني بالرمز « y » وهذا المتغير غير مستقل بذاته لأن نتيجته مرتبطة بالمتغير المستقل ولذلك يسمى «بالمتغير التابع».

أنواع الارتباط

1 ارتباط طردي (موجب)

هو علاقة بين متغيرين y , x بحيث إذا تغير المتغير المستقل (x) فإن المتغير التابع (y) يتبعه في نفس الاتجاه.


2 ارتباط عكسي (سالب)

هو علاقة بين متغيرين y , x بحيث إذا تغير المتغير المستقل (x) فإن المتغير التابع (y) يتبعه في الاتجاه المضاد.

تذكرة:

مخيطط الانشار هو تمثيل بياني لعدد من الأزواج المرتبطة (x , y) يستخدم لوصف العلاقة بين المتغيرين.

بعض مخططات الانشار التي توضح أنواع الارتباط



مثال (1)

البيانات التالية تبيّن العلاقة بين عمر الشخص وعدد ساعات التمارين الرياضية التي يقوم بها:


العمر (x)	16	22	28	34	40	46	52
عدد ساعات التمارين (y)	8	7	5	2	3	$1\frac{1}{2}$	1

a. ارسم مخطط الانتشار.

b. حدد نوع العلاقة.

الحل:

a



b. العلاقة خطية عكسيّة.

حاول أن تحل

1 ارسم مخطط الانتشار للبيانات التالية وحدّد نوع العلاقة التي تعبّر عنها:

x	2	6	5	2	7	3	4	7	5
y	2	3	1	4	1	5	3	4	5

Linear Correlation Coefficient


معامل الارتباط الخطّي

تعلم أن الاستنتاجات المبنية على المعايير البصرية لمخطط الانتشار هي نسبة بامتياز، لذا فنحن بحاجة إلى قياسات أكثر دقة وموضوعية وبالتالي نستخدم معامل الارتباط الخطّي (r).

تعريف

معامل الارتباط الخطّي (r) هو عبارة عن مقياس عددي لقوّة العلاقة بين متغيرين يمثّلان بيانات كمية، حيث $-1 \leq r \leq 1$.

خواص مُعامل الارتباط (r)



١ $-1 \leq r \leq 1 , r \in [-1,1]$

إذا كانت $r = 1$ يكون الارتباط طردي (موجب) قوي.

إذا كانت $r = -1$ يكون الارتباط عكسي (سالب) قوي.

إذا كانت $r = 0$ ينعدم الارتباط.

إذا كانت $r \in [0.7, 1]$ يكون الارتباط طردي (موجب) قوي.

إذا كانت $r \in [0.5, 0.7]$ يكون الارتباط طردي (موجب) متوسط.

إذا كانت $r \in (0, 0.5)$ يكون الارتباط طردي (موجب) ضعيف.

إذا كانت $r \in (-0.5, 0)$ يكون الارتباط عكسي (سالب) ضعيف.

إذا كانت $r \in [-0.5, -0.7]$ يكون الارتباط عكسي (سالب) متوسط.

إذا كانت $r \in [-0.7, -1]$ يكون الارتباط عكسي (سالب) قوي.

Pearson Correlation Coefficient r :

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{nS_x \cdot S_y}$$

حيث: (الانحراف المعياري للمتغير x)
 $S_x = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n}}$

(الانحراف المعياري للمتغير y)
 $S_y = \sqrt{\frac{\sum(y - \bar{y})^2}{n}}$

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum(y - \bar{y})^2}}$$

مثال (2)

احسب مُعامل الارتباط الخطى للبيانات التالية وحدّد نوعه وقوته الارتباط.

x	1	2	3	4	5
y	3	5	7	9	11

الحل:

مُعامل الارتباط:

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum(y - \bar{y})^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = 3 , \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = 7$$

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
1	3	-2	-4	4	16	8
2	5	-1	-2	1	4	2
3	7	0	0	0	0	0
4	9	1	2	1	4	2
5	11	2	4	4	16	8
المجموع	$\Sigma x = 15$	$\Sigma y = 35$		$\Sigma(x - \bar{x})^2 = 10$	$\Sigma(y - \bar{y})^2 = 40$	$\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 20$

$$\therefore r = \frac{20}{\sqrt{10} \times \sqrt{40}} = 1$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) تام.

حاول أن تحل

x	1	2	3	4	5
y	1	-1	-4	-6	-5

احسب معامل الارتباط الخطى للبيانات التالية وحدّد نوعه وقوته الارتباط:

مثال (3)

صيغة أخرى لمعامل ارتباط بيرسون

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} \sqrt{n(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2}}$$

احسب معامل الارتباط الخطى للمتغيرين التاليين وبين نوعه وقوته.

x	1	2	3	4	5	6
y	4	7	8	3	5	5

: الحل

$$n = 6$$

x	y	xy	x^2	y^2
1	4	4	1	16
2	7	14	4	49
3	8	24	9	64
4	3	12	16	9
5	5	25	25	25
6	5	30	36	25
المجموع	$\Sigma x = 21$	$\Sigma y = 32$	$\Sigma xy = 109$	$\Sigma x^2 = 91$
				$\Sigma y^2 = 188$

$$r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} \sqrt{n(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2}}$$

$$r = \frac{6 \times 109 - 21 \times 32}{\sqrt{6 \times 91 - (21)^2} \sqrt{6 \times 188 - (32)^2}}$$

$$r = \frac{-18}{\sqrt{105} \times \sqrt{104}}$$

$r \approx -0.172$ ارتباط عكسي (سالب) ضعيف

x	1	2	3	4	5	6
y	98	99	75	40	100	150

حاول أن تحل

3 احسب معامل الارتباط الخططي للبيانات التالية وبيّن نوعه وقوته:

Regression

ثانياً: الانحدار

سوف نتعلم وصف العلاقة بين متغيرين بإيجاد معادلة الخط المستقيم الممثل لهذه العلاقة. يسمى هذا الخط المستقيم بخط الانحدار، وتسمى معادلته بمعادلة خط الانحدار.

تعريف

الانحدار هو وصف العلاقة بين متغيرين.

تعريف

معادلة خط الانحدار: هي المعادلة الخطية التي يمكن من خلالها التنبؤ بقيم أحد المتغيرين إذا علمت قيمة المتغير الآخر.

سبق لنا دراسة معادلة الخط المستقيم على الصورة: $y = b_1x + b_0$ حيث b_1 ترمز إلى ميل هذا المستقيم، $|b_0|$ ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات.

في الإحصاء توجد طرق متعددة لإيجاد معادلة خط انحدار مستقيم والتي تساعدننا في التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين ومنها الطريقة التالية:

تعريف

$\widehat{y} = b_0 + b_1x$ حيث $|b_0|$ ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات، b_1 ترمز إلى ميل المستقيم.

حيث: $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$ ، $b_1 = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$

حيث: $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$ ، $\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n}$

وهذا ما يسمى بـ **طريقة المربعات الصغرى** التي تتلخص خطواتها فيما يلي:

1 تعين قيمة b_1

2 تعين قيمة b_0

3 نكتب معادلة خط الانحدار: $\hat{y} = b_0 + b_1 x$

4 التنبؤ بقيمة y إذا علمت قيمة x

5 تحديد مقدار الخطأ في التنبؤ

$$\begin{aligned} \text{مقدار الخطأ} &= |\text{القيمة الجدولية} - \text{القيمة التي تحقق معادلة الانحدار}| \\ &= |y_x - \hat{y}_x| \end{aligned}$$

(4) مثال

x	1	3	5	7	9
y	2	5	9	10	14

باستخدام البيانات التالية لقيم y ، x :

أوجد:

a) معادلة خط الانحدار.

b) قيمة y عندما $x = 10$

c) مقدار الخطأ عندما $x = 5$

الحل:

a)

x	y	xy	x^2
1	2	2	1
3	5	15	9
5	9	45	25
7	10	70	49
9	14	126	81
المجموع	$\Sigma x = 25$	$\Sigma y = 40$	$\Sigma xy = 258$
			$\Sigma x^2 = 165$

$$n = 5 , \bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{25}{5} = 5 , \bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{40}{5} = 8$$

$$b_1 = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} = \frac{5 \times 258 - 25 \times 40}{5 \times 165 - 25 \times 25} = 1.45$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 8 - 1.45 \times 5 = 0.75$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x = 0.75 + 1.45x \quad \therefore \text{معادلة خط الانحدار هي:}$$

b) عندما $x = 10$ فإن:

$$y = 0.75 + 1.45 \times 10 = 15.25$$

من الجدول 9 c

من المعادلة:

\therefore مقدار الخطأ:

$$\hat{y} = 0.75 + 1.45 \times 5 = 8$$

$$|y_5 - \hat{y}_5| = |9 - 8| = 1$$

حاول أن تحل

من الجدول التالي: 4

أوجد:

معادلة خط الانحدار. a

قيمة y عندما $x = 10$ b


مقدار الخطأ عندما $x = 10$ c

x	4	5	8	9	10	12
y	2	4	5	8	6	11

مثال (5)

سقطت كرة من ارتفاع 50 m، وتم تسجيل المسافات (المتر) التي قطعتها هذه الكرة كل 0.5 s لمدة ثلاثة ثوان.

فأنت النتائج كما يوضح الجدول التالي:



الوقت (x)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
المسافة (y)	0	1.2	4.9	11	19.5	30.5	44

أوجد معادلة خط الانحدار. a

قدر قيمة المسافة y عندما $x = 4$ b

أوجد مقدار الخطأ في المسافة عندما $x = 2.5$ s c

الحل:

a

x	y	xy	x^2
0	0	0	0
0.5	1.2	0.6	0.25
1	4.9	4.9	1
1.5	11	16.5	2.25
2	19.5	39	4
2.5	30.5	76.25	6.25
3	44	132	9
المجموع		$\Sigma x = 10.5$	$\Sigma y = 111.1$
		$\Sigma xy = 269.25$	$\Sigma x^2 = 22.75$

$$n = 7 \quad , \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{10.5}{7} = 1.5 \quad , \quad \bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{111.1}{7} = 15.87$$

$$b_1 = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} = \frac{7 \times 269.25 - 10.5 \times 111.1}{7 \times 22.75 - (10.5)^2} = \frac{718.2}{49}$$

$$b_1 \approx 14.66$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$= 15.87 - 14.66 \times 1.5$$

$$= -6.12$$

معادلة خط الانحدار هي:

$$\therefore \hat{y} = -6.12 + 14.66x \quad \text{التبؤ: b}$$

∴ المسافة y عندما $x = 4$ هي:

$$\hat{y}_4 = -6.12 + 14.66 \times 4 = 52.52 \text{ m}$$

مقدار الخطأ عند $x = 2.5 \text{ s}$ c

$$\hat{y} = -6.12 + 14.66x \quad \text{من المعادلة:}$$

$$\hat{y}_{2.5} = -6.12 + 14.66 \times 2.5 = 30.53 \quad \text{نجد أن:}$$

من الجدول عند $x = 2.5 \text{ s}$

نجد أن: $y = 30.5 \text{ s}$

∴ مقدار الخطأ:

$$|y_x - \hat{y}_x|$$

$$= |30.5 - 30.53|$$

$$= 0.03$$

حاول أن تحل

- 5 في الجدول التالي، المتغير x هو تكلفة إنتاج فيلم سينمائي (بملايين الدولارات) والمتغير y هو مردود هذا الفيلم.

التكلفة (x)	62	90	50	35	200	100	95
المردود (y)	65	64	48	57	601	146	47

a أو جد معادلة خط الانحدار.

b قدر مردود فيلم بلغت تكلفته 55 مليون دولار.

c أو جد مقدار الخطأ لفيلم بلغت تكلفته 90 مليون دولار.



المرشد لحل المسائل

نظراً لأهمية المياه بالنسبة إلى صحة الإنسان وحياته، قررت مؤسسة تعنى بذلك، القيام بحملة تهدف إلى التأكد من أن كل شخص يستهلك متوسط قدره 2000 ml يومياً من مياه الشرب.

في دراسة سابقة لعينة من 100 شخص، لاحظت المؤسسة أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $1850 \text{ ml} = \bar{x}$ مع انحراف معياري $S = 900 \text{ ml}$.

وفي دراسة جديدة لعينة من 100 شخص، وبعد القيام بحملتها، لاحظت أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $1900 \text{ ml} = \bar{x}$ مع انحراف معياري $S = 300 \text{ ml}$.

اعتقدت المؤسسة أن حملتها قد نجحت بما أن المتوسط الحسابي للاستهلاك قد ازداد 50 ml وقد اقترب كثيراً من هدفها وهو 2000 ml يومياً للشخص الواحد.

هل المؤسسة على حق؟ اشرح.

الحل:

وضع يوسف جدولًا ليختبر فرضية الشركة من خلال اختبارات إحصائية مع:

$$H_0: \mu = 2000 \quad \text{مقابل} \quad H_1: \mu \neq 2000 \quad \text{ومستوى الثقة } 0.95$$

الدراسة الجديدة	الدراسة السابقة	المعايير
$\bar{x} = 1900, S = 300, n = 100$	$\bar{x} = 1850, S = 900, n = 100$	القيمة الجدولية
$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$	$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$	قيمة الاختبار الإحصائي
$Z = \frac{1900 - 2000}{\frac{300}{\sqrt{100}}} = -3.33$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{S} = \frac{1850 - 2000}{\frac{900}{\sqrt{100}}} = -1.66$	الفترة
$(-1.96, 1.96)$	$(-1.96, 1.96)$	القرار
$\because -3.33 \notin (-1.96, 1.96)$ رفض H_0 والأخذ به: $H_1: \mu \neq 2000 \text{ ml}$	$\because -1.66 \in (-1.96, 1.96)$ قبول $H_0: \mu = 2000 \text{ ml}$	

الاستنتاج:


لم تكن الحملة ضرورية، والحصول على قيمة متوسطة أكبر لا يعني الاقتراب من الهدف المنشود.

مسألة إضافية

قامت مؤسسة أخرى بحملة على عينة من 100 شخص تهدف إلى التأكد من أن المتوسط الحسابي للاستهلاك كل شخص لمياه الشرب $\mu = 2000 \text{ ml}$ يومياً. فأدت النتائج على الشكل التالي:

$\bar{x} = 2100 \text{ ml}, S = 800 \text{ ml}$. برأيك، هل كانت حملة هذه المؤسسة ناجحة؟

مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة



ملخص

- المعلمة هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالمتوسط الحسابي \bar{x} أو الانحراف المعياري s .
- الإحصاء هو اقتران تعين قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي \bar{x} أو الانحراف المعياري لها s .
- تقدير المعلمة: هو إحصاء تعتمد على قيم العينة وتعكس قيمة قريبة لمعلمة المجتمع ككل وتوزيعه.
- التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.
- فترة الثقة هي فتره طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى درجة الثقة (مستوى الثقة).
- التقدير بفتره الثقة: هو إيجاد فتره معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو احتمال معين.
- α هي نسبة الخطأ في التقدير وتسمى مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة.
- $(1 - \alpha)$ هي درجة الثقة (مستوى الثقة).
- $Z_{\frac{\alpha}{2}}$ هي القيمة الحرجية المستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.
- \bar{x} هو المتوسط الحسابي للعينة.

- σ هو الانحراف المعياري للعينة.
- $t_{\frac{\alpha}{2}}$ هي القيمة الحرجية المستخرجة من جدول التوزيع t .
- هامش الخطأ $E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ في حالة الانحراف المعياري σ معلوم والتوزيع الطبيعي.
- فترة الثقة هي: $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.
- الفرض الإحصائي: هو ادعاء معين مبني على حيئيات معقولة حول معلوم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .
- المقاييس الإحصائي هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.
- اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية) هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلوم المجتمع.
- الارتباط هو العلاقة بين متغيرين.
- ارتباط طردي (موجب): هو علاقة بين متغيرين y, x بحيث إذا تغير المتغير المستقل (x) فإن المتغير التابع (y) يتبعه في نفس الاتجاه.
- ارتباط عكسي (سالب): هو علاقة بين متغيرين y, x بحيث إذا تغير المتغير المستقل (x) فإن المتغير التابع (y) يتبعه في الاتجاه المضاد.
- معامل الارتباط الخطي (r) هو عبارة عن مقاييس عددي لقوّة العلاقة بين متغيرين يمثلان بيانات كمية حيث $-1 \leq r \leq 1$

خواص معامل الارتباط (r)

- 1 إذا كانت $r = 1$ يكون الارتباط **طردي (موجب)** قوي.
- 2 إذا كانت $r = -1$ يكون الارتباط **عكسى (سالب)** قوي.
- 3 إذا كانت $r = 0$ ينعدم الارتباط.
- 4 إذا كانت $r \in [0.7, 1]$ يكون الارتباط **طردي (موجب)** قوي.
- 5 إذا كانت $r \in [0.5, 0.7]$ يكون الارتباط **طردي (موجب)** متوسط.
- 6 إذا كانت $r \in (0, 0.5)$ يكون الارتباط **طردي (موجب)** ضعيف.
- 7 إذا كانت $r \in (-0.5, 0)$ يكون الارتباط **عكسى (سالب)** ضعيف.
- 8 إذا كانت $r \in [-0.5, -0.7]$ يكون الارتباط **عكسى (سالب)** متوسط.
- 9 إذا كانت $r \in [-0.7, -1]$ يكون الارتباط **عكسى (سالب)** قوي.


$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum(y - \bar{y})^2}} \quad \text{أو} \quad r = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} \sqrt{n(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2}}$$

- الانحدار هو وصف العلاقة بين متغيرين.
- معادلة خط الانحدار: هي المعادلة الخطية التي يمكن من خلالها التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين إذا علمت قيمة المتغير الآخر.

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x \quad \text{حيث} \quad b_1 = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad \text{أو} \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n} \quad \text{حيث} \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$


• مقدار الخطأ = $|y_x - \hat{y}_x| = |\text{القيمة الجدولية} - \text{القيمة من معادلة الانحدار}|$



جدول التوزيع الطبيعي المعياري (Z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.10 وأكثر	0.4999									

ملاحظة: استخدم 0.4999 عندما تزيد قيمة Z عن 3.09



جدول التوزيع t

درجات الحرية ($n - 1$)	$\frac{\alpha}{2}$					
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.25
1	63.657	31.821	12.706	6.314	3.078	1.000
2	9.925	6.965	4.303	2.920	1.886	0.816
3	5.841	4.541	3.182	2.353	1.638	0.765
4	4.604	3.747	2.776	2.132	1.533	0.741
5	4.032	3.365	2.571	2.015	1.476	0.727
6	3.707	3.143	2.447	1.943	1.440	0.718
7	3.500	2.998	2.365	1.895	1.415	0.711
8	3.355	2.896	2.306	1.860	1.397	0.706
9	3.250	2.821	2.262	1.833	1.383	0.703
10	3.169	2.764	2.228	1.812	1.372	0.700
11	3.106	2.718	2.201	1.796	1.363	0.697
12	3.054	2.681	2.179	1.782	1.356	0.696
13	3.012	2.650	2.160	1.771	1.350	0.694
14	2.977	2.625	2.145	1.761	1.345	0.692
15	2.947	2.602	2.132	1.753	1.341	0.691
16	2.921	2.584	2.120	1.746	1.337	0.690
17	2.898	2.567	2.110	1.740	1.333	0.689
18	2.878	2.552	2.101	1.734	1.330	0.688
19	2.861	2.540	2.093	1.729	1.328	0.688
20	2.845	2.528	2.086	1.725	1.325	0.687
21	2.831	2.518	2.080	1.721	1.323	0.686
22	2.819	2.508	2.074	1.717	1.321	0.686
23	2.807	2.500	2.069	1.714	1.320	0.685
24	2.797	2.492	2.064	1.711	1.318	0.685
25	2.787	2.485	2.060	1.708	1.316	0.684
26	2.779	2.479	2.056	1.706	1.315	0.684
27	2.771	2.473	2.052	1.703	1.314	0.684
28	2.763	2.467	2.048	1.701	1.313	0.683
29	2.756	2.462	2.045	1.699	1.311	0.683
30 و أكثر	2.575	2.327	1.960	1.645	1.282	0.675

ALGEBRA

الجبر

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad , \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a > 0$:

$$|x| = a : x = a \quad \text{أو} \quad x = -a$$

$$|x| < a : -a < x < a$$

$$|x| > a : x > a \quad \text{أو} \quad x < -a$$


GEOMETRY

الهندسة

Triangle

$$A = \frac{1}{2}bh$$


$$= \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



Circle

$$A = \pi r^2$$


$$C = 2\pi r$$



Sector of Circle

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

$$s = r\theta \quad (\theta \text{ in radians})$$



Sphere


$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A = 4\pi r^2$$



Cylinder


$$V = \pi r^2 h$$



Cone

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$



TRIGONOMETRY

علم المثلثات

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$


$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$



$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{1-\alpha}{2}} ; -Z_{\frac{\alpha}{2}} = -Z_{\frac{1-\alpha}{2}}$$

(القيمة الحرجة)

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(الخطأ المعياري للمجتمع)

$$E = Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(هامش الخطأ - توزيع طبيعي)

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

فترة الثقة للمتوسط الحسابي

$$t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

(التوزيع t)

$$E = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

(هامش الخطأ - توزيع t الانحراف المعياري σ غير معروف)

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

(المقياس الإحصائي - توزيع طبيعي)

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

(المقياس الإحصائي - توزيع طبيعي - الانحراف المعياري σ غير معلوم)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

(المقياس الإحصائي - توزيع t - الانحراف المعياري σ غير معروف)

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

(معامل ارتباط بيرسون)

$$\hat{y} = b_1 x + b_0$$

(معادلة خط الانحدار)

$$b_1 = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}, \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

حيث

$$|y_x - \hat{y}_x| =$$

مقدار الخطأ

تطرح سلسلة الرياضيات مواقف حياتية يومية، وتؤمن فرص تعلم كثيرة. فهي تعزز المهارات الأساسية، والحسن العددي، وحل المسائل، والجهوزية لدراسة الجبر، والهندسة، وتنمي مهاراتي التعبير الشفهي والكتابي ومهارات الفكر في الرياضيات. وهي تتكمّل مع المواد الدراسية الأخرى ف تكون جزءاً من ثقافة شاملة متماضكة تحفز الطلاب على اختلاف قدراتهم وتشجّعهم على حبّ المعرفة.

تتكون السلسلة من:

- كتاب الطالب
- كتاب المعلم
- كراسة التمارين
- كراسة التمارين مع الإجابات



PEARSON
Scott
Foresman