



وزارة التربية
منطقة حولي التعليمية
ثانوية فهد الدويري بنين

ثانوية فهد الدويري بنين قسم الكيمياء والفيزياء



أوراق عمل كيمياء الصف الثاني عشر

(١٢)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



اسم الطالب /

الصف /

إعداد

أ / هاني نوح

مدير المدرسة

أ / معاذ التوره

الموجه الفني

أ / عيسى القلاف

رئيس القسم

أ / معتز محمد

متابعة الأعمال التحريرية

اسم الطالب / الصف / ١١ /

التاريخ	التوقيع	ملاحظات

مواعيد الاختبارات القصيرة

الاختبار	اليوم	التاريخ	الصفحات	
			من	إلى

فروض النظرية الحركية للغازات

السؤال الأول :- اكمل جدول المقارنة التالي

م	حالة المادة ← وجه المقارنة ↓	المادة الصلبة	المادة السائلة	المادة الغازية
١	الشكل			
٢	الحجم			
٣	حركة الجسيمات			
٤	قوة التماسك			

السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

١- جميع العبارات التالية صحيحة بالنسبة للنظرية الحركية للغاز ، عدا واحدة منها ، وهي :

() تصادم جسيمات الغاز مرن

() حركة جسيمات الغاز عشوائية

() الضغط على جدران الوعاء ناتج عن قوى التجاذب بين جسيمات الغاز

() متوسط طاقة حركة الجسيمات يتناسب طردياً مع درجة الحرارة المطلقة

٢- أي من الجمل التالية لا تتفق مع فرضيات النظرية الحركية للغازات :

() جسيمات الغاز صغيرة للغاية بالمقارنة مع المسافات التي تفصل بينها

() تفقد جسيمات الغاز جزءاً من طاقتها الكلية نتيجة التصادمات التي تحدثها

() لا تتجاذب جزيئات الغاز أو تتنافر مع بعضها

() متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز عند درجة حرارة معينة ثابتة

٣- عند خفض درجة الحرارة المطلقة لغاز مثالي إلى النصف فإن طاقة حركة الجسيمات

() تزداد إلى الضعف () تقل إلى النصف

() تقل إلى الثلث () لا تتغير

٤- المتغير الذي يعبر عن متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز هو :

() عدد المولات () الضغط () درجة الحرارة () الحجم

السؤال الثالث : - املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- (١) تعتمد فكرة عمل الوسائد الهوائية على خاصية ----- الغاز بسبب وجود الفراغ الحر بين جسيماته .
- (٢) تمتاز الوسائد الهوائية في السيارات بقدرتها على امتصاص الطاقة الناتجة عن الصدمات أثناء الحوادث ذلك لأن الغازات -----
- (٣) متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز تتناسب ----- مع درجة الحرارة المطلقة (كلفن)
- (٤) تفترض النظرية الحركية للغازات أن التصادمات بين جسيمات الغاز ----- تماماً

السؤال الرابع : - ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية ؟ وما السبب

١- لعبة الرذاذ عند تسخينها

الحدث : -----

السبب : -----

٢ - للوسائد الهوائية المستخدمة في السيارات عند حدوث اصطدامات ناتجة عن الحوادث :

الحدث : -----

السبب : -----

السؤال الخامس : - علل لما يأتي ؟

١- حجوم جسيمات الغاز غير مهمة (مهمة) بالنسبة لحجم الإناء الذي تشغله هذه الجسيمات

٢- الغازات لها القابلية للانضغاط وتتشكل بشكل الإناء الحاوي لها

٣ - تتحرك جسيمات الغاز بحرية داخل الأوعية التي تشغلها ويأخذ شكل الوعاء الذي يحويه ويساوي حجمه أو الغازات تتميز بخاصية الانتشار .

٤- الكمية الكلية للطاقة الحركية لجزيئات الغاز تظل ثابتة أثناء الاصطدام .

٥ - تحدث جسيمات الغاز ضغطاً على جدار الوعاء الحاوي لها .

المتغيرات التي تصف سلوك الغاز

السؤال الأول :- اكمل الجدول التالي

م	المتغير	وحدة القياس
١		
٢		
٣		
٤		

السؤال الثاني :- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١ - العوامل المؤثرة في ضغط الغاز هي و و
- ٢ - عند زيادة كمية الغاز في حجم معين عند ثبوت درجة الحرارة فإن ضغط الغاز
- ٣ - إطار سيارة يحتوي 20 mol من الغاز ضغط الغاز بداخله (200KPa) زادت كمية الغاز بداخله إلى 25 mol فإن ضغط الغاز بداخله يصبح KPa
- ٤ - ضغط الغاز داخل وعاء ذي حجم ثابت عند درجة حرارة ثابتة يقل كلما عدد جسيمات الغاز

السؤال الثالث :- ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارة التالية

- عند زيادة درجة حرارة كمية معينة من غاز من 20°C إلى 40°C فإن ضغط يزداد للضعف مع بقاء الحجم ثابت .
()

السؤال الرابع :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١ - جميع ما يلي يعمل على زيادة ضغط الغاز ما عدا
() ثبات حجم الغاز ودرجة الحرارة المطلقة له وزيادة عدد جسيماته
() ثبات درجة الحرارة المطلقة للغاز وزيادة عدد جسيماته
() ثبات حجم الإناء ورفع درجة الحرارة المطلقة للغاز
() خفض درجة الحرارة المطلقة للغاز وزيادة حجم الإناء
- ٢ - عند ثبات درجة حرارة الغاز وحجمه، فإن مضاعفة عدد جسيمات الغاز تؤدي إلى :
() مضاعفة الضغط
() زيادة الضغط أربعة أضعاف
() نقصان الضغط
() لا يتأثر الضغط
- ٣ - جميع التغيرات التالية تؤدي إلى خفض ضغط الغاز، عدا واحداً منها وهي :
() زيادة حجم الوعاء وخفض درجة الحرارة
() تقليل عدد مولات الغاز وخفض درجة الحرارة
() زيادة حجم الوعاء وتقليل عدد مولات الغاز
() تقليل حجم الوعاء وزيادة درجة الحرارة

السؤال الخامس : - ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية ؟ وما السبب

١ - زيادة كمية من الغاز في اناء له حجم ثابت وعند درجة حرارة ثابتة (بالنسبة للضغط)

الحدث :

السبب :

٢ - تبريد كمية من الغاز عند ثبات كمية الغاز وعدد المولات (بالنسبة للضغط)

الحدث :

السبب :

٣ - وضع أكياس البطاطا الجاهزة في أماكن تصلها الشمس

الحدث :

السبب :

٤ - إذا سمح للهواء بالخروج من الإطار المطاطي للسيارة

الحدث :

السبب :

٥ - لحجم البالون عندما يتم إخراجه في طقس بارد

الحدث :

السبب :

الفصل الثاني: قوانين الغاز

أولاً : قانون بويل

السؤال الأول :- اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية

١ - يتناسب الحجم الذي تشغله كمية معينة من الغاز تناسباً عكسياً مع ضغط الغاز عند درجة حرارة ثابتة .

(.....)

٢ - احد قوانين الغازات يوضح العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبات درجة الحرارة وكمية الغاز .

(.....)



السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

١ - الرسم البياني المقابل يعبر عن احد قوانين الغازات وهو

() قانون تشارلز () قانون جاي لوساك () قانون بويل () القانون الموحد للغازات

٢- وضعت كمية محددة من غاز الهيدروجين في إناء له نصف حجمه الأصلي عند (25 °C) فإن ضغط الغاز


() لا يتغير () يقل إلى الربع () يقل إلى النصف () يزداد إلى الضعف

٣- إذا تغيّر حجم غاز من (4 L) إلى (1 L) مع ثبات درجة الحرارة فإن الضغط :

() لا يتغير () يقل إلى الربع () يزداد إلى الضعف () يزداد إلى أربعة أمثال

٤- تأمل كل رسم مما يلي ثم اختر الإجابة المناسبة لكل سؤال مما يلي :

أ - الرسم المقابل يمثل أنبوبة شعرية بها زئبق يحبس كمية من الهواء فيكون ضغط الهواء المحبوس يساوي




() الضغط الجوي

() الضغط الجوي + ضغط عمود الزئبق

() الضغط الجوي - ضغط عمود الزئبق

() وزن عمود الزئبق

ب - من الرسم المقابل فإن ضغط الهواء المحبوس يساوي :




() الضغط الجوي

() الضغط الجوي + ضغط عمود الزئبق

() الضغط الجوي - ضغط عمود الزئبق

() وزن عمود الزئبق

ج - من الرسم المقابل فإن ضغط الهواء المحبوس يساوي :



() الضغط الجوي

() الضغط الجوي + ضغط عمود الزئبق

() الضغط الجوي - ضغط عمود الزئبق

() وزن عمود الزئبق

السؤال الثالث :- املاً الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

١- عند زيادة حجم كمية معينة من غاز داخل إناء فإن (P₁) تكون من (P₂) لهذا الغاز عند ثبات بقية المتغيرات

٢- إذا كان (P₁) أكبر من (P₂) لكمية من غاز داخل إناء ، فإن (V₂) تكون من (V₁) لهذا الغاز

٣- إذا كان حاصل ضرب (P₁V₁) لكمية معينة من غاز الهيدروجين يساوي (3050 kPa . L) عند ثبات درجة

الحرارة ، فإذا تغيّر حجم هذه الكمية إلى (50 L) فإن الضغط اللازم لذلك (P₂) يساوي kPa

السؤال الرابع :- حل المسائل التالية ؟

١ () يحتوي منطاد على (30 L) من غاز الهيليوم (He) عند ضغط (103 kpa) على ارتفاع معين. ما حجم غاز الهيليوم عندما يصعد المنطاد إلى ارتفاع يصل الضغط فيه إلى (25 kpa) فقط ؟
(افترض أن درجة الحرارة تظل ثابتة).

٢ - يتغير ضغط (2.5 L) من غاز التخدير من (105 kPa) إلى (40.5 kPa). احسب الحجم الجديد عند ضغط (40.5 kPa) مع افتراض ثبات درجة الحرارة.

٣ - احسب حجم الغاز (باللتر) عند ضغط (100 kPa)، إذا كان حجمه (1.5×10^3 mL) عند (130 kPa) ؟

٤ - كمية من غاز التخدير عند ضغط (105 kPa) حجمها (2.5 L) عند زيادة الضغط عليها أصبح حجمها (3.5 L) احسب الضغط المؤثر على الغاز عند الحجم الجديد مع افتراض ثبات درجة الحرارة.

ثانياً : قانون تشارلز

السؤال الأول :- اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية

- ١ - يتناسب الحجم الذي تشغله كمية معينة من الغاز تناسباً طردياً مع درجة الحرارة المطلقة عند ثبات الضغط.
(.....)
- ٢ - احد قوانين الغازات يوضح العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة المطلقة عند ثبات الضغط وكمية الغاز .
(.....)
- ٣ - أقل درجة حرارة ممكنة التي تساوي عندها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز "صفرًا" نظرياً.
(.....)

السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١- عند مضاعفة درجة الحرارة المطلقة على كمية من غاز مثالي تحت ضغط ثابت فإن حجمها :
() لا يتغير () يقل إلى الربع () يقل إلى النصف () يزداد إلى الضعف
- ٢- درجة الحرارة التي تساوي عندها متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز صفرًا عند ثبوت الضغط هي :
100 K () - 273°C () - 273K () 0 °C ()


السؤال الثالث :- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١- عند رفع درجة حرارة كمية معينة من غاز داخل إناء فإن (V_1) تكون من (V_2) لهذا الغاز عند ثبوت الضغط
- ٢- إذا كان (T_1) أكبر من (T_2) لكمية من غاز داخل إناء فإن (V_2) تكون..... من (V_1) لهذا الغاز عند ثبوت P
- ٣- إذا كان ناتج قسمة (V_1 / T_1) لكمية معينة من غاز النيتروجين يساوي (0.2 L / K) عند ثبوت الضغط ، فإذا تغير حجم هذه الكمية إلى (120 L) فإن درجة الحرارة اللازمة لذلك (T_2) تساوي °C

السؤال الرابع :- أ) باستخدام قوانين الغازات عند استخدام كمية معينة من الغاز أكمل الناقص :-

المعطيات والثوابت	$P_2 = 2P_1$ عند ثبوت درجة الحرارة وكمية الغاز	$T_2 = 4T_1$ عند ثبوت الضغط وكمية الغاز
المطلوب	$V_2 = \dots\dots\dots V_1$	$V_1 = \dots\dots\dots V_2$

السؤال الخامس :- العلاقة البيانية المقابلة تمثل أحد القوانين التي تمثل سلوك الغاز المثالي



- المطلوب : ١- الصيغة الرياضية للقانون
- ٢- ماذا تستنتج من العلاقة البيانية
- ٣- تتقاطع الخطوط البيانية التي تمثل العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة عند درجة حرارة تساوي والتي تسمى

السؤال السادس :- حل المسائل التالية :-

١ - نفخ بالون حجمه (4 L) عند درجة حرارة (24 °C). ثم سخن البالون إلى درجة حرارة (58 °C). ما الحجم الجديد للبالون مع بقاء الضغط ثابتاً.

٢- تشغل عينة غاز (6.6 L) عند درجة حرارة (325 °C). احسب درجة الحرارة السيليزية عندما يصبح الحجم (3.4 L) مع بقاء الضغط ثابتاً ؟

٣- تشغل عينة الهواء (5 L) عند درجة حرارة (50 °C -) ما الحجم الذي ستشغله عند درجة حرارة (100 °C) مع بقاء الضغط ثابتاً؟

ثالثاً : قانون جاي - لوساك

السؤال الأول:- أجب عن السؤال التالي :


* الجدول التالي يوضح نتائج تجربة لدراسة العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة حرارته المطلقة عند ثبوت الحجم

رقم التجربة	الضغط (P) كيلو باسكال	درجة الحرارة المطلقة (T)
1	100	300
2	200	600
3	300	900
4	600	؟

- المطلوب : ١ - ما القانون الذي تمثله النتائج السابقة
- ٢ - ما هي العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة المطلقة
- ٣ - احسب مقدار الثابت (K) :
- ٤ - اكتب نص القانون
- ٥ - احسب درجة الحرارة السيليزية للغاز عند ضغط (600 kPa)

السؤال الثاني - ضع علامة (√) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١ - عند مضاعفة درجة الحرارة المطلقة على كمية من غاز مثالي تحت حجم ثابت ، فإن ضغطها :
() لا يتغير () يقل إلى الربع () يقل إلى النصف () يزداد إلى الضعف
- ٢ - كمية من الهواء في إناء مغلق تحت ضغط (103.1 kPa) ودرجة حرارة (300 K) ، فإذا سخنت إلى (600 K) وبفرض ثبوت الحجم فإن ضغطها :
() لا يتغير () يقل إلى الربع () يقل إلى النصف () يزداد إلى الضعف
- ٣ - الرسم البياني المقابل يعبر عن احد قوانين الغازات وهو
() قانون تشارلز () قانون جاي لوساك
() قانون بويل () القانون الموحد للغازات



السؤال الثالث:- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١ - عند خفض درجة حرارة غاز داخل إناء فإن (P₁) تكون من (P₂) لهذا الغاز عند ثبوت الحجم
- ٢ - إذا كان (T₁) أكبر من (T₂) لكمية من غاز داخل إناء فإن (P₂) تكون من (P₁) لهذا الغاز عند ثبوت V
- ٣ - إذا كان ناتج قسمة (P₁ / T₁) لكمية معينة من غاز الأكسجين يساوي (2 kPa / K) عند ثبوت الحجم ، فإذا تغير ضغط هذه الكمية إلى (300 kPa) فإن درجة الحرارة اللازمة لذلك (T₂) تساوي °C

السؤال الرابع :- حل المسائل التالية (حل في الصفحة المقابلة)

- ١ - إذا كان ضغط غاز ما (2.58 kPa) عند درجة حرارة (539 K)، فكم يبلغ ضغطه عند درجة حرارة (211 K) مع إبقاء الحجم ثابتاً ؟
- ٢ - ضغط الهواء في إطار سيارة هو (198 kPa) عند درجة حرارة (27 °C). وفي نهاية رحلة في يوم مشمس حار، ارتفع الضغط إلى (225 kPa). ما درجة حرارة الهواء داخل إطار السيارة. (بفرض أن الحجم لم يتغير) ؟
- ٣ - ضغط الغاز في وعاء مغلق (300 kPa) عند درجة حرارة (30 °C). احسب الضغط إذا انخفضت درجة الحرارة إلى (-172 °C) ؟ (بفرض أن الحجم لم يتغير) ؟

رابعاً : القانون الموحد للغازات

السؤال الأول :- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

١ - الصيغة الرياضية للقانون الموحد للغازات هي

٢ - القانون الموحد للغازات يبقى صالحاً فقط ما دامت لم تتغير

٣- تبلغ درجة حرارة الغاز عند الظروف القياسية

٤ - الضغط القياسي لكمية معينة من غاز ما تساوي

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

١- كمية معينة من غاز تشغل حجماً قدره (5 L) تحت ضغط (8.31 kPa) ودرجة حرارة

(300 K) عندما يصبح ضغطها (16.62 kPa) ودرجة حرارتها (600 K) ، فإن حجمها :

() لا يتغير () يقل إلى الربع

() يقل إلى النصف () يزداد إلى الضعف

٢- عينة من غاز ، إذا ضُوعف ضغطها وخُفضت درجة حرارتها المطلقة إلى النصف ، فإن حجمها

() يصبح أربع أمثال حجمها الأصلي () يصبح ضعف حجمها الأصلي

() يصبح نصف حجمها الأصلي () يصبح ربع حجمها الأصلي

٣- عينة من غاز ، إذا ضُوعفت درجة حرارتها المطلقة وخُفض ضغطها إلى النصف ، فإن حجمها :

() يصبح أربع أمثال حجمها الأصلي () يصبح ضعف حجمها الأصلي

() لا يتغير () يقل إلى الربع

٤ - الضغط القياسي لكمية معينة من غاز ما يساوي كل مما يأتي ما عدا

() 101.3 kPa () 1atm () 760 mHg () 760 mmHg

السؤال الثالث :- حل المسائل التالية (حل في الصفحة المقابلة)

١- إذا كان حجم بالون مملوء بالغاز يساوي (30 L) عند درجة حرارة (40 °C) وضغط

(153 kPa) ، فما هو حجم البالون عند الضغط ودرجة الحرارة القياسيين (STP)

٢ - يشغل غاز عند ضغط يساوي (155 kPa) ودرجة حرارة (25 °C) وعاء حجمه الأصلي (1 L) . يزداد

ضغط الغاز إلى (605 kPa) بفعل ارتفاع درجة الحرارة إلى (125 °C) ويتغير الحجم . احسب الحجم الجديد.

٣ - عينة هواء حجمها (5 L) عند درجة حرارة (50 °C -) وعند ضغط (107 kPa) . احسب

الضغط الجديد عند ارتفاع درجة الحرارة إلى (102 °C) وتمدد الحجم إلى (7 L) .

الدرس (2-2) قانون الغاز المثالي والنظرية الحركية

السؤال الأول قارن بين الغاز المثالي والغاز الحقيقي

الغاز الحقيقي	الغاز المثالي	
		(له وجود – افتراضي ليس له وجود)
		(يمكن إسأله – لا يمكن إسأله)
		يتبع قوانين الغازات (عند جميع الظروف – عند ظروف معينة)

السؤال الثاني :- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١ - يتناسب عدد مولات الغاز تناسباً مع حجم الغاز عند ثبات الضغط ودرجة الحرارة .
- ٢ - الحجم الذي يشغله المول الواحد من الغازات المختلفة عند الظروف القياسية من الضغط و درجة الحرارة يساوي L

السؤال الثالث :- حل المسائل التالية

- ١ - إذا قام عامل في شركة تعبئة الغاز بملء اسطوانة حجمها (20 L) بغاز النيتروجين (N_2) إلى أن يصبح ضغط الغاز (2×10^4 kPa) عند درجة ($28^\circ C$) فكم عدد مولات (N_2) التي ستحتويها هذه الاسطوانة؟ (اعتبر غاز N_2 غازاً مثالياً).

- ٢ - ما الضغط الذي يمارسه عدد مولات يساوي (0.45 mol) من غاز مثالي محبوس في دورق حجمه (0.65 L) عند درجة حرارة ($25^\circ C$)؟

- ٣ - سعة رئة طفل (2.18 L). ما هي كتلة الهواء الذي تتسع له رئة هذا الطفل عند ضغط (102 kPa) ودرجة حرارة الجسم المعتادة أي ($37^\circ C$)؟ الهواء خليط، لكن يمكن أن تفترض أن كتلته المولية المتوسطة قدرها (29 g/mol). [الحل : 2.5 g هواء]

- ٤ - ما الحجم الذي يشغله (12g) من غاز الأكسجين ($O_{2(g)}$) عند درجة حرارة ($25^\circ C$) وضغط (52.7 kPa) ؟ (Mwt. ($O_{2(g)}$) = 32 g/mol).

الدرس (2-3): الجسيمات الغازية : مخاليلها وحركتها

السؤال الأول :- اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية

- ١ - الحجم المتساوية من الغازات المختلفة عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما تحتوي على أعداد متساوية من الجسيمات. (.....)
- ٢ - الحجم الذي يشغله المول الواحد من الغازات المختلفة عند الظروف القياسية من الضغط و درجة الحرارة ويساوي (22.4 L) . (.....)

السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية

- ١ - إذا علمت أن ($C = 12$, $O = 16$) فإن الحجم الذي تشغله كتلة قدرها (11 g) من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في الظروف القياسية يساوي.
5.6 L () 22.4 L () 44.8 L () 11.2 L ()
- ٢ - الحجم الذي يشغله (10 g) من النيون ($Ne = 20$) في الظروف القياسية يساوي:
10 L () 11.2 L () 30 L () 22.4 L ()
- ٣ - ثلاث بالونات يُرمز لها بالرموز (a , b , c) يحتوي البالون (a) على (0.4 g) من الهيدروجين ، ويحتوي البالون (b) على (0.64 g) من الأكسجين ، ويحتوي البالون (c) على (0.56 g) من النيتروجين ، فإذا تعرضت البالونات الثلاث لنفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة ، ($H = 1$, $O = 16$, $N = 14$) ، فإن :
() حجوم البالونات الثلاثة تكون متساوية
() حجم البالون (a) اكبر من حجم البالون (b) .
() حجم البالون (b) اكبر من حجم البالون (c) .
() حجم البالون (c) اكبر من حجم البالون (a) .
- ٤ - عدد الجسيمات الموجودة في (2 L) من غاز الهيدروجين عدد الجسيمات الموجودة في (2 L) من غاز النيتروجين عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما .
() أكبر من () أقل من () يساوي () لا توجد إجابة صحيحة

السؤال الثالث :- حل المسائل التالية

- ١ - احسب الحجم (بالتر) الذي يشغله (0. 0.75 mol) من غاز ما عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة (STP).
- ٢ - ما عدد جزيئات غاز الأكسجين الموجودة في (3.36 L) من غاز الأكسجين عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة؟
- ٣ - ما الحجم الذي يشغله (4.02×10^{22} جزيئ) من غاز الهيليوم عند الظروف القياسية؟

٤ - احسب حجم وكتلة (0.25 mol) من غاز الهيدروجين ($H_2 = 2 \text{ g/mol}$) عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة (STP) ، ($R = 8.31$)

٥ - احسب كتلة وعدد جزيئات غاز الميثان التي توجد في وعاء حجمه (6.72 L) عند درجة حرارة (27°C) وضغط (202.6 kPa). ($R = 8.31$, $CH_4 = 16 \text{ g/mol}$).

٦ - ما حجم وكتلة (3×10^{23}) جزيء من غاز الأكسجين ($O=16$) عند درجة (20°C) وتحت ضغط (303.9 kPa). ($R = 8.31$).

٧ - ما أقصى درجة حرارة يمكن عندها تخزين أسطوانة تحتوي على (320 g) من غاز الأكسجين ($O = 16$) حجمها (20 L) إذا كان أقصى ضغط تتحمله هذه الأسطوانة (1350 kPa). ($R = 8.31$).

قانون دالتون للضغوط الجزئية

السؤال الأول :- اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية

- ١ - الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجماً مساوياً لحجم الخليط عند درجة الحرارة نفسها. (.....)
- ٢ - عند ثبات الحجم ودرجة الحرارة، يكون الضغط الكلي لخليط من عدة غازات لا تتفاعل مع بعضها يساوي مجموع الضغوط الجزئية للغازات المكونة للخليط. (.....)

السؤال الثاني : - علل لما يأتي

يجب أن يحمل متسلقو الجبال والطيارون الذين يبلغون ارتفاعات عالية امدادات أكسجين

السؤال الثالث :- املأ الفراغات في الجمل والعبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١- إناء حجمه (5.6 L) وضع فيه (0.5 mol) من غاز الهيدروجين ، (0.2 mol) من غاز النيتروجين ، فيكون حجم غاز الهيدروجين فقط في هذا الإناء يساوي L
- ٢- إناء حجمه (5.6 L) وضع فيه (0.5 mol) من غاز الهيدروجين ، (0.2 mol) من غاز النيتروجين ، فيكون حجم المخلوط في هذا الإناء يساوي L
- ٣- إناء حجمه (2 L) به غاز هيليوم تحت ضغط (81 kPa) ، وإناء آخر حجمه (1.2 L) به غاز الأكسجين تحت ضغط (162 kPa) فإذا تم نقل الغازين إلى إناء جديد حجمه (4 L) فإن حجم غاز الهيليوم يساوي L وحجم غاز الأكسجين يساوي L
- ٤- وصل إناء حجمه (2 L) به غاز النيتروجين ضغطه (81.04 kPa) مع إناء حجمه (4 L) به غاز الأرجون ضغطه (60.78 kPa) ، فإذا ظلت درجة الحرارة ثابتة ، مع إهمال حجم الوصلة بينهما فإن حجم غاز النيتروجين يساوي L وحجم غاز الأرجون يساوي L
- ٥- إذا كان الضغط الجزئي لغاز النيتروجين (100 kPa) والضغط الكلي في وعاء يحتوي على خليط من النيتروجين والهيليوم يساوي (300 kPa) فإن الضغط الجزئي لغاز الهيليوم يساوي (..... kPa)

السؤال الرابع :- حل المسائل التالية

- ١ - احسب الضغط الكلي لخليط غازي يحتوي على أكسجين ونيتروجين وهيليوم إذا كانت الضغوط الجزئية للغازات كالتالي [$P_{He} = 26.7 \text{ kPa}$ ، $P_{N_2} = 46.7 \text{ kPa}$ ، $P_{O_2} = 20 \text{ kPa}$]

- ٢ - قنينة حجمها (10 L) تحتوي على (0.2 mol) من غاز الميثان (CH_4) مع (0.3 mol) من غاز الهيدروجين مع (0.4 mol) من غاز النيتروجين عند درجة حرارة ($25^\circ C$) ،

المطلوب حساب الضغط الكلي للخليط داخل القنينة علماً بأن : ($R = 8.31 \text{ kPa} \cdot L / \text{mol} \cdot K$)

٣- إناء حجمه (2 L) به غاز هيليوم تحت ضغط (81.04 kPa) ، وآخر حجمه (1200 mL) به غاز أكسجين تحت ضغط (162.08 kPa) ، فإذا تم نقل الغازين إلى إناء جديد حجمه (4 L) ، فاحسب الضغط داخل هذا الإناء عند ثبوت درجة الحرارة.

٤ - إناء حجمه (2 L) به غاز هيدروجين تحت ضغط (40.52 kPa) ، وآخر حجمه (6 L) به غاز نيتروجين تحت ضغط (60.78 kPa) ، فإذا ظلت درجة حرارتهما ثابتة ومتساوية وتم توصيل الإناءين معا ، فاحسب الضغط الكلي للغازين في الإناء الجديد (مع إهمال حجم التوصيلة بينهما)

٥- احسب الضغط الكلي لمخلوط مكون من (4 g) هيليوم ، (4 g) هيدروجين ، (8 g) أكسجين موضوع في إناء حجمه (20 L) عند (20 °C) علما بأن ($R = 8.31$ ، $He = 4$ ، $H = 1$ ، $O = 16$)

الوحدة الثانية: سرعة التفاعل الكيميائي والاتزان الكيميائي

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١- كمية المتفاعلات التي يحدث لها تغير خلال وحدة الزمن ()
- ٢- يمكن للذرات و الأيونات والجزيئات أن تتفاعل وتكوّن نواتج عندما يصطدم بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية في الاتجاه الصحيح ()
- ٣- أقل كمية من الطاقة التي تحتاج إليها الجسيمات لتتفاعل ()
- ٤- ترتيب مؤقت للجسيمات (للذرات) عند قمة حاجز طاقة التنشيط وقد يتفكك مرة ثانية ليعطي المتفاعلات أو يستمر في الاتجاه الصحيح لتكوين النواتج عندما يمتلك الطاقة الكافية ()

السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١- إحدى العبارات التالية لا تعتبر عن سرعة التفاعل الكيميائي :
() كمية المتفاعلات التي يحدث لها تغير خلال وحدة الزمن
() مقدار التغير في عدد المولات خلال وحدة الزمن
() كمية النواتج من التفاعل في وحدة الزمن
() كمية المادة المحفزة اللازمة لبدء التفاعل في وحدة الزمن
- ٢- وفق نظرية التصادم :
() كل تصادم بين جسيمات المواد المتفاعلة يؤدي إلى تفاعل
() التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة هي الشرط اللازم لحدوث التفاعل لكنه غير كاف
() التصادمات بين الجسيمات التي لها طاقة أقل من طاقة التنشيط تستمر في الاتجاه الصحيح نحو النواتج
() التصادمات بين الجسيمات التي لها طاقة أكبر من طاقة التنشيط لا تتفاعل
- ٣- جميع العبارات التالية صحيحة للمركب المنشط عدا واحدة منها ، وهي :
() لا يعتبر من المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة
() يسمى أحياناً بالحالة الانتقالية
() لا يمكن أن يتفكك مرة أخرى ليعطي المواد المتفاعلة
() عبارة عن جسيمات تتكوّن لحظياً عند قمة حاجز التنشيط

السؤال الثالث :- علل لما يأتي ؟ ١ - لا ينتج عن كل اصطدام تفاعل .

أو ** لا يكفي تصادم جسيمات المادة مع بعضها بعضاً لكي يحدث التفاعل .

٢ - المركب المنشط غير مستقر بدرجة كبيرة جداً

العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي

- ١- ٢- ٣- ٤-

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

١- مادة تزيد سرعة التفاعل من دون استهلاكها إذ يمكن استعادتها بمجرد توقف التفاعل من دون استهلاكها

- ()
٢- المواد المحفزة الحيوية التي تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية ()
٣- المادة التي تعارض تأثير المادة المحفزة وتضعف تأثيرها مما يؤدي إلى بطء التفاعل أو انعدامه ()

السؤال الثاني :ضع علامة (√) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١- ارتفاع درجة الحرارة في جميع التفاعلات الكيميائية يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل نتيجة زيادة :
() حجم الغازات لثبات ضغطها
() طاقة حاجز التنشيط اللازم لبدء التفاعل
() احتمالية التصادمات الفعالة بين الجسيمات المتفاعلة
() تركيز المواد المتفاعلة
٢- إحدى العوامل التالية غير مفضل لزيادة سرعة التفاعل :
() زيادة درجة الحرارة
() تقليل حجم الجسيمات المتفاعلة
() إضافة مادة محفزة
() زيادة تركيز المواد المتفاعلة
٣- جميع الطرق التالية تعمل على نشاط مادة صلبة متفاعلة عدا واحدة منها ، وهي :
() إذابتها في مذيب مناسب
() تبريد هذه المادة
() زيادة درجة حرارتها
() طحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم

٤- يمكن تقليل سرعه التفاعل الكيميائي بـ:

- () زيادة عدد جسيمات المتفاعلات
() زيادة مساحة سطح المتفاعلات
() إضافة مادة مانعة للتفاعل
() رفع درجة الحرارة

٥- تعمل المادة المحفزة للتفاعل على :

- () تقليل كمية النواتج في فترة زمنية معينة
() خفض حاجز طاقة التنشيط
() زيادة حاجز طاقة التنشيط
() بطء التفاعلات أو انعدامها

٦- جميع ما يلي يعمل على زيادة سرعة التفاعل عدا واحدة منها ، وهي :

- () رفع درجة الحرارة
() زيادة حجم جسيمات المواد المتفاعلة
() زيادة تركيز المواد المتفاعلة
() زيادة عدد جسيمات المواد المتفاعلة

السؤال الثالث :- اكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً :

١- تتوهج رقائق خشبية في الهواء بدرجة..... من توهجها في مخبر مملوء بالأكسجين

٣- كلما صغر حجم جسيمات المواد المتفاعلةمساحة السطح لكتلة معينة وبالتالي..... سرعة التفاعل

٤- يمكن زيادة مساحة السطح للمتفاعلات عن طريق إذابة المادة الصلبة لعمل محلول منها أو وتحويلها إلى مسحوق ناعم

٥- كتل الفحم الكبيرةنشاط من غبار الفحم. المعلق و المتناثر في الهواء

٨- تفاعل كلوريد الصوديوم الصلب مع نيترات الفضة الصلب.....سرعة من تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نيترات الفضة

٩- المادة المحفزة تعمل على حاجز طاقة التنشيط وبالتالي تزداد كمية النواتج

١٠- المادة التي لا تظهر في معادلة التفاعل الكيميائي ضمن المواد المتفاعلة أو الناتجة وتعمل على خفض حاجز طاقة التنشيط تسمى

السؤال الرابع :- علل لما يأتي؟؟

١- يرتدي عامل اللحام نظارة خاصة عند قيامه بعملية لحام المعادن باستخدام غاز الايثانين والأكسجين النقي.

٢- ارتفاع درجة حرارة المواد المتفاعلة يؤدي إلى زيادة سرعة تفاعلها

٣- زيادة تركيز المواد المتفاعلة يؤدي إلى زيادة سرعة تفاعلها .

٤- سرعة تفاعل الكربون (الفحم) مع الأكسجين في درجة حرارة الغرفة تساوي صفراً

٥- منع التدخين في المناطق التي تستخدم فيها الأتابيب المعبأة بالأكسجين

٦- تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع برادة الحديد أسرع من تفاعله مع قطعة من الحديد

٧- يفضل طحن المادة الصلبة وتحويلها إلى مسحوق ناعم أثناء التفاعل الكيميائي

السؤال الخامس :- ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية ؟ وما السبب

١ - لرقافة الخشب المشتعلة عند إدخالها في مخبر مملوء بالأكسجين

الحدث :

السبب :

٢ - لسرعة التفاعل الكيميائي عند إضافة مادة محفزة إليه .

الحدث :

السبب :

٣ - لغبار الفحم المعلق والمتناثر داخل مناجم الفحم عند اشتعاله

الحدث :

السبب :

الدرس (2-1) التفاعلات العكوسة واللاتزان الكيميائي

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١ - هي تفاعلات تحدث في اتجاه واحد حتى تكتمل بحيث لا تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد بعضها مع بعض لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى .
()
- ٢ - هي تفاعلات لا تستمر في اتجاه واحد حتى تكتمل، بحيث لا تستهلك المواد المتفاعلة تماماً لتكوين النواتج، فالمواد الناتجة تتحد مع بعضها البعض مرة ثانية لتعطي المواد المتفاعلة مرة أخرى تحت ظروف التجربة نفسها".
()
- ٣ - هي التفاعلات العكوسة التي تكون فيها جميع المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل في حالة واحدة من حالات المادة .
()
- ٤ - التفاعلات العكوسة التي تكون فيها المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل في أكثر من حالة فيزيائية .
()

السؤال الثاني :- اكمل جدول المقارنة التالي

خصائص التفاعل العكوس	خصائص التفاعل الغير عكوس

السؤال الثالث :- علل؟ تفاعل محلول (AgNO₃) مع محلول (NaCl) من التفاعلات الغير عكوسة

السؤال الرابع اكمل ؟ نقسم التفاعلات العكوسة حسب (الحالة الفيزيائية) للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة إلى

..... و

السؤال الخامس وضع في القوسين المقابلين للتفاعل ما إذا كان عكوس متجانس ام عكوس غير متجانس ؟

- () $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- () $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$
- () $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$
- () $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

الاتزان الكيميائي الديناميكي

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١ - هي حالة النظام التي فيها تثبت تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وبالتالي تكون سرعة التفاعل الطردي مساوية لسرعة التفاعل العكسي طالما بقي النظام بعيداً عن أي مؤثر خارجي". ()
- ٢ - التركيزات النسبية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند الاتزان. ()
- ٣ - عند ثبات درجة الحرارة، تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طردياً مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات أمام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة". ()
- ٤ - النسبة بين حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة من التفاعل (النواتج) إلى حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة ()


السؤال الثاني : أكمل جدول المقارنة التالي والذي يوضح ما تدل عليه قيمة (K_{eq})

قيمة (K_{eq}) أصغر من واحد	قيمة (K_{eq}) أكبر من واحد	
	تركيز النواتج أكبر من تركيز المتفاعلات	تركيز المتفاعلات والنواتج
يزاح بالاتجاه العكسي		اتجاه موضع الاتزان
		استهلاك المواد الناتجة
		التفاعل المفضل


السؤال الثالث :- علل لما يأتي ؟

تعبير ثابت الاتزان (K_{eq}) لا يشمل المواد الصلبة ولا يشمل الماء في الحالة السائلة في المتفاعلات


السؤال الرابع :- اكتب تعبير ثابت الاتزان للمعادلات التالية ؟




$K_{eq} =$



$K_{eq} =$



$K_{eq} =$



$K_{eq} =$

السؤال الخامس - أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً :

- ١- يصل التفاعل الكيميائي إلى حالة الاتزان عندما تركيزات المواد المتفاعلة والناتجة
- ٢- عندما يصل التفاعل الكيميائي إلى حالة الاتزان الديناميكي فإن سرعة التفاعل الطردي سرعة التفاعل العكسي
- ٣- في النظام المتزن التالي : $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$ تتناسب سرعة التفاعل العكسي مع $[\text{A}] [\text{B}]$ وتتناسب سرعة التفاعل الطردي مع $[\text{A}] [\text{B}]$
- ٤- في النظام المتزن التالي : $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) تساوي (1×10^{-2}) فإن ذلك يدل على أن موضع الاتزان لهذا النظام يقع في اتجاه المواد

السؤال الرابع :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١- في النظام المتزن التالي : $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ تتناسب سرعة التفاعل الطردي تناسباً :
() طردياً مع $[\text{PCl}_3]$ () عكسياً مع $[\text{Cl}_2]$ () عكسياً مع $[\text{PCl}_5]$ () عكسياً مع $[\text{Cl}_2]$ [PCl_5]
- ٢- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) للنظام المتزن التالي : $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ تساوي 4×10^{-18} فإن قيمته للتفاعل المتزن التالي : $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ تساوي :
() 3×10^{15} () 4×10^{-15} () 1.6×10^{-35} () 2.5×10^{17}

مسائل على حساب ثابت الاتزان

- ١- في النظام المتزن التالي : $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ وجد أن تركيز كل من غازي (CO , CO_2) عند الاتزان يساوي M (0.1 , 0.2) على الترتيب ، احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) لهذا النظام ، وبناء على إجابتك ، أين يزاح موضع الاتزان

- ٢- النظام المتزن التالي حدث في وعاء سعته (2 L) : $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ وعند الاتزان وجد أن المخلوط يحتوي على (0.02 mol) من غازي (NO , H_2) ، (0.15 mol) من غاز (N_2) ، (0.3 mol) من بخار الماء احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) لهذا النظام ؟

- ٣- إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) عند درجة (200 K) للنظام المتزن التالي :
 $2\text{NOBr}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g})$ تساوي (0.416) فإذا كان تركيز غاز (NOBr) عند الاتزان يساوي تركيز (NO) ، احسب تركيز (Br_2) عند الاتزان

٤- في النظام المتزن التالي : $2 \text{NO}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_{4(g)}$ إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) عند درجة حرارة معينة يساوي (2) وكان عدد المولات لغاز (NO_2) عند الاتزان يساوي (2 mol) في إناء حجمه (1 L) فاحسب تركيز (N_2O_4) عند الاتزان

٥- سخنت عينة من المركب (NH_4HS) إلى درجة حرارة معينة في إناء مغلق وتركت حتى حدث الاتزان التالي :
 $\text{NH}_4\text{HS(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3(g) + \text{H}_2\text{S(g)}$
فإذا كانت قيمة ثابت الاتزان تساوي 7.29×10^{-2} احسب تركيز كل مادة من المواد الناتجة في المحلول عند الاتزان

العوامل التي تؤثر في الاتزان الكيميائي :-

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر في نظام متزن ديناميكياً، يُعدل النظام نفسه إلى حالة اتزان جديدة، بحيث يُبطل أو يُقلل من تأثير هذا التغير.

السؤال الثاني :- أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً :

- ١ - العوامل التي تؤثر (تغير) في موضع الاتزان و و
- ٢ - عند زيادة تركيز النواتج في نظام متزن، يختل الاتزان ويُزاح موضع الاتزان في اتجاه التفاعل وقيمة (K_{eq})

٣- في النظام المتزن التالي : $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

عندما يضاف الهيدروجين إلى النظام المتزن فإن موضع الاتزان يزاح باتجاه المواد

٤ - العامل الوحيد الذي يغير من قيمة ثابت الاتزان هو

٥- في النظام المتزن التالي: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ تزداد قيمة ثابت الاتزان برفع درجة الحرارة مما يدل على أن التفاعل من النوع ----- للحرارة.

٦ - في النظام المتزن التالي : $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) عند ($100^\circ C$) تساوي 0.065، وعند ($25^\circ C$) تساوي 7.13 ، فإن ذلك يدل على أن التفاعل من النوع ----- للحرارة.

السؤال الثالث :- أكمل جدول المقارنة التالي للتفاعل الطارد والتفاعل الماص :

التفاعل (2)	التفاعل (1)
حرارة + $X \rightleftharpoons Y$	$A \rightleftharpoons B$ حرارة +
أ- عند رفع درجة الحرارة (التسخين):	أ- عند رفع درجة الحرارة (التسخين):
١ - الاتزان	١ - الاتزان
٢ - يُزاح موضع الاتزان نحو تكوين المواد	٢ - يُزاح موضع الاتزان نحو تكوين المواد
٣ - تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج	٣ - تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج
٤ - القيمة العددية لثابت الاتزان	٤ - القيمة العددية لثابت الاتزان

السؤال الرابع :- وضح في الجدول التالي أثر خفض درجة الحرارة على موضع الاتزان، وعلى قيمة ثابت

الاتزان (K_{eq})



التفاعل (٢)	التفاعل (١)	
		موضع الاتزان
		قيمة ثابت الاتزان

السؤال الخامس :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

١ - وفقاً للتفاعل المتزن التالي : $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$ فإن زيادة الأكسجين تعمل على:

() زيادة استهلاك NO () زيادة استهلاك N_2

() زيادة قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) () زيادة سرعة التفاعل العكسي

٢ - في التفاعل المتزن التالي : $FeCl_{3(aq)} + 3KCNS_{(aq)} \rightleftharpoons Fe(CNS)_{(aq)} + 3KCl_{(aq)}$

جميع ما يلي يزيد من شدة اللون الأحمر عدا : (احمر اللون)

() زيادة $[KCNS]$ () زيادة تركيز $[FeCl_3]$

() تقليل $[KCl]$ () زيادة $[KCl]$

٣ - في النظام المتزن التالي : $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$ سحب الأكسجين من وسط التفاعل يؤدي إلى :

() زيادة قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) () زيادة تركيز SO_2

() زيادة تركيز SO_3 () نقص قيمة ثابت الاتزان (K_{eq})

السؤال السادس :- علل لما يأتي ؟

١ - في النظام المتزن التالي : $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$

يزداد إنتاج (SO_3) عند إضافة المزيد من الأكسجين للتفاعل

٢ - في النظام المتزن التالي : $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(g)} + 92 kJ$




يزداد تفكك كحول الميثيل بارتفاع درجة الحرارة ؟

تابع العوامل التي تؤثر في الاتزان الكيميائي (ثالثا : الضغط)


السؤال الأول :- أكمل الجدول التالي ؟

تفاعلات مصحوبة بزيادة في حجوم الغازات	تفاعلات مصحوبة بنقص في حجوم الغازات	تفاعلات غير مصحوبة بتغير في الحجم
يكون فيها عدد مولات الغازات الناتجة عدد مولات الغازات المتفاعلة.	يكون فيها عدد مولات الغازات الناتجة عدد مولات الغازات المتفاعلة.	يكون فيها عدد مولات الغازات الناتجة عدد مولات الغازات المتفاعلة.
$2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$
عند زيادة الضغط (تقليل حجم الوعاء): ١ - يختل الاتزان ٢ - يُزاح موضع الاتزان نحو الغازات ٣ - القيمة العددية لثابت الاتزان	عند زيادة الضغط (تقليل حجم الوعاء): ١ - يختل الاتزان ٢ - يُزاح موضع الاتزان نحو الغازات ٣ - القيمة العددية لثابت الاتزان	تغير الضغط (تغير حجم الوعاء) لا يؤثر على موضع الاتزان (علل)


السؤال الثاني :- في الأنظمة المترنة التالية: هل يتغير موضع الاتزان عند تقليل حجم الوعاء الحاوي لها أم لا ؟ وفي أي اتجاه يزاح؟



السؤال الثالث :- علل لما يأتي ؟



لا يتغير موضع الاتزان بزيادة الضغط الواقع على النظام ؟



لا يتغير موضع الاتزان عند استعمال عامل حفاز في هذا النظام ؟

أسئلة متنوعة على العوامل التي تؤثر في الاتزان الكيميائي

السؤال الأول : - اكمل العبارات التالية

- ١ - ثابت الاتزان (K_{eq}) للنظام المتزن التالي : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + 92kJ$ عند $(400)K$ يكون من ثابت الاتزان له عند $(600)K$
- ٢ - عند زيادة الضغط على النظام المتزن التالي : $COCl_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + Cl_{2(g)}$ يزاح موضع الاتزان في اتجاه تكوين المواد
- ٣ - عند زيادة حجم وعاء التفاعل المتزن التالي : $2NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ فإن موضع الاتزان يزاح ناحية المواد
- ٤ - في النظام المتزن التالي : $2CO_{(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + C_{(s)}$ فإن زيادة الضغط على هذا النظام يؤدي إلى استهلاك غاز (CO)

السؤال الثاني : - اخترا الإجابة الصحيحة


- ١ - في النظام المتزن التالي : $Fe_3O_4(s) + 4H_{2(g)} \rightleftharpoons 3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)}$ لا يتأثر موضع الاتزان بأحد العوامل التالية :
() زيادة تركيز Fe () زيادة تركيز Fe_2O_3 () نقص حجم وعاء التفاعل () نقص تركيز H_2
- ٢ - في النظام المتزن التالي : حرارة $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ جميع ما يلي يعمل على زيادة إنتاج الأمونيا ، عدا :
() زيادة تركيز N_2 () زيادة حجم وعاء التفاعل () زيادة الضغط () زيادة تركيز H_2
- ٣ - في التفاعل المتزن التالي : $C_2H_6(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g) + H_2(g) \quad \Delta H = + 138 kJ$ يمكن زيادة كمية الإيثين (C_2H_4) الناتجة :
() برفع درجة الحرارة () بزيادة الضغط () بإضافة الهيدروجين () بخفض درجة الحرارة
- ٤ - جميع العوامل التالية تؤثر على موضع اتزان التفاعل الكيميائي ، عدا واحداً :
() التركيز () الضغط () العامل الحفاز () درجة الحرارة
- ٥ - في النظام المتزن التالي : $CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons COCl_{2(g)}$ يزاح موضع الاتزان في الاتجاه الطردي عند
() زيادة تركيز $COCl_2$ () زيادة حجم وعاء التفاعل
() تقليل تركيز Cl_2 () نقص حجم وعاء التفاعل
- ٦ - في النظام المتزن التالي : $H_{2(g)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ حرارة يمكن زيادة إنتاج غاز (CO) عن طريق :
() زيادة تركيز بخار الماء وخفض الحرارة () رفع درجة حرارة النظام وزيادة تركيز CO_2
() زيادة الضغط على النظام () خفض درجة حرارة النظام وتقليل تركيز H_2

الوحدة الثالثة: الأحماض والقواعد

السؤال الأول :- أكمل جدول المقارنة التالي بين خواص الأحماض والقواعد

خواص الأحماض	خواص القواعد
١- طعمها	١- طعمها
٢- تتفاعل المحاليل المائية للأحماض مع الكثير من الفلزات وتعطي ملح الحمض وغاز	٢- ذات ملمس
٣- المحاليل المائية للأحماض توصل التيار الكهربائي (محاليل إلكتروليتيكية)، " بعض محاليل الأحماض قوية وأخرى ضعيفة "	٣- المحاليل المائية للقواعد توصل التيار الكهربائي (محاليل إلكتروليتيكية)، " بعض محاليل القواعد قوية وأخرى ضعيفة "
٤- تُغير ألوان بعض الصبغات الكيميائية "الأدلة".	٤- تُغير ألوان بعض الصبغات الكيميائية "الأدلة".
٥- تتفاعل مع	٥- تتفاعل مع

نظريات الأحماض والقواعد



السؤال الثاني :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

١ - مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيونات الهيدروجين (H^+) في المحلول المائي.

- ()
- ٢ - المركبات التي تتأين لتعطي أنيونات الهيدروكسيد (OH^-) في المحلول المائي. ()
- ٣ - الأحماض التي تحتوي على ذرة هيدروجين واحدة قابلة للتأين. ()
- ٤ - الأحماض التي تحتوي على ذرتي هيدروجين قابلتين للتأين ()
- ٥ - الأحماض التي تحتوي على ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للتأين. ()

السؤال الثالث :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

١- المركبات التي تتأين لتعطي أنيونات الهيدروكسيد OH^- في المحلول المائي تسمى :

() حمض برونستد - لوري () قاعدة أرهينيوس

() قاعدة برونستد - لوري () حمض أرهينيوس

٢- يمكن تفسير السلوك الحمضي للمواد التالية حسب مفهوم أرهينيوس عدا مادة واحدة هي :

() HCl () NH_4Cl () H_3PO_4 () HSO_3^-

٣- يمكن تفسير السلوك القاعدي للمواد التالية حسب مفهوم أرهينيوس عدا مادة واحدة هي :

() $NaOH$ () KOH () CH_3COONa () $LiOH$

٤- أحد الأحماض التالية أحادي البروتون :

() H_3PO_4 () H_2SO_4 () H_2CO_3 () CH_3COOH

السؤال الرابع : - أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً :

- ١ - ذرات الهيدروجين التي ترتبط مع ذرة أخرى برابطة قطبية لا تتأين بينما ذرات الهيدروجين التي ترتبط مع ذرة أخرى برابطة قطبية تتأين
- ٢ - هيدروكسيدات المجموعة 1A مثل هيدروكسيد الصوديوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم تذوب بسهولة في الماء ولذلك تعطي محاليل بينما هيدروكسيدات المجموعة 2A مثل هيدروكسيد المغنسيوم ، هيدروكسيد الكالسيوم لا تذوب بسهولة في الماء ولذلك تعطي محاليل
- ٣ - $2\text{Na}_{(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \dots + \dots$
- ٤ - $\text{K}_2\text{O}_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \dots$

السؤال الخامس : - علل لما يأتي ؟

- ١ - يجب على زوار كهف براكين في مدينة تكساس أن يرتدوا نظارات وأجهزة للتنفس.

.....
.....

- ٢ - لا يعتبر الميثان (CH_4) من الأحماض رغم إحتوائه على الهيدروجين

.....
.....

- ٣ - حمض الأسيتيك أحادي البروتون رغم أنه يحتوي على أربع ذرات هيدروجين .

.....
.....

- ٤ - يُسمى هيدروكسيد الصوديوم NaOH الصودا الكاوية و يُسمى هيدروكسيد البوتاسيوم KOH البوتاسا الكاوية أو هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم يجب غسلها وإزالتها عن الجلد بالماء في حال لمسها أو انسكابها

.....
.....

ثانياً: أحماض وقواعد برونستد – لوري

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١ - المادة (جزئ أو أيون) التي تُعطى كاتيون هيدروجين H^+ (بروتون) في المحلول وتُسمى معطى بروتون .
()
- ٢ - المادة (جزئ أو أيون) التي تستقبل كاتيون هيدروجين H^+ (بروتون) في المحلول وتُسمى مستقبلاً بروتون.
()
- ٣ - الجزء المتبقي من الحمض بعد فقد البروتون .
()
- ٤ - الناتج من القاعدة بعد استقبال البروتون .
()
- ٥ - كل حمض وقاعدته المرافقة ، أو كل قاعدة وحمضها المرافق.
()
- ٦ - هو التفاعل الذي يحدث بين جزيئي ماء لإنتاج أنيون هيدروكسيد (OH^-) وكاتيون هيدرونيوم (H_3O^+).
()
- ٧ - المواد التي يمكنها أن تسلك كحمض عندما تتفاعل مع القاعدة ، كما يمكنها أن تسلك كقاعدة عندما تتفاعل مع الحمض
()

السؤال الثاني :- أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً ؟

- (١) عند ذوبان HNO_2 في الماء : $HNO_2(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + NO_2^-(aq)$ المطلوب
(أ) : حمض برونستد – لوري هو : -----
(ب) : قاعدة برونستد – لوري هي : -----
(ج) : القاعدة المرافقة لحمض HNO_2 : -----
(د) : الحمض المرافق للماء (H_2O) : -----
(هـ) : الأزواج المترافقة هي : ----- //
- (٢) في التفاعل التالي $H_2O(l) + NH_3(aq) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$
(أ) : القاعدة المرافقة لحمض الهيدروفلوريك هي : -----
(ب) : الحمض المرافق للماء هو : -----
(ج) : الأزواج المترافقة هي : ----- //

السؤال الثالث :- أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً :

- ١- الصيغة الكيميائية للقاعدة المرافقة للماء هي والصيغة الكيميائية لحمضها المرافق هي
- ٢- إذا كانت الأزواج المترافقة لتفاعل ما هي : $[HCl, Cl^-]$ ، $[NH_4^+, NH_3]$ ،
فإن التفاعل الدال على ذلك هو :

السؤال الرابع :- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة التي تكمل كلاً من العبارات التالية :

- ١- في التفاعل التالي : $H_2O(l) + HCl(aq) \rightarrow Cl^-(aq) + H_3O^+(aq)$ يعتبر كاتيون الهيدرونيوم :
() قاعدة مرافقة للماء
() حمض مرافق لحمض HCl
() حمض مرافق لحمض HCl
- ٢- أحد الأنواع التالية يسلك كحمض وقاعدة برونستد – لوري :
() HCl () H_2O () BF_3 () CO_3^{2-}
- ٣- جميع الأنواع التالية تسلك سلوك المترددات عدا مادة واحدة هي :
() NH_3 () H_2O () BF_3 () HCO_3^-
- ٤- أحد الأنواع التالية لا يعتبر حمضاً حسب مفهوم برونستد – لوري :
() H_2O () BF_3 () HSO_4^- () NH_3

السؤال الخامس :- اكتب صيغة الحمض المرافق لكل من:


م	المادة	صيغة الحمض المرافق	م	المادة	صيغة القاعدة المرافقة
١	PO_4^{3-}		١	HSO_3^-	
٢	HCO_3^-		٢	NH_4^+	
٣	PH_3		٣	H_2O	
٤	HS^-		٤	HPO_4^{2-}	

ثالثاً : أحماض وقواعد لويس

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١- المادة (جزيئات أو أيونات) التي لها القدرة على استقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات الحرة .
()
- ٢ - هي الجزيئات أو الأيونات التي لها القدرة على إعطاء زوج من الإلكترونات الحرة .
()

مثال :- وضح حمض وقاعدة لويس في تفاعل ثنائي إيثيل إيثر مع ثلاثي فلوريد البورون لإنتاج ثلاثي فلوريد البورون الإيثري



السؤال الثاني :- اكمل جدول المقارنة التالي ؟


قاعدة لويس	حمض لويس
أ - جزيء متعادل الشحنة يحتوي على ذرة لديها ----- من الإلكترونات الحرة أي غير المشتركة في تكوين روابط ، من مثل H_2O ، NH_3 ، (كحول الإيثيل) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ، ثنائي إيثيل إيثر ، PCl_3 ب - أيون سالب (أنيون) حيث تعتبر جميع الأنيونات قواعد لويس مثل ----- ، -----	أ - جزيء متعادل الشحنة يحتوي على ذرة لم تصل إلى حالة الاستقرار الثماني، وبالتالي يمكنها ----- أو أكثر من الإلكترونات من مثل ثالث فلوريد البورون BF_3 ، كلوريد الألومنيوم AlCl_3 . ب - أيون موجب مثل كاتيون H^+ ، وكاتيونات العناصر الانتقالية ، من مثل Ni^{2+} ، Co^{2+} ، Ag^+ ، Cu^{2+} والأيونات التي تحمل شحنة موجبة ثلاثية أو أكثر ، من مثل ----- ، ----- .

السؤال الثالث :- حدد حمض وقاعدة لويس في التفاعلات التالية

١ - يذوب كلوريد الفضة في محلول الأمونيا حسب المعادلة التالية :



- (أ): حمض لويس هو ----- لأنه يستقبل زوجين من الإلكترونات من جزيئين من الأمونيا وكون معهما روابط تساهمية
(ب): قاعدة لويس هي ----- لأن كل جزيء أمونيا منح زوج من الإلكترونات لتكوين رابطة مع كاتيون الفضة.
- ٢ - يتحد أنيون السيانيد (CN^-) مع كاتيون الهيدروجين (H^+) حسب المعادلة التالية :



(أ): حمض لويس هو ----- لأنه -----

(ب): قاعدة لويس هي ----- لأنه -----

٣ - حدد حمض وقاعدة لويس في التفاعل التالي : $\text{Co}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightarrow [\text{Co}(\text{Cl})_4]^{2-}$

حمض لويس هو : ----- وقاعدة لويس هي : -----

السؤال الرابع :- علل في التفاعل التالي $\text{Cu}^{2+} + 4:\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

حمض لويس هو Cu^{2+} وقاعدة لويس هي NH_3 :

تسمية الأحماض والقواعد

أولاً :- تسمية الأحماض ثنائية العنصر (غير الأكسجينية) على الشكل التالي :

حمض + هيدرو + اسم العنصر (A) مضافاً إليه المقطع "يك"

السؤال الأول :- اكمل الجدول التالي

صيغة الحمض	اسم الحمض	العنصر A	اسم العنصر A
HCl		Cl	الكلور
HF		F	الفلور
HBr		Br	البروم
HI		I	اليود
H ₂ S		S	الكبريت
H ₂ Se		Se	سيلينيوم
H ₂ Te		Te	تيليريوم

ثانياً :- تسمية الأحماض ثلاثية العنصر (الأكسجينية) (H_aX_bO_c)

تسمية الأحماض الأكسجينية من خلال تحديد عدد تأكسد ذرة اللافلز حيث $n = \frac{2C-a}{b}$ (عدد تأكسد الذرة X)

السؤال الثاني : أكمل الجدول ؟

م	عدد تأكسد الذرة المركزية	طريقة التسمية	مثال
1		حمض + هيبو + اسم الذرة المركزية + وز	HClO
2		حمض + اسم الذرة المركزية + وز	HNO ₂
3		حمض + اسم الذرة المركزية + يك	H ₂ SO ₄
4		حمض + بير + اسم الذرة المركزية + يك	HClO ₄
5	ذرة الكربون تكون حمضاً واحداً	حمض + اسم اللافلز + يك	حمض ----- (H ₂ CO ₃)

السؤال الثالث :- اكمل الجدول التالي

الصيغة	الاسم	الصيغة	الاسم
H ₂ SO ₄		HClO	
HNO ₃		HClO ₂	
H ₃ PO ₃		HClO ₃	
H ₂ CO ₃		HClO ₄	
HNO ₂		H ₂ SO ₃	

(تسمية الفوائد) السؤال الرابع :- اكمل الجدول التالي

الصيغة	الاسم	الصيغة	الاسم
NaOH		Ba(OH) ₂	
Ca(OH) ₂		Fe(OH) ₃	

كاثيونات الهيدروجين والحموضة

السؤال الأول :- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل مما يلي :

- ١ - المحلول الذي يكون فيه تركيز كاثيونات الهيدرونيوم أكبر من تركيز أنيونات الهيدروكسيد.
أو المحلول الذي يكون فيه $[H_3O^+]$ أكبر من $[OH^-]$ ()
- ٢ - المحلول الذي يكون فيه تركيز كاثيونات الهيدروجين أقل من تركيز أنيونات الهيدروكسيد.
أو المحلول الذي يكون فيه $[H_3O^+]$ أقل من $[OH^-]$ ()
- ٣ - المحلول الذي يكون فيه تركيز كاثيونات الهيدروجين (الهيدرونيوم) يساوي تركيز أنيونات الهيدروكسيد .
أو المحلول الذي يكون فيه $[OH^-] = [H_3O^+]$ ()
- ٤ - حاصل ضرب تركيزي كاثيونات الهيدرونيوم وأنيونات الهيدروكسيد في الماء. ()

السؤال الثاني :- أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً

- ١- إذا كانت قيمة ثابت تأين الماء (K_w) للماء عند $50^\circ C$ تساوي (5.7×10^{-14}) فإن تركيز كاثيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ في الماء النقي عند هذه الدرجة يساوي
- ٢- إذا كانت قيمة $[OH^-]$ في الماء النقي عند $50^\circ C$ تساوي (2.38×10^{-7}) فإن ثابت تأين الماء (K_w) للماء عند هذه الدرجة يساوي
- ٣- إذا علمت أن قيمة K_w للماء النقي عند $(47^\circ C)$ تساوي (4×10^{-14}) ، فإن تركيز أنيون الهيدروكسيد في الماء النقي عند هذه الدرجة يساوي M

السؤال الثالث حدد نوع المحاليل التالية (حمضي - قلوي - متعادل) :

- ١ - محلول يحتوي على $[H_3O^+]$ يساوي (1×10^{-3}) M ()
- ٢ - محلول يحتوي على $[OH^-]$ يساوي (1×10^{-3}) M ()
- ٣ - محلول يحتوي على $[H_3O^+]$ يساوي (1×10^{-9}) M ()
- ٤ - محلول يحتوي على $[OH^-]$ يساوي (1×10^{-9}) M ()

السؤال الرابع :- ثلاث محاليل (A , B , C) موضح تركيز أحد أيونات كل محلول عند $25^\circ C$ ، أكمل ما يلي :

المحلول	A	B	C
$[H_3O^+]$	1×10^{-3}		
$[OH^-]$		2×10^{-3}	1×10^{-7}
نوع المحلول			

مفهوم الأس الهيدروجيني pH

السؤال الأول :- أكمل الجدول التالي

تعريف الأس الهيدروكسيدي pOH	الأس الهيدروجيني pH	
	القيمة السالبة للوغاريتم العشري لتركيز كاتيون الهيدرونيوم.	التعريف
$pOH = -\log [OH^-]$		القانون
$pOH = 14 - pH$		العلاقة بينهما

السؤال الثاني :- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

- ١- محلول أسه الهيدروكسيدي (pOH) يساوي (12) عند $^{\circ}C$ (25) فإن تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ فيه بوحدة (M) يساوي
- () 1×10^{-2} () 2 () 0.02 () 1×10^{-12}
- ٢- محلول حمضي قيمة الأس الهيدروجيني (pH) له تساوي (5.64) عند $^{\circ}C$ (25) فإن تركيز أنيون الهيدروكسيد بوحدة (M) يساوي :
- () 4.365×10^{-9} () 2.29×10^{-6} () 5.64 () 8.36
- ٣- أحد المحاليل التالية أكثر حمضية عند $^{\circ}C$ (25) :
- () محلول فيه $[H_3O^+]$ يساوي $M (1 \times 10^{-3})$ () محلول فيه $[OH^-]$ يساوي (1×10^{-3})
- () محلول فيه pH يساوي (10) () محلول فيه pOH يساوي (13)
- ٤- أحد المحاليل التالية أكبر قيمة $[OH^-]$ عند $^{\circ}C$ (25) :
- () محلول فيه $[H_3O^+]$ يساوي $M (1 \times 10^{-3})$ () محلول فيه pH يساوي 10
- () محلول فيه $[OH^-]$ يساوي (1×10^{-3}) () محلول فيه pOH يساوي 13
- السؤال الثالث :- ثلاث محاليل (A , B , C) موضع إحدى القيم لكل محلول عند $^{\circ}C$ 25 ، أكمل ما يلي :

المحلول	A	B	C
$[H_3O^+]$	4×10^{-3}		
$[OH^-]$			
PH		9	
pOH			4
نوع المحلول			

السؤال الرابع :- حل المسألة التالية :-

- محلول قاعدي فيه تركيز أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ يساوي $M (1.5 \times 10^{-5})$ عند $^{\circ}C$ (25) المطلوب حساب :-
- أ - قيمة الأس الهيدروكسيدي (pOH) في المحلول
- ب - قيمة الأس الهيدروجيني (pH) في المحلول
- ج - تركيز كاتيون الهيدروجين $[H^+]$ في المحلول

قوة الأحماض والقواعد

السؤال الأول :- اكمل جدول المقارنة التالي

الأحماض الضعيفة	الأحماض القوية
تعريفها : الأحماض التي تتأين جزئياً في محاليلها المائية وتشكل حالة اتزان (غير تام التأين)	تعريفها : الأحماض التي تتأين بشكل تام في محاليلها المائية (تام التأين)
ينتج كميات أقل من كاتيونات الهيدرونيوم	ينتج كميات ----- من كاتيونات الهيدرونيوم
التفاعل لا يسير عملياً حتى النهاية التفاعل -----	التفاعل يسير عملياً حتى النهاية التفاعل غير عكوس
محلوله المائي يحتوي على كاتيونات وانيونات و----- لم تتأين في الماء	محلوله المائي يحتوي على كاتيونات وانيونات فقط
الاتجاه الغالب يكون باتجاه المواد -----	الاتجاه الغالب يكون باتجاه المواد ----- فقط
توجد حالة اتزان عند تأينه لأنه -----	لا توجد حالة اتزان عند تأينه لأنه -----
تركيز الحمض غير المتأين لا يساوي صفراً	تركيز الحمض غير المتأين يساوي -----
لا يتحول الحمض كلياً إلى قاعدته المرافقة	يتحول الحمض كلياً إلى قاعدته المرافقة
يوجد له ثابت تأين : K_a	لا يوجد له ثابت تأين : K_a
حمض الأسيتيك : CH_3COOH $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$	مثال " حمض الهيدروكلوريك : HCl $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

السؤال الثاني / اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه ؟

١- إذا كانت قيمة ثابت التأين (K_a) لكل من حمض الفورميك وحمض الهيدروفلوريك وحمض الأسيتيك وحمض البنزويك هي 1.8×10^{-4} ، 6.7×10^{-4} ، 1.8×10^{-5} ، 6×10^{-5} على الترتيب ، فإن أقوى هذه الأحماض في محاليلها المائية المتساوية التركيز هو حمض:

() الفورميك () الأسيتيك () الهيدروفلوريك () البنزويك

٢- إذا علمت أن (K_a) لكل من الأحماض التالية : (HCN ، $HClO$ ، CH_3COOH) هي

(1.8×10^{-5} ، 3.2×10^{-8} ، 4×10^{-10}) على الترتيب ، فإن ذلك يدل على أن :

() حمض (HCN) هو أقوى الأحماض السابقة

() (H^+) في محلول (CH_3COOH) أعلى من (H^+) في محلول ($HClO$) والذي له نفس التركيز

() قيمة (pH) لمحلول (CH_3COOH) أعلى من قيمة (pH) لمحلول (HCN) والذي له نفس التركيز

() قيمة (pK_a) لمحلول حمض (CH_3COOH) تساوي (6.8)

٣- أكثر المحاليل حمضية ($25^\circ C$) هو المحلول الذي يكون له :

() $pH = 2$ () $pOH = 13$ () $pOH = 7$ () $pOH = 6.5$

٤- الحمض القوي الذي له الصيغة الافتراضية (HA) في محلوله المائي يكون :

- () متأين جزئياً () تركيز الجزيء غير المتأين يساوي صفراً
() في حالة اتزان ديناميكي () تركيز كاتيونات الهيدرونيوم أقل من تركيز الحمض

٥- المحلول المائي لحمض الهيدروكلوريك (HCl) يحتوي على :

- () H_3O^+ وجزيئات من الحمض لم تتأين () Cl^- وجزيئات من الحمض لم تتأين
() H_3O^+ ، Cl^- فقط () H_3O^+ ، Cl^- ، وجزيئات من الحمض لم تتأين

٦- المحلول المائي لحمض الأسيتيك (CH_3COOH) يحتوي على :

- () H_3O^+ وجزيئات من الحمض لم تتأين () CH_3COO^- وجزيئات من الحمض لم تتأين
() H_3O^+ ، CH_3COO^- فقط () H_3O^+ و CH_3COO^- وجزيئات من الحمض لم تتأين

السؤال الثالث :- أكمل الفراغ

- إذا علمت أن K_a لحمض السيانيك تساوي 3.5×10^{-4} ، لحمض الفورميك 1.8×10^{-4} ، فإن المحلول الذي له أعلى قيمة pH من بين محلوليهما المتساويين في التركيز هو محلول حمض -----
٢ - كلما قلت قيمة ثابت التأين (K_a) للحمض قوة الحمض .
٣ - كلما قلت قيمة (PK_a) للحمض قوة الحمض .
٤ - كلما قلت قيمة (PK_a) للحمض فإن قيمة PH
٥ - قيمة ثابت التأين الثاني لحمض الفسفوريك من قيمة ثابت التأين الأول له

السؤال الرابع :- أكمل بوضع السهم الدال على الزيادة (↑) أو النقصان (↓) ؟

قوة الحمض	درجة التأين	قيمة K_{a1}	قيمة pK_{a1}	$[H_3O^+]$	pH	$[OH^-]$	pOH
↑			↓				↑

السؤال الخامس :- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١ - الأحماض ثنائية البروتون والأحماض ثلاثية البروتون تفقد الهيدروجين واحدة تلو الأخرى ولا يتم تأين ذرات الهيدروجين بها في تفاعل واحد وبالتالي يكون لكل تفاعل ثابت التأين الخاص به . ()
٢ - يكون الحمض في مرحلة التأين الأولى أقوى وثابت تأين (K_{a1}) المرحلة الأولى أكبر . ()
٣ - تركيز الحمض القوي يساوي تركيز كاتيون الهيدرونيوم . ()
٤ - كلما قلت قيمة (K_a) للحمض تزداد قوة الحمض . ()

السؤال السادس :- علل : قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لمحلول تركيزه 0.1M من حمض الهيدروكلوريك

(HCl) أقل من قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لمحلول له نفس التركيز من حمض الأسيتيك (CH_3COOH)

ثانياً :- ثابت التآين للقاعدة K_b

القواعد التي تتأين بشكل تام في محاليلها المائية. مثال: تأين الأمونيا في المحلول المائي : $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$	القواعد التي تتأين بشكل تام في محاليلها المائية. مثال: تأين هيدروكسيد الصوديوم في الماء . $\text{NaOH}(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
---	---

السؤال الأول :- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

- ١- اذا علمت أن قيمة (K_b) لكل من محلول الأمونيا (1.8×10^{-6})، الهيدرازين (1.3×10^{-6})، ميثيل أمين (4.4×10^{-4})، إيثيل أمين (6.4×10^{-4})، فإن أقوى هذه القواعد في محاليلها المائية المتساوية التركيز هو:
- () محلول الأمونيا () الهيدرازين () ميثيل أمين () إيثيل أمين
- ٢- اذا علمت أن قيمة (K_b) لكل من محلول الأمونيا (1.8×10^{-6})، الهيدرازين (1.3×10^{-6})، ميثيل أمين (4.4×10^{-4})، إيثيل أمين (6.4×10^{-4})، فإن أكبر قيمة PH في محاليلها المائية المتساوية التركيز هو:
- () محلول الأمونيا () الهيدرازين () ميثيل أمين () إيثيل أمين

السؤال الثاني / أكمل الفراغ

- ١ - إذا كانت قيمة K_b للأنيلين تساوي 4.6×10^{-10} ، وللهيدرازين تساوي 9.8×10^{-7} ، فإن المحلول الذي يكون تركيز كاتيون الهيدروجين $[\text{H}^+]$ فيه أقل هو محلول ----- .
- ٢ - كلما قلت قيمة ثابت التآين (K_b) للقاعدة قوة القاعدة .
- ٣ - كلما قلت قيمة (PK_b) للقاعدة قوة القاعدة .
- ٤ - كلما قلت قيمة (PK_b) للقاعدة فإن قيمة PH
- ٥- إذا كانت قيمة ثابت التآين (K_a) لكل من حمض الأسيتيك وحمض الفورميك تساوي (1.8×10^{-4} , 1.8×10^{-5}) على الترتيب ، فإن المحلول الذي له أقل تركيز كاتيون هيدروجين من بين محلوليهما المتساويين في التركيز هو محلول حمض
- ٦- إذا كانت قيمة (pK_a) لكل من حمض الأسيتيك وحمض الهيبيكلوروز وحمض الهيدروسيانيك وحمض البنزويك هي (3.74 , 7.49 , 9.39 , 4.2) على الترتيب فإن أقوى هذه الأحماض في محاليلها المائية والمتساوية التركيز هو حمض

السؤال الثالث :- أكمل بوضع السهم الدال على الزيادة أو النقصان ؟

قيمة K_{b1}	درجة التآين	قوة القاعدة	قيمة pK_{b1}	$[\text{H}_3\text{O}^+]$	pH	$[\text{OH}^-]$	pOH
	↑			↓			

السؤال الرابع :- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١ - تتأين القواعد القوية بالكامل إلى كاتيونات فلزية وأنيونات هيدروكسيد في محاليلها المائية لذا ليس لديها ثابت تأين. ()
- ٢ - بعض القواعد القوية مثل هيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم شحيحة الذوبان في الماء. ولكن الكميات الصغيرة التي تذوب في الماء من تلك القواعد تتأين تماماً. ()
- ٣ - كلما قلت قيمة (K_b) للقاعدة تزداد قوة القاعدة . ()
- ٤ - عند تأين القاعدة القوية فإن تركيز القاعدة (احادية الهيدروكسيد) يساوي تركيز أنيون الهيدروكسيد. ()

مع خالص تمنياتنا للجميع
بالتوفيق والتفوق الدائم